THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

RARE BOOK COLLECTION

The André Savine Collection

RC865
.V58
1820

Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/oraspoznavaniiil008800

О РАСПОЗНАВАНІИ и ЛѢЧЕНІИ ГЕМОРОЯ или ПОЧЕЧУЯ и ДРУГИХЪ ВЪ ТѢСНОЙ СВЯЗИ СЪ НИМЪ СОСТОЯЩИХЪ БОЛѢЗНЕЙ.

Сочинилъ

Христіанъ Виттъ,

Докторъ Медицины и Хирургіи, Статскій Совѣтникъ, Императорской Медико-Хирургической Академіи Корреспондентъ и Кавалеръ.

Второе исправленное и вновь собранными наблюденіями и опытами пополненное изданіе.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Печатано при ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ

1820.

Печатать позволяется:

Съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи, до выпуска изъ Типографіи, представлены были въ Цензурный Комитетъ одинъ экземпляръ сей книги для Цензурнаго Комитета, другой для Департамента Министерства Духовныхъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія, два экземпляра для Императорской Публичной Библіотеки и одинъ для Императорской Академіи Наукъ. Маія 7 дня 1820 года.

ИМПЕРАТОРСКОЙ Медико-Хирургической Академіи Ученый Секретарь Коллежскій Совѣтникъ и Кавалеръ Яковъ Кайдановъ.

NB. Книгу сію получить можно у Сочинителя оной Христіана Яковлевича Винта, въ Придворномъ госпиталѣ что у Полицейскаго моста. Цѣна 12 руб. а съ пересылкою въ другіе города 15 рублей.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Намѣреніе мое было сообщить Публикѣ (какъ о семъ уже сказано было въ предисловіи перваго изданія) только нѣкоторыя наблюденія о гемороидальной болѣзни или почечуѣ, собранныя въ продолженіи долговременной моей практики; но какъ о сей болѣзни мы не имѣли еще достаточнаго сочиненія на Россійскомъ языкѣ, особливо съ критическимъ изслѣдованіемъ различныхъ и притомъ вредныхъ мнѣній на счетъ сущности сей болѣзни: то рѣшился я въ прошломъ году издать полное сочиненіе о распознаваніи и лѣченіи *почечуя* и другихъ съ нимъ въ тѣсной связи состоящихъ болѣзней, котороебы могло быть полезнымъ нетолько для Врачей, но и для особъ, необучавшихся Медицинѣ.

Для доставленія сему сочиненію желаемой степени совершенства, я принималъ въ соображеніе мнѣнія о сей болѣз-

наилучшихъ иностранныхъ писателей и въ особенности заимствовалъ многое изъ сочиненія знаменитаго *Рихтера* (A. G. Richter's Specielle Therapie III. T. 1815), которое въ своемъ родѣ признается превосходнѣйшимъ.

Не прошло еще года, какъ первое изданіе сего сочиненія было уже разобрано. Между тѣмъ требованія Публики на оное безпрерывно продолжаются; почему желая удовлетворить онымъ, я вмѣнилъ себѣ въ пріятнѣйшую обязанность приступить ко второму изданію сего сочиненія и вмѣстѣ съ симъ предувѣдомляю почтенную Публику, что со времени перваго изданія сей книги имѣлъ я случай сдѣлать много новыхъ наблюденій относительно геморроидальной болѣзни, которыми сіе второе изданіе и пополнено.

В. . . .

С. П. Б. Апрѣля
1820 года.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Теоретическое разсмотрѣніе о геморoидальной болѣзни вообще.

О сущности геморoидальной болѣзни или почечуя, стран. 1.

Припадки, обнаруживающіе геморoидальную болѣзнь или почечуй. 3.

Признаки воспаленія въ геморoидальныхъ и прочихъ венахъ воротной системы. 7.

О геморoидальномъ приступѣ. 9.

Различные роды или названія почечуя. 10.

Почечуй открытый или текучій. 10.

— — закрытый или слѣпой. 10.

Почечуйныя шишки. Теорія образованія почечуйныхъ шишекъ. 11.

Почечуй наружный. 13.

— — внутренній. 13.

— — слизистый, мокротный или бѣлый. 13.

— — наслѣдственный. 14.

— — повсемственный. 16.

— — внезапно скрывшійся или вдругъ задержанный. 17.

— — критическій. 18.

— — въ необыкновенныхъ мѣстахъ или необыкновенными путями открывающійся. 19.

Геморой пузырной. 20.

— — дѣтородныхъ частей. 21.

О кровотеченіи изъ мужескаго мочеиспускательнаго канала. 21 и 237.

О варикозномъ опуханіи венъ предстательной желѣзы и мочеиспускательнаго канала. 21 и 238.

Кровоистеченіе изъ рукава маточнаго, варикозное опуханіе венъ и гемороидальный вередъ въ рукавѣ маточномъ, стран. 22.

Гемороидальный *перелой* или *триллеръ* у мущинъ. 23 и 242.

Гемороидальный *триллеръ* или *катарръ* и сильный судорожный нудъ матки и рукава маточнаго у женщинъ. 23 и 243.

Ранки на дѣтородныхъ частяхъ гемороидальнаго свойства, похожія на венерическіе *шанкры*. 23 и 248.

Ночные *пріапизмы* или ночныя болѣзненныя напряженія уда и поллюцій. 23 и 250.

Боль съ опухолью въ сѣмянныхъ пузыркахъ, въ сѣмянномъ канатикѣ и шулятахъ. 23 и 253.

Сыпь съ несноснымъ зудомъ и вонючій потъ въ наружныхъ дѣтородныхъ частяхъ. 25.

О причинахъ почечуя. 25.

О вредѣ отъ пресыщенія горячительною пищею. 26.

О вредѣ отъ сидячей жизни и недостатка въ тѣлодвиженіи вообще. 27.

О вредныхъ слѣдствіяхъ продолжительнаго запора низомъ. 29 и 88.

Завалы чревныхъ внутренностей или обструкціи. 31.

О вредѣ отъ чрезмѣрнаго накопленія въ кишечномъ каналѣ вѣтровъ. 32.

Многокровіе. 34.

Какія вены у гемороидалиста уклоняются отъ естественнаго состоянія. 35.

О сверхъестественной раздражительности и чувствительности боевыхъ сосудовъ. 37.

О притупленной раздражительности и чувствительности кровоносныхъ сосудовъ. 38
О болѣзненно-измѣненной нервной системѣ, какъ причинѣ почечуя. 39.
О венозномъ тѣлосложеніи. 41.
Болѣзни, наиболѣе оному свойственныя. 43.
О признакахъ темпераментовъ *холерическаго* (черножелчнаго или холерико-меланхолическаго) и *флегматико-венознаго*. 41.
Предсказаніе о почечуѣ — что разумѣется подъ названіемъ *легкаго* и злокачественнаго почечуя. 44.
Вреденъ ли или полезенъ для человѣка почечуй, или критическое разсмотрѣніе какъ цѣлебности, такъ и вреда, отъ него происходящаго. 46.
Для мущинъ столько ли необходимъ почечуй, сколько необходимо для женщинъ ихъ мѣсячное очищеніе? 49.
Облегченіе отъ нѣкоторыхъ припадковъ, при появленіи почечуя замѣченное, не доказываетъ еще его цѣлебности и невинности. 51.
О недостаточномъ, умѣренномъ и чрезмѣрномъ почечуйномъ теченіи. 53.
Слѣдуетъ ли побуждать или усиливать почечуй при такъ называемомъ повсемственномъ почечуѣ? 56.
Должно ли бояться истреблять почечуй потому только, что прекращенію его теченія приписываются вредныя послѣдствія? 56.

О лѣченіи почечуя и другихъ въ тѣсной связи съ нимъ состоящихъ болѣзней.

Слѣдуетъ ли почечуй лѣчить, или должно оставлять его на попеченіе самой натуры? 60.

Можно ли почечуй излѣчить совершенно? Отъ чего излѣченіе онаго всегда почти сопряжено съ затрудненіями? 61.

Лѣченіемъ почечуя спѣшить не слѣдуетъ — что именно подъ симъ разумѣютъ? 62.

О вспомогательномъ лѣченіи почечуя. 64.

О тѣлодвиженіи или *моціонѣ*. О выгодахъ отъ онаго. 65. Кому именно вредитъ тѣлодвиженіе, требующее большаго напряженія силъ? 67.

О различныхъ родахъ тѣлодвиженія. 69.

Прогулка. 69.

Бѣганіе не сходя съ мѣста (Quasilauf). 70.

Ѣзда въ экипажахъ 71. Верьховая ѣзда. Подвижныя креслы или качалка. 71.

Билліардная игра. 72.

Танцованье или пляска. Осторожность, которую при танцахъ наблюдать слѣдуетъ. 72.

Вощеніе. Занятія въ саду. 74.

Путешествіе, временная поѣздка въ деревню и пребываніе въ лѣтнее время на дачѣ. 75.

Купаніе, плаваніе въ водѣ. 76.

Хожденіе на охоту. 77.

Токарная работа и пиленіе дровъ. Декламированіе. 78.

Треніе тѣла сухою рукою и расправленіе костей (Massag). 79.

Наставленіе Статскимъ Чиновникамъ о предохраненіи себя отъ болѣзней, зависящихъ отъ сидячей жизни. 80.

О діетѣ геморoидалистовъ. Пища и питіе, полезныя одержимому почечуемъ. 84.
Кому въ особенности должно воздерживаться отъ спиртуозныхъ напитковъ. 87.
Объ отвращеніи запора низомъ. 88.
Горькія аппетитныя горячительныя капли и настойки, равно и сильно слабящія средства, усиливаютъ запоръ низомъ. 89.
О пользѣ пріученія натуры къ испражненію низомъ всегда въ одно извѣстное время дня. 92.
О вредѣ отъ медленнаго удовлетворенія натуральныхъ позывовъ на низъ и къ испущенію мочи. 94.
Составы для послабляющихъ на низъ клистировъ и внутреннихъ средствъ, какъ то: сѣрныхъ порошковъ и слабительныхъ пилюль. 95.
О наружномъ лѣченіи почечуя. 99.
Примочки для промыванія прохода и прикладыванія къ почечуйнымъ шишкамъ. 99.
Холодные клистиры. 100. Треніе прохода льдомъ. О предосторожности, которую должно наблюдать при употребленіи сихъ наружныхъ средствъ. 101.
Способъ отвращать выпаденіе заднепроходной кишки. 102 и 141.
О припадочномъ лѣченіи почечуя, или о лѣченіи геморoидальнаго приступа. 102.
Объ отвращеніи геморoидальнаго приступа, происшедшаго отъ полнокровія и отъ сильнаго разгоряченія 102.
Въ какихъ случаяхъ для геморoидалиста бываютъ нужны піявицы и кровопусканія? 105.

О лѣченіи гемороидальнаго приступа, происшедшаго отъ простуды. Микстура потогонная отъ простуды. 107.
О лѣченіи гемороидальнаго приступа, ожесточившагося отъ судорогъ въ животѣ. 108.
Чай и капли противусудорожныя. 109.
Объ отвращеніи гемороидальнаго приступа отъ испуга или жестокаго гнѣва съ изліяніемъ въ желудокъ и кишки желчи. 109.
Составъ полезнаго противъ сего Риверова сложнаго напитка. 109.
Составъ слабительной микстуры весьма полезной для изгнанія изъ кишекъ желчи и слизи. 110.

О лѣченіи текучаго почечуя.
Случаи, въ которыхъ почечуйнаго истеченія останавливать не слѣдуетъ. 110.
Лѣченіе почечуйнаго истеченія, сдѣлавшагося отъ сильнаго волненія въ крови и отъ разгоряченія напитками и горячащею пищею. 111.
О пріуготовленіи сыворотки съ квасцами. 111.
Объ остановленіи гемороидальнаго кровоистеченія, происшедшаго отъ чрезмѣрной слабости въ нервахъ и отъ судорожныхъ движеній. 112.
О средствахъ, полезныхъ въ непомѣрномъ гемороидальномъ истеченіи при чрезвычайной раздражительности и чувствительности кишечнаго канала и при сильномъ поносѣ. 113.
О лѣченіи непомѣрно сильнаго гемороидальнаго теченія, зависящаго отъ великаго разслабленія и великой раздражительности въ кровоносныхъ сосудахъ. 114.

О наружныхъ средствахъ къ остановленію чрезмѣрно сильнаго гемороидальнаго истеченія. 117.
О укрѣпленіи гемороидалистовъ послѣ большой потери крови. 119.
Составъ крѣпительныхъ лѣкарствъ съ Виттовыми хинными каплями. 121.
О внутреннемъ и наружномъ лѣченіи слизистаго или мокротнаго почечуя. 122.
О лѣченіи закрытаго почечуя или почечуйныхъ шишекъ. 126.
Сѣрные порошки для разрѣшенія закрытаго почечуя или почечуйныхъ шишекъ. 127.
Растворъ среднихъ солей и микстура изъ горькихъ экстрактовъ для того же. 128.
Винная настойка или капли отъ закрытаго почечуя. 129.
О лѣченіи воспаленныхъ болящихъ почечуйныхъ шишекъ или гемороидальныхъ опухолей. 131.
Примочки и мази для укрощенія боли въ почечуйныхъ воспаленныхъ шишкахъ и для разрѣшенія ихъ. 132.
О почечуйномъ вередѣ. 134.
О лѣченіи почечуйнаго вереда. Мягчительная припарка для смягченія и приведенія онаго къ созрѣнію. 135.
О смягченіи и разрѣшеніи жесткихъ невоспаленныхъ почечуйныхъ шишекъ. 137.
О составленіи теплыхъ мягчительныхъ паровъ, надъ которыми одержимый жесткими почечуйными шишками садится долженъ. 137.
Мази и примочки для смягченія жесткихъ невоспаленныхъ почечуйныхъ шишекъ. 137.
Примочка и мазь для разрѣшенія мокротныхъ невоспаленныхъ почечуйныхъ шишекъ. 139.

Объ отвращеніи боли, причиняемой глубоко въ проходной кишкѣ сидящими шишками, при испражненіи внизъ сдавленными и въ самомъ проходѣ ущемленными. 140.
При лѣченіи почечуя мѣстное изслѣдованіе необходимо. 140.
О способѣ вправленія внутрь почечуйныхъ опухолей и проходной кишки, при испражненіи выходящихъ наружу. 141.
О средствахъ къ укрѣпленію разслабленной и наружу выпадающей проходной кишки. 141.
О прорѣзываніи и совершенномъ вырѣзываніи почечуйной опухоли. 142.
О перевязываніи (das Abbinden) почечуйныхъ опухолей шелковинкою. 144.
Объ отвращеніи сильнаго сжатія или съуженія заднепроходной кишки. 145.
О распознаваніи и лѣченіи скиррознаго затвердѣнія заднепроходной кишки. 148.
О лѣченіи средствами, почечуй гонящими. 152.
Что должно разумѣть подъ словомъ *гнать почечуй?* 153.
Случаи, въ которыхъ почечуй гонящихъ средствъ употреблять не слѣдуетъ. 154.
Составы лѣкарствъ, побуждающихъ сосуды и внутренности чрева, или лѣкарствъ, такъ называемыхъ почечуй гонящихъ. 155. Пилюли и порошки изъ *сабура* (Aloës); осторожность, которую наблюдать слѣдуетъ при употребленіи *сабура*. 156.
Пилюли колоцинтовыя, 157. Пилюли и капли изъ *чемерицы черной* (Hellebori nigri.) 159. Перецъ. 160 и проч.
Минеральныя цѣлительныя воды; отличительные признаки доброты кисловатыхъ водъ. 164. Ихъ дѣйствіе 165.

О распознаваніи и лѣченіи чревныхъ заваловъ или обструкцій. 166.
Холодная чистая вода, ея превосходная цѣлебность для людей, расположенныхъ къ чревнымъ заваламъ. 169. Осторожность, каковую имѣть слѣдуетъ при употребленіи холодной воды и холодныхъ напитковъ вообще. 169.
Горькіе мыльные разрѣшающіе экстракты. 170.
Соли среднія разрѣшающія; желчь бычачья, ея употребленіе внутрь и снаружи для разрѣшенія заваловъ. 171. Нашатырь. 172.
Каломель или солекислая услащенная ртуть. 172. Камедисто-смоляныя разрѣшающія средства. Уксусо-кислый поташъ (Liquor terrae foliatae tartari) и проч. 173.
О превосходной силѣ *углекислой воды* для разрѣшенія заваловъ и скиррозныхъ опухолей. 175.
Минеральныя воды для разрѣшенія чревныхъ заваловъ. 177.
Въ какое время года пить минеральныя воды и по скольку, и какую наблюдать діету. 179.
Пилюли разрѣшающія. 183.
Растворъ сабура съ нашатыремъ и крѣпкою водкою, весьма полезный какъ отъ заваловъ, такъ и отъ другихъ различныхъ болѣзней. 184.
Наружное лѣченіе чревныхъ заваловъ. 192.
Сѣрныя ванны, разрѣшающіе клистиры и проч. 192.
О лѣченіи почечуя внезапно скрывшагося. 193.
О способѣ, коимъ отвращается полнокровіе и болѣзненно-возвышенная раздражительность кровоносныхъ сосудовъ. 196.
О вредѣ отъ напрасныхъ кровопусканій. 198.

Людямъ, сдѣлавшимъ уже привычку къ частымъ кровопусканіямъ, опасно иногда отказывать въ оныхъ. 199.
Объ отвращеніи чрезмѣрной чувствительности и наклонности организма къ судорогамъ. 200.
О средствахъ, полезныхъ въ притупленной чувствительности и раздражительности сосудовъ и брюшныхъ органовъ. 201.
О распознаваніи и лѣченіи гемороидальной колики. 203.
Объ отвращеніи жестокой гемороидальной головной боли и головокруженія. 208.
Чудесное дѣйствіе *хрѣна* въ излѣченіи жесточайшей головной боли. 214.
О лѣченіи гемороидальнаго кровохарканія или легочнаго гемороя. 216.
Послѣ кровохарканія нужно всегда, для предупрежденія чахотки, укрѣпить легкіе. 222.
О распознаваніи и лѣченіи пузырнаго гемороя. 223.
Лѣченіе воспалительнаго свойства припадковъ въ пузырѣ. 227.
Лѣченіе судорожнаго состоянія пузыря. 228.
Лѣченіе кровотеченія изъ мочеваго пузыря. 230.
О изгнаніи слизи или мокротъ изъ мочеваго пузыря. 231.
Фоглеровъ порошокъ, превосходный для изгнанія изъ пузыря слизи и песку. 232.
Объ отвращеніи запора мочи. 233.
О лѣченіи гемороидальной болѣзни дѣтородныхъ частей. 237.
Лѣченіе гемороидальнаго истеченія крови изъ мочеиспускательнаго канала. 237.

Лѣченіе варикознаго опуханія и разширенія венъ предстательной желѣзы и мужескаго мочеиспускательнаго канала. 238.
Лѣченіе кровотеченія изъ расширенныхъ варикозныхъ венъ маточнаго рукава и мѣшетчатыхъ губчатыхъ наростовъ въ ономъ. 240.
Лѣченіе гемороидальнаго вереда въ рукавѣ матки. 242.
Лѣченіе гемороидальнаго перелоя или *триппера* какъ у мущинъ, такъ и у женщинъ. 242.
Лѣченіе гемороидальныхъ ранъ на дѣтородныхъ удахъ обоего пола, похожихъ на венерическіе шанкры. 248.
Лѣченіе вонючаго гемороидальнаго пота. 249.
Объ отвращеніи ночныхъ напряженій мужескаго дѣтороднаго уда и ночныхъ грезъ (поллюцій) гемороидальнаго свойства. 250.
О лѣченіи разрыва губчатыхъ клеточекъ мужескаго дѣтороднаго уда. 254.
О лѣченіи гемороидальной чревной тоски. 255.
О распознаваніи и лѣченіи ипохондрико-гемороидалистовъ. 261.
Особенная польза холодной воды отъ ипохондріи. 265. и отъ сильнаго біенія или трепетанія сердца у ипоходриковъ случающагося. 267.
Объ отвращеніи накопленія вѣтровъ въ кишечномъ каналѣ. 268.
О средствахъ къ возбужденію разслабленнаго *тона* въ желудкѣ и кишкахъ. 269.
Капли отъ вѣтровъ и специи для настойки вина, дающаго тонъ кишечному каналу. 272.
Средства отъ кислотъ въ желудкѣ кислыя отрыжки и колику причиняющихъ. 273.

Нынѣшнее воспитаніе дѣтей на горячащихъ напиткахъ и излишнесочной пищѣ, не одобряется. 274.
О вредѣ отъ привычки безпрестанно рыгать и испущать вѣтры. 275.
О лѣченіи колики (боли въ животѣ), отъ вѣтровъ. 276.
О распозкаваніи и лѣченіи геморoидальной сухотки. 280.
Шоколатъ для людей изнуренныхъ. 284.
Способъ приготовлять желе изъ исландскаго моха для изнуренныхъ, сухотивыхъ и чахотныхъ, людей. 286.
О способѣ приготовленія *Лафектерова сирола* и его чрезвычайной цѣлебности для людей сильно изнуренныхъ тѣломъ съ кровохарканіемъ и безъ онаго; для страждущихъ отъ худосочія происходящаго отъ застарелой ломоты, золотухи, закожныхъ сыпей, венерической и отъ неумѣреннаго употребленія ртутныхъ (меркуріальныхъ) средствъ. 288.
Излѣченіе сухотки, отъ плоскаго глиста зависѣвшей. 293.
Объ отвращеніи чрезмѣрной тучности тѣла. 297.
О лѣченіи геморoидальной боли въ поясницѣ. 302.

О
ГЕМОРОИДАЛЬНОЙ БОЛѢЗНИ
ИЛИ
ПОЧЕЧУѢ.

§ 1.

Почечуй или *Геморой* (Haemorrhoides) есть болѣзнь, коей названіе взято отъ Греческаго αιμορροιδες (отъ αιμα кровь и ρεω теку). Она познается по кровавымъ опухолямъ или шишкамъ въ заднемъ проходѣ, по истеченію изъ онаго крови, чистой либо смѣшанной съ слизью, матеріи подобной, и по другимъ сочувственнымъ припадкамъ, вышесказанныя опухоли и истеченіе сопровождающимъ.

Сущность гемороидальной болѣзни составляютъ: измѣненная жизненная дѣятельность и органическая прочность крововозвратныхъ и тонкихъ волосяныхъ сосудовъ, плевъ и мокротныхъ желѣзъ заднепроходной кишки.

Основаніемъ же сему измѣненію служитъ многосочіе, накопленіе слизи и несвободное кровообращеніе во вратожильной системѣ и въ частяхъ около задняго прохода. Изъ сего яв-

ствуетъ, что почечуй не состоитъ въ одномъ только истеченіи проходомъ крови, хотя Греческое онаго названіе αιμορροις и означаетъ *кровотеченіе*.

§ 2.

Почечуй бываетъ какъ у мущинъ, такъ и у женщинъ. — Женщины подвержены ему какъ въ дѣвичьемъ, такъ и въ замужнемъ состояніи; онѣ могутъ имѣть оный даже и во время правильнаго мѣсячнаго очищенія кровей. Возрастъ между 30 и 50 годами почитался въ прежнія времена наиболѣе къ почечую расположеннымъ; чего однакожъ нынѣ, по причинѣ примѣтно измѣняющагося произрожденія (génération) людей и превратнаго образа жизни, сказать не можно. Теперь нерѣдко случается видѣть и дѣтей, почечую подверженныхъ. Вѣрнѣе можно опредѣлить, что человѣкъ къ болѣзни сей расположенъ бываетъ большею частію передъ самою возмужалостію (pubertät) и въ первыхъ лѣтахъ отступленія физическаго его бодрствованія. Изъ всѣхъ темпераментовъ венозное тѣлосложеніе, основывающееся на меланхолическомъ и черножелчномъ темпераментѣ, преимущественно располагаетъ человѣка къ сему недугу. Изъ всѣхъ народовъ исключительно подвержены почечую: Рускіе и прочіе Сѣверные жители, также Поляки и Венгры.

Припадки, обнаруживающіе геморроидальную болѣзнь или почечуй.

§ 3.

Первоначальные припадки почечуя, при крѣпкомъ тѣлосложеніи и полнокровіи появляющагося, бываютъ иногда такъ легки, что человѣкъ, оному подверженный, ни съ лица на больнаго не походитъ, ниже большой разстройки въ заднепроходной кишкѣ ощущаетъ. Припадки сіи состоятъ: во временномъ палящемъ жарѣ въ проходѣ, въ довольно затруднительномъ испражненіи низомъ; причемъ въ экскрементахъ (въ калѣ) показывается кровь на подобіе нитей, либо нѣсколько алой крови истекаетъ передъ испражненіемъ или тотчасъ послѣ онаго. Съ истеченіемъ крови обыкновенно ощущается въ мочѣ палящій жаръ, а въ заднемъ проходѣ зудъ, ломъ и какъ будто капли горячей воды или горячіе вѣтры изъ прохода исходятъ.

У иныхъ вмѣсто истеченія крови появляются въ проходѣ небольшія кровавыя опухоли или шишки и ощущается легкое скоропреходящее стрѣлянье сквозь нижнюю часть брюха и въ самомъ проходѣ. Сверхъ того въ обоихъ случаяхъ въ заднепроходной кишкѣ чувствуется нѣкоторая полнота и тяжесть; кишка сія находится какъ бы въ воспалительномъ состояніи и часто понуждается къ напрасному испражненію низомъ. Въ поясницѣ, а иногда и по всей

спинѣ, ощущается ломъ и нѣкоторая бьющаяся боль. Впрочемъ пищевареніе и кровотвореніе кажутся такъ хороши, что при потерѣ иногда значительнаго количества крови человѣкъ вовсе не теряетъ свѣжести своего здоровья. Обыкновенно съ уничтоженіемъ напряженія гемороидальныхъ сосудовъ (*) уничтожаются какъ почечуйныя шишки, такъ и затрудненіе въ испражненіи низомъ; а иногда и всѣ вышеупомянутые легкіе припадки, при наблюденіи больнымъ приличной діеты, никогда болѣе не возвращаются, или развѣ только оставляютъ по себѣ одну или двѣ небольшія шишки въ проходѣ, примѣтнаго затрудненія непричиняющія. И человѣкъ въ семъ случаѣ нерѣдко во всю жизнь чувствуетъ себя здоровымъ.

Но какъ при появленіи сихъ первоначальныхъ припадковъ почечуя не всегда старались тотчасъ устранить причины и остановить ходъ сей болѣзни соблюденіемъ строгаго порядка въ образѣ жизни: то болѣзнь сія весьма рѣдко оканчивалась вышеупомянутыми легкими припадками, но обыкновенно слѣдовали за оными другіе, какъ то: лице гемороидалиста становится большею частію блѣднымъ, желтоватымъ;

(*) Гемороидальными называются въ Анатоміи тѣ кровоносные сосуды, которые принадлежатъ къ прямой или заднепроходной кишкѣ. *Замѣчаніе не для Врачей.*

онъ чувствуетъ тяжесть и нѣкоторую утомленность въ членахъ; сонъ дѣлается прерывнымъ. Гемороидалисты вообще бываютъ сонливы и охотно сидятъ до глубокой ночи; за то поздо просыпаются и весьма долго не встаютъ; припадки разстроеннаго пищеваренія начинаютъ быть примѣтнѣе, на пр: языкъ становится бѣлъ, аппетитъ пропадаетъ, вѣтры сильно надуваютъ брюхо до самаго предсердія; въ брюхѣ ощущается сильная тяжесть съ нѣкоторымъ тоскливымъ чувствомъ; испражненіе низомъ болѣе и болѣе безъ всякой явной причины затрудняется, даже и при экскрементахъ вовсе нежесткихъ. Истеченіе крови проходомъ дѣлается уже частымъ и великимъ, такъ что иногда съ фунтъ и болѣе разомъ истекаетъ. Колючее стрѣлянье сквозь нижнюю часть брюха, въ мочевой пузырь, въ мякоть задницы и въ отверстіе прохода бываетъ иногда такъ сильно, что гемороидалистъ съ крикомъ вскакиваетъ съ мѣста. Появляется зудъ; шишки въ проходѣ получаютъ цвѣтъ свинцовый и фигуру подобную головкѣ спаржи; въ послѣдствіи онѣ весьма увеличиваются и умножаются, дѣлаются уже тяжкимъ недугомъ и заставляютъ иногда больнаго на стульчакѣ крехтѣть по нѣскольку часовъ, подобно роженицѣ. Почечуйныя шишки (mariscae) иногда переходятъ въ текучій геморой, а иногда дѣлаются жесткими, похожими на шишки, бывающія отъ венерической заразы; либо образуютъ

мѣшетчатыя опухоли (Sacci Haemorrhoidales). Случается также, что шишекъ извнѣ не примѣтно; онѣ находятся глубоко въ заднепроходной кишкѣ, что узнать можно чрезъ впущеніе въ проходъ пальца, вымазаннаго масломъ; сверхъ того присутствіе ихъ обнаруживается ненатуральнымъ т. е. некруглымъ, но стиснутымъ и тонкимъ видомъ исходящихъ экскрементовъ.

Внѣшнія и внутреннія шишки въ невоспалительномъ состояніи отъ прикосновенія почти не причиняютъ боли; но при воспаленіи больный отъ жестокой боли не можетъ ни сидѣть, ни ходить. Иногда онѣ похожи на выпадшую кишку (которая отъ сильнаго напряженія иногда и дѣйствительно наружу выходитъ). При напряженіи почечуйныхъ шишекъ и при запорѣ на низъ гемороидалистъ обыкновенно чувствуетъ головную боль, головокруженіе и нѣкоторую пустоту въ головѣ, а иногда шумъ въ ушахъ, сверканіе и какъ бы летаніе черныхъ мушекъ передъ глазами (*), ломъ въ спинѣ и въ затылкѣ, особенно шею какъ будто что тянетъ.

Въ послѣдствіи, когда вышеописанные припадки почечуя не скоро будутъ прекращены,

(*) Сіи головные припадки, означающіе обыкновенно большой приливъ крови къ головѣ, случаются и въ другихъ болѣзняхъ, какъ то: въ ломотѣ, въ засореніи желудка, въ простудѣ и проч.; и потому не всегда составляютъ они существенные гемороидальные признаки.

или напротивъ превратнымъ лѣченіемъ и невоздержною жизнію больнаго или другимъ какимъ несчастнымъ случаемъ болѣе и болѣе укоренятся и усилятся: тогда гемороидальная болѣзнь сопровождается еще жесточайшими противу вышесказанныхъ припадками, и именно: истеченіе крови становится такъ сильно, что больный нерѣдко падаетъ въ обморокъ отъ непомѣрной потери крови и подвергается разнымъ опаснымъ и неизлѣчимымъ болѣзнямъ, каковы суть: разслабленіе нервовъ, испорченное пищевареніе и кровотвореніе, медленная изнурительная лихорадка, сухотка, водяная болѣзнь и проч.; либо гемороидальныя опухоли, бывающія иногда съ кулакъ величиною, воспаляются и распространяютъ раздраженіе въ сосудахъ и нервахъ чрезъ сочувствіе по всѣмъ органамъ живота, отъ чего больный чувствуетъ ужасную боль, а иногда впадаетъ въ горячку и даже въ бѣшенство.

Воспаленіе въ гемороидальныхъ, иногда и въ прочихъ венахъ воротной системы сопровождается обыкновенно: жестокою судорожною жгучею или палящею болью въ поясницѣ, болью въ пахахъ, въ шулятахъ и проходѣ; гемороидалистъ отъ боли не можетъ пошевелить ногъ и чувствуетъ сильное безпокойство и досаду и подверженъ легкимъ лихорадочнымъ припадкамъ. Когда таковое болѣзненное состояніе венъ не скоро будетъ прекращено, то оканчивается

обыкновенно: истеченіемъ изъ прохода слизи бѣлой, зеленоватой, похожей на матерію, мочею съ слизистою осадкою, и гемороидалистъ терпитъ разныя мученія, на пр: гемороидальныя опухоли воспалясь затвердѣваютъ и приходятъ въ нагноеніе (furunculus Haemorrhoidalis), а иногда вмѣстѣ съ сопредѣльными частями поражаются антоновымъ огнемъ или произраждаютъ неизлѣчимые свищи (фистулы), язвы и скирръ.

Мочевой пузырь и дѣтородныя части, по причинѣ весьма близкой связи ихъ сосудовъ съ гемороидальными сосудами, нерѣдко страждутъ при почечуѣ отъ сочувствія. Сюда относится: затрудненіе въ испущеніи мочи, истеченіе слизи, а иногда и кровотеченіе изъ мочеваго пузыря и изъ мочеваго ствола и проч. (смотри о гемороѣ дѣтородныхъ частей). Нерѣдко сопровождаютъ геморой и затрудняютъ излѣченіе онаго разныя хроническія болѣзни, затвердѣнія и нагноенія въ печени, въ желѣзахъ брыжейки, въ селезенкѣ, въ почкахъ; ипохондрія, разныя болѣзни матки, подагра, боль въ составѣ бедренной кости, каменная болѣзнь и многіе другіе недуги; также суровость нрава или мрачное расположеніе духа суть сопутники гемороидальной болѣзни (см. о гемороидальной чревной тоскѣ).

Истеченіе крови и всѣ вышеозначенные припадки почечуя не всегда въ одинакой степени

безпокоятъ больнаго; иногда продолжаются они нѣсколько минутъ или часовъ, или нѣсколько дней, потомъ перестаютъ и снова появляются. Появленіе припадковъ бываетъ въ разныя времена года непостоянно, либо оные возвращаются періодически, на пр: каждую весну и осень или каждый мѣсяцъ постоянно. Они могутъ возобновиться и ожесточиться отъ несоблюденія діеты, отъ сильнаго разгоряченія, особливо спиртуозными напитками, отъ простуды, отъ недостатка въ тѣлесномъ движеніи, отъ запора, отъ неукрощенія сильныхъ страстей, отъ продолжительнаго гнѣва и запальчивости, отъ частаго испуга и т. п., также отъ динамическихъ на нервы и сосуды дѣйствующихъ причинъ, каковы суть: вліяніе луны, свѣта, магнитной и электрической силы, и наконецъ отъ перемѣны въ атмосферѣ.

Многіе изъ гемороидальныхъ припадковъ совокупно, и въ особенности раздраженіе въ брюшной полости, полносочіемъ и воспященнымъ обращеніемъ крови производимое, болѣзненное напряженіе и воспаленіе почечуйныхъ опухолей отъ сильнаго напора крови, сильныя судороги и боли въ животѣ, припадки въ мочевомъ пузырѣ и лихорадочное состояніе въ ожесточеніи оныхъ могутъ быть названы (и впредь мною называемы будутъ) *гемороидальнымъ приступомъ*.

Разные роды или названія гемороя.

§ 4.

Геморой или *почечуй открытый* или *текучій* (Haemorrhoides sanguineae, apertae, fluentes) называется въ такомъ случаѣ, когда кровь при извѣстныхъ припадкахъ (описанныхъ въ § 3.) истекаетъ проходомъ. Истеченіе крови бываетъ или непосредственно изъ гемороидальныхъ сосудовъ, и то большею частію изъ венъ (хотя случается также и изъ концовъ боевыхъ жилъ), либо изъ почечуйныхъ шишекъ или мѣшетчатыхъ опухолей. Гемороидальная кровь есть часть общаго состава крови, а не особая какая либо вредная, отъ натуры для изверженія изъ тѣла яко бы опредѣленная, какъ въ семъ послѣднемъ мнѣніи нѣкоторые весьма ошибаются. Истекающая кровь бываетъ либо чистая алая, либо черная, густая и вонючая, а иногда и съ гноемъ смѣшанная. Кровь пріемлетъ сію нечистоту, а иногда и остроту, когда оная долго задерживается отъ необращенія въ распухлыхъ сосудахъ и въ мѣшетчатыхъ опухоляхъ.

§ 5.

Почечуй или *геморой закрытый* или *слѣпой* (Haemorrhoides coecae) называется, когда кровь не истекаетъ проходомъ, но токмо излишне наполняетъ расширенные крововозвратные сосуды прямой кишки (varices) или накоп-

ляется между оболочками сей кишки, либо подъ кожею около прохода, и когда въ обоихъ сихъ случаяхъ внутри или внѣ прохода образуются шишки (mariscae) или мѣшетчатыя опухоли (sacci haemorrhoidales).

Теорія образованія почечуйныхъ или геморроидальныхъ шишекъ.

Почечуйныя или *геморроидальныя шишки* и *мѣшетчатыя опухоли* (mariscae, sacci haemorrhoidales, Haemorrhoidal-Knoten, H. Zacken) образуются различнымъ образомъ. Онѣ суть именно: 1) либо скопленіе крови въ мѣстномъ расширеніи крововозвратной жилы (varix); 2) либо изліяніе крови (ecchymosi) между оболочками заднепроходной кишки или между кожею около задняго прохода и мускуломъ, проходъ смыкающимъ (sphincter ani); 3) *Шоссье* и *Кулленъ* полагаютъ, что сіи шишки суть ничто иное какъ изліяніе крови (ecchymosis) изъ маленькихъ *венъ* въ тонкій плевистый мѣшечикъ (capsula). *Монтееръ* говоритъ, что почечуйныя шишки не отъ разрыва вены образуются, но отъ расширенія самыхъ тонкихъ волосныхъ сосудцовъ (vasa capillaria). *Иньекціи* показываютъ, что только однѣ отверстія самыхъ малыхъ сосудцовъ проницаютъ почечуйную шишку, расширенныя же вены крови своей въ оную не изливаютъ (Puchelt). Извѣстно впрочемъ, что *по-*

чечуйная шишка, какимъ бы образомъ оная не образовалась, бываетъ либо безъ примѣтнаго расширенія *венъ*, или сопровождается большимъ расширеніемъ оныхъ. *Весалій* нашелъ у геморoидалиста послѣ смерти одну изъ геморoидальныхъ венъ расширенную во всю длину прямой кишки на цѣлой дюймъ и кровію налившуюся. Кровь либо всасывается и шишка уменьшается, а иногда и вовсе исчезаетъ; либо напротивъ кровь болѣе и болѣе накопляется и увеличиваетъ шишку. Стѣны оной болѣе и болѣе опухаютъ и образуютъ клетчатой мѣшокъ, наполненный кровію и другими соками (saccus haemorrhoidalis). Таковая опухоль иногда затвердѣваетъ, нагнаивается и образуетъ почечуйный или геморoидальный, жестокую боль причиняющій *вередъ* (Furunculus Haemorrhoidalis), открытіе котораго сопровождается иногда большимъ истеченіемъ крови. 4) Академикъ нашъ Г. *Уденъ* принимаетъ (*) внутреннее существо геморoидальныхъ бородавокъ за губчатое сплетеніе съ малыми отдѣленными ячейками, кои не имѣютъ между собою сообщенія и въ коихъ находится застоявшаяся кровь. Онъ полагаетъ также вѣроятнымъ, что сіи бородавки суть сумки, состоящія изъ клетчатой плевы, въ коей накопилась кровь, или

(*) См. Академическія чтенія о хроническихъ болѣзняхъ.

суть наросты внутренной оболочки заднепроходной кишки.

§ 6.

Почечуй или *геморой наружный* (Haem. externae) называется, когда истеченіе крови бываетъ изъ наружныхъ вѣтвей подчревной вены (vena hypogastrica) и именно изъ сплетенія венъ, называемыхъ наружными гемороидальными сосудами (plexus haemorrhoidalis externus) и когда шишки образуются внѣ прохода.

§ 7.

Почечуй или *геморой внутренній* (haem. internae) называется, когда онъ находится во внутреннихъ гемороидальныхъ сосудахъ прямой кишки, а иногда и выше, въ ободошной (vena colica sinistra et vena haemorrhoidalis interna).

§ 8.

Геморой или *почечуй слизистый* или *мокротный* или *бѣлый* (Haem. mucosae, albae) называется, когда при прочихъ гемороидальныхъ припадкахъ (§ 3.) вмѣсто крови истекаетъ проходомъ слизь. Извѣстно, что отдѣленіе слизи бываетъ всегда значительно тамъ, гдѣ вмѣстѣ съ слизистою плевою случатся варикозныя расширенія венъ, и потому теченіе слизи или мокроты, гною подобной, иногда желтоватой или зеленоватой и вонючей съ нѣкоторою остротою, происходитъ здѣсь изъ воспаленныхъ гемороидальныхъ опухолей и изъ разслабленныхъ гемороидальныхъ и прочихъ венъ вратожильной

системы. Впрочемъ таковое истеченіе есть иногда ничто иное какъ слизь и мокрота, отдѣляющаяся изъ раздраженныхъ желѣзъ разслабленной слизистой оболочки прямой кишки. Причиною мокротнаго геморoя не безъ основанія полагаютъ также флегматико-венозное тѣлосложеніе и завалы брюшныхъ внутренностей. Мокротный геморой бываетъ обыкновенно послѣ испражненія низомъ, большею частію при жестокомъ жиленьѣ и ломѣ въ проходѣ; впрочемъ онъ сопровождается явными припадками какъ закрытаго, такъ и текучаго геморoя, а иногда съ симъ послѣднимъ мѣняется какъ мѣсячное у женщинъ очищеніе и разныя другія кровотеченія мѣняются съ истеченіемъ слизистыхъ мокротъ. У женщинъ слизистой геморой весьма часто сопровождается истеченіемъ слизи изъ рукава матки. Количество гемороидальной слизи или мокротъ бываетъ не велико и рѣдко больше полуторыхъ или двухъ столовыхъ ложекъ въ одинъ разъ, что и продолжается нѣсколько дней сряду, а потомъ исчезаетъ. Всякое другое слизотеченіе изъ прохода, безъ явныхъ признаковъ почечуя, принадлежитъ къ болѣзнямъ другаго рода, а не къ почечую или геморою.

§ 9.

Почечуй или *геморой наслѣдственный* (Haemor. haereditariae) называется, когда страждущій родился съ явнымъ расположеніемъ къ ге-

мороидальной болѣзни; когда онъ переданъ отъ родителей, имѣвшихъ сію болѣзнь. Наслѣдственное расположеніе гемороидалистовъ состоитъ именно въ сильномъ врожденномъ мѣстномъ разслабленіи сосудовъ заднепроходной кишки, (Alberti diss. de haemorrh. haeredit) и, по моему мнѣнію, во врожденной сильной раздражительности и слабости всей кровоносной системы; сюда же причислить можно и венозное тѣлосложеніе.

Нѣтъ сомнѣнія, что дѣти весьма часто наслѣдуютъ послѣ родителей хилое тѣлосложеніе вмѣстѣ съ расположеніемъ къ различнымъ недугамъ (*); но сіе наслѣдственное расположеніе къ болѣзни не есть еще самая болѣзнь, произрожденію которой, какъ извѣстно, можно совершенно воспрепятствовать, подобно тому какъ нравственные наслѣдственные пороки дѣтей искореняются благоразумною умѣстною строгостію и рачительнымъ воспитаніемъ подъ руководствомъ здраваго разсудка. Многіе были рождены отъ дряхлыхъ гемороидалистовъ, но болѣзни сей никогда не имѣли, потому что надлежащій образъ жизни, вовсе отличной отъ родительскаго, не допустилъ, чтобы явное наслѣдственное расположеніе превратилось въ самую болѣзнь. И такъ крайне погрѣшаютъ тѣ, которые, вмѣсто благовремен-

(*) Нынѣ въ особенности.

наго отвращенія произрожденія у нихъ почечуя, съ намѣреніемъ и насильственнымъ образомъ оный производятъ и побуждаютъ, потому только, что почечуй въ родѣ ихъ есть наслѣдственный.

§ 10.

Почечуй или *геморой повсемственный* или какъ нѣкоторые не изъ Врачей называютъ *нутренной* (Allgemeine Haemorrhoiden) означаетъ у извѣстныхъ писателей (*) обыкновенно такое сложное болѣзненное расположеніе организма, которое можетъ существовать вовсе безъ истеченія крови или слизи и безъ шишекъ въ проходѣ. Они полагаютъ, что сіе болѣзненное расположеніе можетъ иногда разрѣшаться проходомъ, и въ семъ случаѣ цѣлительная сила натуры якобы совершенно достигаетъ своей цѣли, когда послѣдуетъ текучій геморой; несовершенно же, когда только шишки въ проходѣ появятся. Иногда, по мнѣнію ихъ, сіе болѣзненное расположеніе разрѣшается вовсе другими болѣзнями, на пр: переходитъ въ сильную одышку, въ кровотеченіе изъ разныхъ частей тѣла, въ ипохондрію, подагру, каменную болѣзнь, водяную и въ разныя сыпи. Нижеслѣдующіе припадки причисляются къ такъ называемому повсемственному геморою: боль и тяжесть

(*) *Dreyssig's* Handbuch der Pathologie der cronisch. Krankh. 1796. Richter's specielle Therapie T. III. 1815.

въ разныхъ членахъ тѣла, пустота и круженіе въ головѣ, шумъ въ ушахъ, сверканіе и черныя пятна передъ глазами, одышка при всходѣ на лѣстницу, насморкъ и кашель безъ всякой внѣшней причины; трепетаніе сердца, временной ознобъ по всему тѣлу, или ощущеніе жара, разливающагося по жиламъ; лице поблекшее, желтоватое; зудъ кожи, зубная боль, кровотеченіе изъ носу или изъ гортани; фіалки на лицѣ или такъ называемый мѣдный носъ и проч.

Но я съ своей стороны полагаю, что повсемственный почечуй вовсе не существуетъ и что здѣсь одна только отдаленная и разнымъ болѣзнямъ общая причина или одно только расположеніе къ почечую принято за дѣйствительную гемороидальную болѣзнь, въ чемъ каждый, думаю, со мною согласится, когда разсмотритъ сказанное въ § 31 на счетъ явленій, обнаруживающихъ венозное тѣлосложеніе и тѣхъ припадковъ, кои бываютъ слѣдствіемъ сего тѣлосложенія.

§ 11.

Геморой или *почечуй внезапно скрывшійся* или *вдругъ задержанный* (Haem. supressae) называется, когда привычное гемороидальное теченіе вдругъ прекращается и больный вмѣстѣ съ тѣмъ подвергается жестокимъ припадкамъ, каковы суть: жестокая колика въ животѣ, одышка, подагра, судороги и проч.; когда гемо-

роидальныя шишки въ проходѣ вдругъ исчезнутъ и слѣдуютъ за симъ вышеупомянутые припадки, то сіе причисляется также къ почечую внезапно скрывшемуся. Таковое внезапное прекращеніе почечуя обыкновенно бываетъ отъ жесточайшихъ случайныхъ болѣзней, какъ то: отъ жестокой простуды ногъ и брюха; отъ сильнаго гнѣва и запальчивости или испуга, отъ жестокихъ судорогъ, отъ чрезмѣрнаго разгоряченія спиртуозными напитками или крѣпкими горячительными, гонительными и вяжущими лѣкарствами, отъ неумѣренной верьховой ѣзды, послѣ сильной горячки, водяной болѣзни и прочихъ важныхъ поврежденій въ системѣ кровоносныхъ и чувствительныхъ жилъ.

Сколь въ семъ случаѣ внезапное прекращеніе почечуя дѣйствительно вредно, и сколь притомъ въ мнѣніи своемъ на счетъ сего случая многіе выходятъ изъ границъ и напрасно страшатся прекращенія почечуя, о томъ буду я говорить особенно (§ 33.6.)

§ 12.

Почечуй или *геморой критическій* (Haem. criticae). Подъ симъ разумѣютъ многіе писатели такое появленіе гемороидальнаго истеченія крови и шишекъ въ проходѣ, которое случается только при болѣзненномъ (наслѣдственномъ или въ продолженіи жизни пріобрѣтенномъ) расположеніи всего организма; сей только почечуй, а не другой какой, можетъ отвращать

многія важнѣйшія болѣзни въ тѣлѣ. Когда же почечуй произойдетъ случайно отъ наружнаго или мѣстнаго только поврежденія прямой кишки и ея сосудовъ, то въ такомъ случаѣ за критической онъ не принимается.

§ 13.

Почечуй или геморой въ необыкновенныхъ мѣстахъ или необыкновенными путями открывающійся (Haemor. insolitae viae, anomalae, incongruae). Такъ называются тѣ кровотеченія изъ разныхъ частей тѣла, которыя явленіями своими сходствуютъ съ почечуемъ и кои нерѣдко отъ подобныхъ же причинъ происходятъ. Принято (*), что таковыя кровотеченія могутъ яко бы иногда замѣнять собою почечуйное или гемороидальное истеченіе (Haemor. supplentes). Къ сему роду причисляются: кровотеченіе изъ носу, изъ ушей, изъ легкихъ, изъ желудка (рвота съ кровью), изъ почекъ, изъ мочеваго пузыря, изъ варикозныхъ крововозратныхъ жилъ, изъ разныхъ частей тѣла, какъ то: изъ десенъ, изъ большаго перста правой руки (Richter), изъ подсоска груднаго (Richters observ. chirurg.), изъ пупка (Reil) и изъ всѣхъ прочихъ частей тѣла. Сверхъ того знаменитый Рихтеръ оставляетъ намъ догадку свою, и именно: умирающіе отъ кровавой апоплек-

(*) Alberti Dissertatio de Haemor. Insolitis viis. Richters specielle Therapie.

сіи не суть ли иногда жертвы почечуя, открывшагося необыкновенными путями (въ мозгу)?

Многія кровотеченія изъ вышеупомянутыхъ частей тѣла дѣйствительно имѣютъ сходство съ почечуемъ въ разсужденіи ихъ явленій и причинъ, а иногда и сопровождаются почечуйнымъ теченіемъ или шишками въ проходѣ; также и при лѣченіи оныхъ иногда нужно бываетъ обращать вниманіе на почечуй. По сей причинѣ, по мнѣнію моему, и можно ихъ называть кровотеченіями почечуйнаго свойства, но не собственно гемороидальною или почечуйною болѣзнію. Врачующіе таковыя истеченія не должны выпускать изъ виду всю болѣзненно-измѣнившуюся *кровоносную систему* и мѣстныя причины, на кои въ семъ случаѣ надлежитъ болѣе обращать вниманія, нежели на почечуй и на заднепроходную кишку, что, къ сожалѣнію, весьма часто случается.

На основаніи вышесказаннаго *о гемороѣ въ необыкновенныхъ мѣстахъ* присовокупилъ я въ книгѣ сей описаніе о такъ называемомъ *гемороѣ пузырномъ, открывающемся въ дѣтородныхъ частяхъ* и *легочномъ*, *о гемороидальной головной боли* и *головокруженіи*.

§ 14.

Геморой пузырной (Haem. vesicae urinariae, Cystharmorrhois). Подъ симъ разумѣется обыкновенно судорожное, а иногда и воспаленное состояніе слизистой плевы, и варикозное рас-

ширеніе венъ мочеваго пузыря съ истеченіемъ изъ онаго слизи и крови и съ затруднительнымъ испущеніемъ, а иногда и съ совершеннымъ задержаніемъ мочи. *Гемороемъ* болѣзнь сія названа по сходству ея съ явленіями почечуя и потому, что сей послѣдній нерѣдко сопровождаетъ оную. Сходство и связь сихъ двухъ недуговъ зависитъ отъ ближайшей связи сосудовъ заднепроходной кишки съ сосудами мочеваго пузыря. (Подробное описаніе припадковъ, причинъ и лѣченія пузырнаго гемороя помѣщено будетъ въ § 73).

§ 15.

Геморой дѣтородныхъ частей (Haemorrh. partium genitalium) называется въ такомъ случаѣ, когда дѣтородныя части, какъ-то: матка, рукавъ матки, мужескій стволъ, сѣменные пузырьки, сѣменной канатикъ и шулята подвержены измѣненіямъ, похожимъ своими явленіями и причинами на почечуй, либо составляютъ сочувственный припадокъ почечуя. Сюда принадлежатъ: 1) кровоистеченія изъ мужескаго мочеиспускательнаго канала и *варикозное опуханіе венъ* предстательной желѣзы и мочеиспускательнаго канала (*). 2) Кровоистеченіе изъ

(*) Опухшія вены предстательной желѣзы узнаются сверхъ затрудненія въ испущеніи мочи и по ощущаемой пальцомъ, въ задній проходъ впущеннымъ, мягкой опухоли предстательной желѣзы; также и потому, что катетеръ, въ мочеиспускательный каналъ впу-

рукава маточнаго и варикозное опуханіе венъ и гемороидальный вередъ въ рукавѣ же маточномъ. 3) Сосудистая опухоль вокругъ отверстія женскаго мочеиспускательнаго канала (*). 4) Отвердѣніе клетчатой плевы во всю длину женскаго мочеиспускательнаго канала;—Кларкъ происхожденіе сего припадка приписываетъ расширенію венъ сей части (**). 5) *Гемороидаль-*

щенный, останавливается въ семъ мѣстѣ; варикозное же расширеніе венъ въ мочеиспускательномъ каналѣ узнается изъ того, когда больной въ извѣстное время (періодическое) не можетъ мочиться, въ каналѣ чувствуетъ боль, и когда катетеръ не проходитъ свободно.

(*) Ch. Clarke (über die Krankheiten des Weibes) замѣтилъ у нѣсколькихъ молодыхъ женщинъ таковую опухоль, которая имѣла зернистую свѣтло *шарлаховаго* цвѣта наружность и была столь подвижна, что какъ будто къ мочевому каналу вовсе не прикрѣплялась. Она сопровождалась истеченіемъ слизи изъ рукава матки, при осязаніи причиняла сильную боль и при малѣйшемъ поврежденіи испущала изъ себя свѣтло-красную кровь (§ 80).

(**) Припадокъ сей обнаруживается опухолью темнокрасноватаго цвѣта и болью при осязаніи сей части и при супружескомъ соитіи. Истеченіе слизи, вѣроятно, изъ мочеиспускательнаго канала и маточнаго рукава сопровождаетъ сію отвердѣлость. Когда больная ходитъ, то сосуды становятся толще; тогда ощущается въ сей части полнота, чего при лежачемъ положеніи почти не бываетъ; также понужденіе и

ный перелой (*триллерЪ* или *гонорея*) не отЪ венерической заразы (§ 81). 6) *КатаррЪ* или *сильный судорожной нудЪ матки* и *рукава маточнаго* у женщинЪ (§ 81). 7) *Рожелодобныя воспаленія* и *ранки отЪ разрыва воспаленныхЪ* и *варикозныхЪ венЪ* около прохода, также на стволѣ и мошонкѣ у мущинЪ, и вЪ рукавѣ матки у женщинЪ, похожія на венерическія *шанкры*. Таковыя ранки бываютЪ также сЪ возвышенными краями какЪ *шанкры*, но отличаются отЪ венерическихЪ *шанкровЪ* тѣмЪ, что не бываютЪ покрыты густою, желтою матеріею и не такЪ скоро расширяются, и тѣмЪ еще, что венерическіе шанкры легко излѣчиваются *меркуріемЪ*, которой для геморoидальныхЪ ранокЪ бываетЪ всегда вреденЪ. 8) *Ночные пріапизмы* или ночныя болѣзненныя напряженія уда и *сонныя грѣзы* (§ 84). 9) *Боль сЪ опухолью вЪ сѣменныхЪ пузыркахЪ, вЪ сѣменномЪ канатикѣ* и *вЪ шулятахЪ*. Замѣчено, что вены сѣменныхЪ пузырковЪ и около оныхЪ расположенныя, иногда вздуваются и образуютЪ варикозныя опухоли, похожія снаружи иногда на грыжу. Сія венозная опухоль, стѣсняя сѣменноизвергательный протокЪ (Ductus ejaculatorius), препятствуетЪ изверженію сѣмени во время соитія. *Крейзигъ* замѣтилЪ у одного мо-

нудъ къ безпрерывному испущенію мочи, какъ днемъ, такъ и ночью, составляетъ несносной припадокъ сей болѣзни.

лодаго многокровнаго гемороидалиста таковую опухоль, ежемѣсячно снаружи надъ пахомъ на подобіе грыжи появлявшуюся и почти всякой разъ полюціями сопровождаемую. Помянутый авторъ узналъ, что у сего гемороидалиста сѣмя истекало не во время соитія, но послѣ онаго въ ночи въ сопровожденіи пріапизма. Съ таковымъ припадкомъ, описаннымъ *Крейзихомъ*, и мнѣ извѣстны нѣсколько гемороидалистовъ, которые, по мнѣнію моему, и кажутся быть отъ того неспособными къ зарожденію дѣтей.

10) *Кровавый пузырекъ на наружномъ отверстіи мочеиспускательнаго мужескаго канала.* Сей припадокъ замѣтилъ я въ прошломъ году у одного молодаго гемороидалиста, у котораго почти каждый мѣсяцъ регулярно появлялся на вышеупомянутомъ мѣстѣ тоненькой пузырекъ, наполненный кровію и непричиняющій никакой боли. Пузырекъ сей лопается самъ собою и по изверженіи капель трехъ крови заживаетъ безъ всякой врачебной помощи.

Болѣзненныя явленія, подразумѣваемыя подъ именемъ *гемороя дѣтородныхъ частей*, основываются вообще на разслабленіи и болѣзненной раздражительности дѣтородныхъ частей при какомъ либо сильно и долго на оныя дѣйствующемъ раздраженіи, на судорожномъ движеніи, на сильномъ приливѣ, застоѣ и остротѣ соковъ. Они случаются большею частію у лю-

дей чувствительныхъ, сидячую жизнь ведущихъ и содержащихъ дѣтородныя свои части въ великой неопрятности, у людей похотливыхъ, упражнявшихся съ дѣтства въ рукоблудіи (онаніи) и рано начавшихъ обращаться съ женщинами; также у тѣхъ, кои имѣли частые *трипперы*, и кои разными возбуждающими, горячащими и мочегонными лѣкарствами и напитками сильно раздражили дѣтородныя части; и наконецъ у людей, часто простуживающихъ ноги и дѣтородныя части и у подверженныхъ ломотѣ, подагрѣ и каменной болѣзни (о лѣченіи геморoя дѣтородныхъ частей см. § 77).

11) *Сыпь съ несноснымъ зудомъ и вонючій потъ въ наружныхъ дѣтородныхъ частяхъ.*

О причинахъ почечуя или геморoя.

§ 16.

Все, что споспѣшествуетъ болѣзненному измѣненію жизненной дѣятельности и органической прочности въ плевахъ и сосудахъ прямой кишки, что усиливаетъ приливъ и чрезмѣрное накопленіе крови во внутреннихъ и внѣшнихъ геморoидальныхъ сосудахъ и воспящаетъ свободному въ оныхъ обращенію крови и что насильственно вытѣсняетъ изъ сихъ сосудовъ кровь, все то почитать надобно и за причину геморoя. Сюда, яко предрасполагающія причины, принадлежатъ также: венозное тѣлосло-

женіе или болѣзненно измѣненная система венъ, чрезмѣрная раздражительность либо притупленная чувствительность въ органахъ брюшныхъ и наконецъ врожденное расположеніе къ почечую. Въ нижеслѣдующихъ §§ будетъ объяснено, какимъ образомъ каждая изъ сихъ причинъ въ особенности на произведеніе почечуя дѣйствуетъ.

§ 17.

Пища горячительная, на пр: мясная, съ пряностями приготовляемая, крѣпкой кофе, шоколадъ, ликеры, пуншъ, крѣпкія вина и портеръ, безъ нужды въ излишествѣ и продолжительное время употребляемыя, особливо при сидячей жизни и при недостаточномъ питіи воды, производятъ: полносочіе, жаръ и наклонность къ воспаленію въ органахъ брюшной полости; сосуды, чрезмѣру питательнымъ сокомъ и кровію наполненные, сильно раздражаются; въ особенности брюшныя вены, сильно вздуваясь, увеличиваются какъ въ своемъ діаметрѣ, такъ и въ длину, а иногда даже и воспаляются. Преимущественно же умножаются въ брюхѣ венозная кровь и преизобилующее въ ней количество угольнаго и водотворнаго вещества. Слѣдствіемъ таковаго пресыщенія бываетъ обыкновенно: несвободное обращеніе крови въ брюшной полости, тѣлосложеніе переходитъ въ венозное и оказываются завалы чревныхъ внутренностей (обструкціи), ипохондрія, меланхо-

лія, подагра, каменная и водяная болѣзнь и т. п. Посему самая лучшая пища и лучшіе напитки могутъ быть вредны, когда будутъ во зло употребляемы.

§ 18.

Сидячая жизнь и недостатокъ въ тѣлодвиженіи вообще.

При продолжительномъ сидѣніи, особливо въ согбенномъ на передъ положеніи, кишки и внутренности съ ихъ сосудами въ брюшной полости сдавливаются, свободное кругообращеніе и отдѣленіе соковъ воспящается, отъ чего, а равно и отъ недѣятельности мышицъ, особенно брюшныхъ, дѣлается застой соковъ, недостаточное изъ питательнаго сока переработываніе крови и таковое же недостаточное вредныхъ и излишнихъ соковъ изверженіе изъ тѣла какъ низомъ и мочею, такъ и испареніемъ.

По сей причинѣ почечую подвержены болѣе всего люди ученые, приказные, карточные игроки, городскіе и деревенскіе домосѣды; праздные и лѣнивые люди и мастеровые, сидя работу свою производящіе; къ сему же относится также вредная привычка оставлять малолѣтныхъ дѣтей долгое время на стульчакѣ и позволять имъ напрасно крехтѣть. Сюда принадлежатъ и тѣ взрослые, кои, закуривъ трубку съ табакомъ, любятъ по цѣлому часу сидѣть на суднѣ, и вмѣсто того, чтобъ обратить всѣ мысли свои на натуральные позывы къ испражненію

и онымъ спомоществовать, углубляются въ размышленія совсѣмъ посторонніа.

Нѣкоторые писатели увѣряютъ, что и продолжительное стояніе на ногахъ причиняетъ почечуй. Но сіе нахожу я возможнымъ только тогда, когда стоящій не будетъ перемѣнять своего положенія. По крайней мѣрѣ мнѣ изъ 23 хъ лѣтней службы моей по военному вѣдомству извѣстно, что солдаты, жизнь свою большею частію на ногахъ провождающіе, крайне рѣдко подвергаются почечую.

Впрочемъ ежедневный опытъ научаетъ насъ, что недостатокъ въ тѣлесномъ движеніи наиболѣе вредитъ тому, кто прежде велъ жизнь дѣятельную (Vita exercitata), кто смолода часто пользовавшись тѣлодвиженіемъ на свѣжемъ открытомъ воздухѣ, потомъ вдругъ начнетъ жить въ покоѣ и нѣгѣ (Vita sedentaria), употребляя сильно питательную и горячащую пищу, — что часто случается съ людьми, перемѣнившими, на пр: военную службу на статскую, съ людьми, кои по бѣдности или по другимъ причинамъ сдѣлали привычку много ходить пѣшкомъ и кои послѣ разбогатѣвъ или сдѣлавшись большими господами, вдругъ стали ѣздить въ экипажахъ съ гибкими ресорами и предались совершенной недѣятельности и т. д. Отъ таковой скорой перемѣны человѣкъ неукоснительно почувствуетъ полноту въ брюхѣ и надутіе онаго вѣтрами и затруднительность въ ды-

ханіи; соки его въ брюхѣ будутъ медленнѣе кругообращаться, и онъ начнетъ тучнѣть; изъ веселаго дѣлается пасмурнымъ и брюзгливымъ и ставъ полнокровнымъ и склоннымъ къ запору, включается наконецъ въ число гемороидалистовъ. Таковымъ же образомъ поселянинъ и мастеровый дѣлаются больными, когда сидятъ сложа руки и ведутъ жизнь недѣятельную.

Солдатъ подвергается цынгѣ, лихорадкѣ и другимъ болѣзнямъ, когда послѣ похода, послѣ маневровъ вдругъ заляжетъ въ покойной своей кантонирь-квартирѣ и оставленъ будетъ безъ всякаго занятія. Тоже случается и съ матрозомъ, когда послѣ шторма на морѣ или послѣ работы на сушѣ предается сну и лѣни.

§ 19.

Частые продолжительные и упорные *запоры на низъ* бываютъ одною изъ главнѣйшихъ причинъ почечуя. Густые, сухіе и жесткіе экскременты (калъ) на подобіе козьяго помета или катышки, накопляющіеся въ заднепроходной кишкѣ, чрезмѣрно расширяютъ и раздражаютъ оную (механически и химически), притупляя чувствительность ея волоконъ, слизистой плевы и сосудовъ. Въ семъ случаѣ жесткіе экскременты неиначе испражняются, какъ съ чрезвычайнымъ напряженіемъ, а потому и насильственное вытѣсненіе крови въ самые

крайніе и наружные геморoидальные сосуды, равно и органическое поврежденіе плевъ и сосудовъ заднепроходной кишки бываютъ обыкновеннымъ сего послѣдствіемъ. О вредѣ отъ вѣтровъ, при запорѣ задерживаемыхъ въ проходной кишкѣ, говорено будетъ въ § 24 (*).

§ 20.

Сильныя слабительныя и чистительныя во зло употребляемыя *лѣкарства* (на пр: сабуръ, колоцинты, жизненная эссенція и проч. и крѣпкіе *клистиры,* также крѣпкія горькія и вяжущія *аппетитныя капли* или настойки, во зло употребляемыя, вредятъ кишечному каналу и располагаютъ къ почечую, о чемъ ниже сего сказано будетъ; см. § 41 объ отвращеніи запора нанизъ.

§ 21.

Сильное и продолжительное *давленіе на заднепроходную кишку,* беременною маткою и случающимися въ ней опухолями причиняемое,

(*) Люди, слишкомъ упорнымъ и продолжительнымъ запорамъ нанизъ подверженные, имѣютъ причину подозрѣвать у себя съуженіе заднепроходной кишки (Strictura intest. Recti) — одна изъ важнѣйшихъ причинъ упорныхъ и большею частію смертельныхъ запоровъ. И потому въ особенности нужно имъ обратить вниманіе на сказанное мною въ § 57 на счетъ чрезвычайнаго съуженія заднепроходной кишки и употребить въ пользу свою преподанный мною въ § 41 совѣтъ на счетъ отвращенія упорныхъ запоровъ низомъ.

бываетъ иногда причиною почечуя у женщинъ, большею частію нѣсколько лѣтъ сряду трудно рожавшихъ. Сіе механическое давленіе сильно прижимаетъ заднепроходную кишку къ крестцовой кости, воспящаетъ свободному обращенію крови въ гемороидальныхъ сосудахъ, вытѣсняя оную въ самыя конечности сосудовъ, и задерживаетъ въ кишкахъ густые экскременты и вѣтры.

§ 22.

Завалы, опухоли и *затвердѣнія брюшныхъ внутренностей* (obstructio, empraxis, induratio viscerum abdom.), воспящая свободное движеніе питательнаго сока, пасоки и крови въ брюшной полости, и въ особенности механически задерживая кругообращеніе крови въ вратожильной системѣ, бываютъ причиною почечуя, то есть: непомѣрнаго накопленія крови и вытѣсненія оной въ самые конечные гемороидальные сосуды. Таковые завалы или *обструкціи* суть слѣдствія органической разстройки въ млечныхъ или пасочныхъ и крововозвратныхъ сосудахъ, въ желѣзахъ брыжейки и въ другихъ брюшныхъ внутренностяхъ, дѣлающихся рыхлыми или неестественно плотными, затвердѣлыми и производящими жирныя, сумочныя и слизистыя опухоли, срастѣнія и даже нагноенія.

По мнѣнію *Г. Пухельта*, завалы и увеличенія чревныхъ внутренностей въ существѣ

своемъ ничто иное суть, какъ продолжительный венозный приливъ и накопленіе крови (congestio venosa) и питаніе органовъ отъ *венъ*.

§ 23.

Разстройство въ кишечномъ каналѣ относительно къ причинѣ гемороидальной болѣзни состоять можетъ: либо въ болѣзненной чувствительности нервовъ, чрезмѣрной раздражительности мышечныхъ волоконъ желудка и кишекъ и въ усиленномъ перистальтическомъ движеніи сихъ послѣднихъ; либо напротивъ въ разслабленіи и нечувствительности кишечнаго канала (atonia, torpor) и лѣностномъ дѣйствіи или уменьшенномъ движеніи кишекъ. Въ первомъ случаѣ почечуй большею частію сопровождается поносомъ, тошнотою, рвотою, частою коликою въ животѣ; а въ послѣднемъ упорными запорами на низъ. У людей съ разстроеннымъ пищевареніемъ часто бываетъ невареніе пищи (индижестія), давленіе подъ ложкою, непріятное ощущеніе во время пищеваренія въ желудкѣ, вздутіе желудка вѣтрами и частая отрыжка; они суть обыкновенно *кандидаты* гемороидальной болѣзни.

§ 24.

Чрезмѣрныя накопленія въ кишечномъ каналѣ вѣтровъ или *гасовъ* (угольнаго, азота и воспламеняющагося), причиняя непомѣрное расширеніе и раздраженіе въ кишкахъ, прижимаютъ млечные и кровоносные сосуды и про-

изводятъ сильное затрудненіе въ обращеніи соковъ. Сверхъ расположенія къ почечую, отъ сего происходящаго, *вѣтры* производятъ колику въ животѣ, боль въ поясницѣ, въ бокахъ надъ почками и въ пузырной части. Они, расширяя и раздражая 12 дюймовую кишку, располагаютъ человѣка иногда и къ желтяницѣ и зарожденію камня въ печени. *Вѣтры*, поднимаясь вверхъ, иногда раздуваютъ непомѣрно желудокъ и раздражая сосудисто-нервныя и мышечныя волокны желудка и частей, съ нимъ сочувственныхъ, причиняютъ жестокую боль въ желудкѣ (cardialgia), сопровождаемую иногда обморокомъ. Они причиняютъ также нерѣдко судорожное сжатіе горла и острую колючую боль въ груди (pleuritis Spuria), столь иногда жестокую, что больному кажется, какъ будто его ножами въ сердце колютъ (*). Спершіеся вѣтры бываютъ иногда причиною сильнаго прилива крови къ головѣ и крайне непріятнаго чувства въ затылкѣ; а нерѣдко причиняютъ и гемороидальную чревную тоску. Отъ вѣтровъ дѣлаются нерѣдко: жестокая икота, смертельный родимецъ у дѣтей; у взрослыхъ же падучая болѣзнь, истерическія судороги и столбнякъ. *Ворчаніе* (и пискъ) въ кишечномъ кана-

(*) Можно легко ошибиться и принять сей припадокъ за воспаленіе въ легкихъ и предписать больному напрасное кровопусканіе.

лѣ есть также послѣдствіе вѣтровъ. Сей тягостной припадокъ происходитъ, когда перистальтическое движеніе въ которой либо части кишекъ отъ разслабленія пріостановится, либо отъ судорожнаго движенія сдѣлается превратнымъ и отъ того гасы, устремляясь въ высшую часть кишки сквозь нистекающую жидкость, производятъ ворчаніе. Тоже самое случается, когда жидкости изъ нижнихъ частей кишекъ судорожнымъ движеніемъ выдавливаются въ верхнія.

§ 25.

Многокровіе (полнокровіе) принимается за причину почечуя отдаленную и предрасполагающую. При излишествѣ крови сосуды сильно раздражаются и расширяются; дѣлаются сильные напоры крови къ частямъ слабѣйшимъ, отъ чего разслабленіе сосудовъ и извѣстное органическое поврежденіе оныхъ, излишество крови и кровь густая, вязкая и слѣдственно въ высочайшей степени *венозная* располагаютъ *вены* къ извѣстной узловатой напруженности или расширенію (varicositas) и бываютъ причиною почечуя (*).

По сей причинѣ люди крѣпкаго тѣлосложенія, кои пресыщаются пищею сочною, питательною и употребляютъ напитки горячащіе

(*) *Pohl* r. Menz de varice intern. morborum guorundam causa 1783. pag 11.

(см. о пресыщеніи горячащею пищею § 18), могутъ почитать себя кандидатами гемороидальной болѣзни, особливо когда при вышеобъясненной невоздержности ведутъ они сидячую жизнь.

§ 26.

Болѣзненно-измѣненная кровоносная система. Врачующіе гемороидальную болѣзнь должны обращать особенное вниманіе на сію причину, поелику она имѣетъ большое вліяніе на произрожденіе различныхъ болѣзней, кои въ тѣсной состоятъ связи съ почечуемъ и при коихъ сей послѣдній большею частію бываетъ уже болѣзнію припадочною (симптоматическою). Сему же измѣненію сосудовъ приписать должно частое періодическое возобновленіе гемороидальныхъ приступовъ, зависящихъ отъ вліянія атмосферы и другихъ динамическихъ причинъ. Сюда принадлежатъ: потерянное равновѣсіе въ дѣятельности системы кровоносныхъ сосудовъ вообще, сверхъестественная раздражительность и чувствительность боевыхъ сосудовъ и ихъ конечностей, притупленная чувствительность и раздражительность кровоносныхъ сосудовъ вообще; сюда же относится напослѣдокъ и венозное тѣлосложеніе.

§ 27.

У гемороидалистовъ въ особенности уклоняются отъ естественнаго состоянія: крововозвратные сосуды (вены), и именно: *воротная, селезеночная, брыжеечная* большая и меньшая,

геморoидальныя внутреннія и наружныя и другія близьлежащія сплетенія венъ. *Пухельтъ* почитаетъ воротную систему (systema venae portarum) средоточіемъ гемороидальной болѣзни. *Крейзигъ* также говоритъ, что при гемороидальныхъ припадкахъ всегда страждетъ и вся система воротной жилы и что болѣзненное состояніе сей послѣдней обнаруживается большею частію у задняго прохода. Всѣ сіи сосуды 1) либо чрезмѣрно въ которомъ нибудь мѣстѣ расширяются, накопляютъ въ себѣ много крови, медленно ее кругообращаютъ, а иногда движутъ оную совсѣмъ превратно, т. е., изъ воротной въ селезеночную, въ брыжеечныя, въ гемороидальныя вены и прижимаютъ части, близь нихъ лежащія; гемороидальныя вены, въ особенности страдая подъ тяжестію чревныхъ внутренностей, отъ расширенія своего слабѣютъ, разрываются и изливаютъ кровь. 2) Либо воспаляются, и въ семъ случаѣ смыкаются и засоряются, или походятъ на отдѣльный органъ (organ. secret.) и отдѣляютъ матерію, гною подобную или слизь. 3) Либо находятся въ полупаралич-номъ состояніи, т. е., не имѣютъ достаточно естественной раздражительности и силы кругообращательной; слѣдствіемъ сего бываютъ слабое и медленное обращеніе и застои крови.

Причиною таковаго уклоненія *венъ* отъ естественнаго своего состоянія большею частію бываетъ: a) венозное тѣлосложеніе, b) мѣст-

ное врожденное или въ жизни уже пріобрѣтенное разслабленіе брюшныхъ органовъ, служащее основаніемъ чрезмѣрному въ оныхъ накопленію венозной крови (congestio venosa), c) мѣстное раздраженіе, располагающее къ сильному накопленію крови въ тонкихъ волосяныхъ конечностяхъ боевыхъ сосудовъ (congestio arteriosa), и наконецъ d) наклонность вышеупомянутыхъ крововозвратныхъ сосудовъ къ накопленію въ себѣ крови, къ расширенію и поврежденію много зависитъ также и отъ естественныхъ причинъ. Въ возмужалости, на пр:, между 26 и 40 годомъ, сила боевыхъ сосудовъ достигаетъ высочайшей степени, а сила венъ въ семъ періодѣ приходитъ въ упадокъ; отъ сего теряется равновѣсіе ихъ въ дѣятельности и самый напоръ и накопленіе крови въ слабѣйшіе бываетъ тѣмъ сильнѣе.

§ 28.

Сверхъестественная раздражительность и чувствительность боевыхъ сосудовъ (Erethysmus arteriosus) какъ причина геморoидальной болѣзни. Въ семъ состояніи малѣйшее умноженіе крови, малѣйшее измѣненіе динамическихъ вліяній магнитной и электрической силы, лѣкарство или вино, едва ощутительное раздраженіе причиняющее и т. п. чрезмѣрно усиливаютъ дѣйствіе сосудовъ, приводятъ кровь въ волненіе и напираютъ къ частямъ тѣла болѣе раз-

слабленнымъ. Въ семъ-то раздражительномъ состояніи сосудовъ должно полагать главнѣйшую причину и столь частыхъ кровохарканій и другихъ кровотеченій, въ связи съ почечуемъ иногда состоящихъ.

Человѣка съ симъ болѣзненнымъ состояніемъ кровоносной системы узнать можно: по красному лицу, по сильному приливу крови къ головѣ, по головокруженію, частой головной боли, особливо въ затылкѣ, по волненію въ крови и по частому теченію оной изъ носу, изъ гортани, изъ гемороидальныхъ и другихъ сосудовъ при каждомъ сильномъ разгоряченіи, также по летучему (нервическому) въ тѣлѣ жару и по трясенію членовъ. О семъ говорено будетъ въ § 67.

§ 29.

Притупленная раздражительность и чувствительность кровоносныхъ сосудцовъ (Atonia vasorum vel minor in sangvinem Resistentia, reactio) бываетъ причиною почечуя въ такомъ именно случаѣ, когда кровь отъ ослабленія венозной силы и мышечныхъ волоконъ будетъ a) кругообращаться съ большею медленностію, b) накопляться и застаиваться въ разслабленныхъ и засоренныхъ сосудахъ, и c) когда сосуды, сильно отъ сего расширяясь и разрываясь, производятъ истеченіе крови въ клетчатую плеву или въ полости тѣла, какъ о семъ выше упомянуто.

Таковое разслабленіе или притупленное состояніе сосудовъ обнаруживается: блѣдною кожею, надутостію клетчатой плевы, холодомъ, слабымъ и медленнымъ пульсомъ, стѣсненнымъ дыханіемъ при небольшомъ движеніи, тучностію тѣла, и сверхъ почечуя больной легко подвергается разслабленію всего кишечнаго канала, худосочію, ломотѣ, а иногда и судорожнымъ болѣзнямъ. У таковыхъ субъектовъ кровь, животная теплота, магнитная и электрическая силы не возбуждаютъ уже въ обыкновенной степени сосудовъ и т. д.

§ 30.

Болѣзненно-измѣненная нервная система посредствомъ сосудистыхъ нервовъ способствуетъ немало къ произрожденію почечуя и усугубленію его приступовъ. Она бываетъ иногда и причиною какъ чрезвычайно усилившагося кровотеченія, подвергающаго нерѣдко человѣка опасности изойти кровью, такъ и внезапнаго остановленія онаго (Haemor. suppressae), на пр: отъ чрезмѣрнаго возмущенія духа, отъ сильнаго гнѣва или испуга и отъ судорожныхъ движеній.

Измѣненная органическая сила нервовъ у гемороидалистовъ познается именно по великой наклонности ихъ къ гнѣву, къ страху, къ ипохондріи, меланхоліи и истерикѣ; также изъ того, что гемороидалистъ становится слишкомъ чувствителенъ ко внѣшнимъ динамиче-

скимъ вліяніямъ, на пр: къ дѣйствію луны, свѣта, магнитной и электрической силы, равнымъ образомъ и къ перемѣнамъ погоды, и дѣлается, такъ сказать, живымъ барометромъ, съ точностію опредѣляющимъ напередъ погоду.

Бываютъ (хотя рѣдко) и такія тѣлосложенія, у которыхъ система кровоносныхъ сосудовъ и нервная система, болѣзненно измѣненная, находятся въ противуположномъ состояніи. Сверхъестественная раздражительность въ боевыхъ сосудахъ можетъ случиться независимо отъ сверхъестественной раздражительной нервной системы, равно какъ и сверхъестественная возвышенная чувствительность и раздражительность нервовъ (Erethismus nervosus) можетъ быть независима отъ раздражительности кровоносныхъ сосудовъ. Какъ въ первомъ случаѣ стаканъ вина, порція крѣпкаго кофе или шоколаду разгорячаютъ, усиливаютъ кругообращеніе крови, причиняютъ напоръ оной къ какой либо части слабѣйшей или производятъ искусственную горячку, не дѣлая впрочемъ нималѣйшей перемѣны въ нервной системѣ и не производя никакихъ нервическихъ припадковъ: такъ точно и напротивъ люди, съ системою нервовъ сверхъестественно раздраженною, подверженные въ большой степени истерикѣ, ипохондріи, страдающіе иногда отъ нечаяннаго прикосновенія мухи судорогами или проливающіе ручьями слезы при звукѣ строй-

ной музыки, могутъ имѣть большую крѣпость мускуловъ, переносить тяжелую работу и пройти до 20 верстъ пѣшкомъ, не чувствуя усталости. Сильные нервическіе ихъ припадки не имѣютъ вліянія на раздраженность системы кровоносныхъ сосудовъ.

§ 31.

Венозное тѣлосложеніе наиболѣе располагаетъ человѣка къ почечую. Оно основывается на превозвышеніи венозной системы (gesteigerte venosität. orgasmus venar.) и на большомъ избыткѣ въ крови угольнаго и водотворнаго веществъ (Puchelt, das Venen-System in seinen krankhaften Verhältnissen, Leipzig 1818). Отъ венознаго тѣлосложенія зависятъ два темперамента: *холерическій* (черножелчный или холерико-меланхолическій) и *флегматико-венозной*. *Холерическій темпераментъ* узнается изъ желтозеленоватаго, смуглаго и какъ бы замараннаго лица, изъ тѣла, хотя и хорошо напитаннаго, но нетучнаго; таковые субъекты бываютъ чрезмѣру чувствительны и слишкомъ способны къ воспріятію внѣшнихъ впечатлѣній и къ судорогамъ, также къ припадкамъ истерическимъ и ипохондрическимъ. Система боевыхъ сосудовъ бываетъ у нихъ слишкомъ раздражительна, и потому они часто чувствуютъ волненіе въ крови. Въ особенности они подвержены также припадкамъ отъ страданія въ печени и отъ желчно-кровяныхъ отдѣленій.

Флегматико-венозной темпераментъ узнается по лицу надутому и блѣдному, по наклонности къ тучности и мокротамъ, тѣлу лѣнивому, хотя и небезсильному, по нраву большею частію спокойному и равнодушному и т. д.

Признаки или явленія *венознаго тѣлосложенія*, предвѣщающіе обыкновенно начало болѣзней (о коихъ ниже говорено будетъ и кои происходятъ отъ венознаго тѣлосложенія), суть: здоровый цвѣтъ лица измѣняется и дѣлается блѣднымъ, какъ будто замараннымъ, съ желтизною въ глазномъ бѣлкѣ; пищевареніе производится медленно, слабо и неправильно; аппетитъ иногда бываетъ неестественно великъ, иногда же весьма малъ или почти неощутителенъ; вкусъ во рту необыкновенный, жажда оказывается еще при тощемъ желудкѣ, языкъ покрытъ отчасти слизью и особливо къ корню желтоватъ; брюхо надувается часто вѣтрами; въ ложечкѣ (надъ желудкомъ) и въ бокахъ (Hypochondria) ощущается нѣчто тягостное, какъ то: давленіе, щемленіе и тоска, особливо во время пищеваренія; больной чувствуетъ скоропреходящія боли то въ желудкѣ и брюхѣ, то въ спинѣ, поясницѣ, либо въ головѣ, въ рукахъ и ногахъ; испражненія низомъ становятся неправильными, то есть, иногда изобильны и жидки, иногда же недостаточны; по временамъ появляются легкія безпорядочныя лихорадочныя

движенія; сонъ не доставляетъ успокоенія, хотя сонливость бываетъ почти безпрерывная съ зѣвотою и потяготою; больный дѣлается унылымъ, пугливымъ, страшится предстоящей ему болѣзни и чувствуетъ даже судорожныя движенія членовъ.

Припадки сіи, какъ извѣстно, продолжаются нѣсколько лѣтъ, къ обѣду всегда ожесточаются, а послѣ употребленія пищи или вина облегчаются; больный тучнѣетъ и лице надувается. Всѣ сіи явленія хотя и показываютъ, что человѣкъ нездоровъ, но опредѣлительно и явственно еще не доказываютъ, какая именно болѣзнь отъ таковаго (венознаго) тѣлосложенія послѣдуетъ (*).

Болѣзни, *венозному тѣлосложенію* наиболѣе свойственныя, суть: наклонность *венъ* къ узловатой напруженности и расширенію (praedispositio ad varicositatem) (**); почечуй (те-

(*) Вотъ, по мнѣнію моему, источникъ *повсемственной геморoидальной болѣзни* (см. § 10) и причина, приводящая въ заблужденіе не только многихъ больныхъ, неумѣющихъ объяснить болѣзненнаго своего состоянія, но и нѣкоторыхъ Врачей, немогущихъ истолковать, отъ чего бываетъ иногда такое множество болѣзненныхъ явленій безъ всякой видимо и совершенно образовавшейся болѣзни. Вотъ почему нерѣдко приписываютъ почечую хворости у тѣхъ людей, у которыхъ онаго вовсе нѣтъ.

(**) Франкъ причиною таковаго предрасположенія полагаетъ разслабленное состояніе венозной системы.

кучій, закрытый и мокротный), завалы въ органахъ чревной полости, особливо въ печени; рвота съ кровію, рвота или поносъ съ желчію или съ черною кровію; разстроенное пищевареніе съ надутіемъ брюха вѣтрами; ломота и самая подагра; ипохондрія, истерика.

Ежели гемороидальная болѣзнь, измѣняясь иногда подъ многоразличными видами, принимаетъ видъ подагры или ломоты вообще (Arthritis) и мѣняется съ ипохондріею, истерикою и каменною болѣзнію, и ежели всѣ сіи болѣзни, соединенныя большею частію съ завалами и затвердѣніями чревныхъ внутренностей, принимаются многими писателями за болѣзнь одного и того же свойства: то въ семъ они нимало не погрѣшаютъ, ибо общій источникъ сихъ болѣзней есть, какъ выше сказано, *венозное тѣлосложеніе* или болѣзненно-возвышенная венозная система.

Предсказаніе о почечуѣ или геморроѣ.

§ 32.

Почечуй или геморой, бывающій отъ мѣстнаго разслабленія, отъ причинъ неважныхъ, непосредственно дѣйствовавшихъ на заднепроходную кишку и ея сосуды, при крѣпости здоровья относится *къ легкому почечую;* происходящій же отъ повсемственныхъ причинъ, на прим: отъ венознаго тѣлосложенія, отъ болѣзненнаго разстройства въ системѣ крово-

носныхъ сосудовъ и отъ заваловъ въ брюшныхъ органахъ, считается *продолжительнымъ, злокачественнымъ гемороемъ*, который обыкновенно находится въ тѣсной связи съ ипохондріею, ломотою, истерикою и проч. Чѣмъ болѣе почечуй соединенъ съ другими поврежденіями организма и чѣмъ оныя важнѣе, тѣмъ невыгоднѣе, хуже объ немъ предсказаніе. Чѣмъ долѣе тѣлосложеніе человѣка расположено было къ почечую до открытія онаго, чѣмъ ранѣе онъ появится, тѣмъ опаснѣе, ибо въ семъ случаѣ показываетъ онъ большое разстройство во всемъ тѣлосложеніи.

Таковые люди (*) рѣдко достигаютъ старости и обыкновенно умираютъ отъ худосочія, отъ водяной болѣзни и т. п. Чрезмѣру сильное теченіе почечуя сопровождается всякой разъ опасностію. Какъ гемороидалисты, кои ведутъ строгую жизнь и тщательно удаляютъ всѣ отдаленныя и случайныя причины, почечуй ожесточающія, доживаютъ съ нимъ до старости,—такъ и запустившіе оный и ведущіе притомъ жизнь невоздержную, подвергаются разнымъ хроническимъ болѣзнямъ въ печени, селезенкѣ, брыжейкѣ, въ мочевомъ пузырѣ и въ другихъ брюшныхъ органахъ, также ипохондріи, чахлости тѣла, водяной болѣзни, и бываютъ недолговѣчны.

(*) Особливо невоздержно живущіе.

Вреденъ или полезенъ для человѣка почечуй?

§ 33.

Судя по вышесказанному предсказанію о почечуѣ или гемороѣ и по причинамъ, оный производящимъ и вообразивъ причиняемыя имъ страданія, кто бы могъ, кажется, усомниться, что почечуй есть болѣзненное состояніе организма? Но при всемъ томъ многіе считаютъ его естественною и благотворною потребностію организма. Здѣсь намѣренъ я изложить критически, въ какихъ именно случаяхъ почечуй можетъ быть полезенъ организму и на чемъ именно основываются различныя мнѣнія и предразсудки на счетъ всегдашней благотворности почечуя. Справедливость сего критическаго разсмотрѣнія подтверждается какъ собственными моими сужденіями и долголѣтною опытностію, такъ и весьма правдоподобными заключеніями извѣстнѣйшихъ писателей.

1.

Почечуйное или *геморроидальное* истеченіе можетъ иногда быть полезнымъ, когда оно открывается само собою a) у человѣка, крѣпкаго тѣлосложеніемъ, съ возвышенною венозною системою и съ излишествомъ венозной крови, b) у того, кто употребляетъ притомъ въ излишествѣ питательную и горячащую пищу и спиртуозные напитки, c) у подверженнаго силь-

ному приливу крови и раздраженію въ кишкахъ и другихъ чревныхъ органахъ съ наклонностію къ воспаленію. Съ появленіемъ почечуйнаго теченія больный иногда мгновенно получаетъ облегченіе; буде же вышесказанные припадки въ животѣ не сопряжены съ важнымъ поврежденіемъ въ какомъ либо органѣ, то чрезъ сіе истеченіе иногда они совершенно прекращаются. Сіе сильное раздраженіе, мѣстное, такъ сказать, лихорадочное движеніе въ волокнахъ и сосудахъ заднепроходной кишки отвлекаетъ иногда въ семъ случаѣ раздраженіе отъ органовъ живота, гораздо важнѣйшихъ и чувствительнѣйшихъ, на пр: отъ тонкихъ кишекъ, отъ брыжейки и т. д. Почечуйное истеченіе, уменьшая количество крови, отвращаетъ иногда на время опасныя послѣдствія венознаго многокровія и чрезмѣрной раздражительности въ кровоносной системѣ вообще и въ органахъ брюха.

При всемъ томъ замѣтить однакожъ должно, что почечуй, доставляющій иногда вышесказаннымъ образомъ облегченіе, есть самъ по себѣ насильственное вытѣсненіе крови изъ сосудовъ гемороидальныхъ, что сіе кровоистеченіе весьма часто бываетъ безъ всякой потребности въ уменьшеніи количества крови, и что почечуй есть новая болѣзнь, которая, если часто возобновляется, неминуемо превратиться можетъ изъ малозначущей и облегчающей въ му-

чительную и даже опасную: ибо въ послѣдствіи она не токмо что не въ состояніи отвлекать болѣзненнаго раздраженія отъ брюшныхъ органовъ, какъ выше сказано, но еще усиливаетъ оное, увеличивая вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣзненную раздражительность въ кровоносныхъ сосудахъ и крайне затрудняя лѣченіе другихъ болѣзней. *Продолжительное* и *сильное почечуйное истеченіе* разслабляетъ всѣ органы и въ особенности пищеварительные и портитъ самое кровотвореніе; кровь дѣлается блѣдною, худо выработонною, и сіе бываетъ причиною лихорадки, худосочія, водяной болѣзни и т. д.

Почечуй должно почитать *благотворнымъ* только на время; онъ исцѣляетъ несовершенно и то только въ вышесказанномъ раздраженномъ состояніи. Впрочемъ почечуй во всякомъ случаѣ есть худой признакъ здоровья, есть тяжкое болѣзненное зло, требующее строгаго образа жизни. Я смѣло утверждаю, что не должно радоваться появленію почечуя или геморроя, въ какомъ бы то случаѣ ни было, какъ то дѣлаютъ легковѣрные, вовсе не опасаясь дальнѣйшихъ его послѣдствій; напротивъ надлежитъ взять мѣры осторожности и безъ отлагательства изыскавъ причину, почечуй произродившую, какъ бы впрочемъ здоровье хорошо ни было, тогда же стараться о возстановленіи здоровья и объ отвращеніи угрожающихъ орга-

низму важныхъ болѣзней, коихъ почечуй всегда есть предвѣстникъ и сотоварищь. Почечуй въ семъ отношеніи можно сравнить съ коварнымъ человѣкомъ, который явно оказываетъ намъ услуги, а втайнѣ ищетъ погубить насъ, или, какъ другіе говорятъ, одержимые почечуемъ и усиливающіе оный питаютъ змѣю въ груди своей.

2.

Для мущинъ столько ли необходимъ почечуй, сколько необходимо для женщинъ мѣсячное ихъ очищеніе кровей?

Какъ въ древнія времена нѣкоторые полагали, такъ и нынѣ еще иные думаютъ, что „*для мущинъ столько же полезенъ и необходимъ почечуй, какъ для женщинъ мѣсячное ихъ очищеніе кровей*“, что крови, въ случаѣ ихъ прекращенія, нерѣдко замѣняются почечуемъ, и наконецъ, что „*истеченіе геморроидальной слизи замѣняетъ у беременной женщины отсутствующее очищеніе кровей*“.

Но мѣсячное у женщинъ есть необходимая, естественная потребность для организма, на каковый конецъ и строеніе матки и жизненная дѣятельность ея сосудовъ отъ природы таковы, что у каждой женщины имѣющійся излишекъ крови скопляется въ маткѣ для питанія младенца, въ другое же время испражняется изъ оной вонъ; слѣдовательно каждая здоровая женщина должна неотмѣнно имѣть

сіе естественное кровоистеченіе каждой мѣсяцѣ (исключая больныхъ). Почечуй напротивъ того всегда бываетъ доказательствомъ болѣзненнаго состоянія и случается у тѣхъ только весьма немногихъ людей обоего пола, кои разстроили свое здоровье, и у коихъ заднепроходная кишка съ ея сосудами повреждена. Остальные же люди почечуя не имѣли и предки ихъ не знали даже и имени онаго.

Кто согласится принять почечуй за нѣчто похожее на женскія крови потому только, что почечуй появляется у иныхъ (весьма немногихъ) періодически, однажды въ мѣсяцъ, тотъ весьма грубо ошибется. Такимъ образомъ надлежало бы считать благотворною для организма потребностію и прочія болѣзни, также періодически каждый мѣсяцъ иногда появляющіяся, каковы суть, на прим: падучая болѣзнь, истерика, лихорадка, сумасшествіе, апоплексія и проч.

Хотя недостаточныя и пріостановившіяся мѣсячныя очищенія и располагаютъ женщинъ къ почечую, возвышая венозную систему, и хотя въ случаѣ прекращенія мѣсячныхъ кровей у женщины крѣпкой, сильной, полнокровной и имѣющей притомъ чрезмѣрную раздражительность въ боевыхъ сосудахъ, геморoидальное истеченіе крови, самою натурою произведенное, и можетъ иногда быть полезнымъ; но при всемъ томъ почечуй не можетъ замѣ-

нить мѣсячнаго очищенія на долгое время; въ противномъ случаѣ уничтоженіе силы оплодотворенія и важныя маточныя болѣзни были бы для женщины неминуемымъ послѣдствіемъ.

3.

Многіе испытываютъ, что съ появленіемъ почечуйнаго истеченія тотчасъ избавляются отъ разныхъ болѣзненныхъ припадковъ; многіе также увѣряютъ, что иные имѣли почечуй по нѣскольку лѣтъ безъ отяготительныхъ припадковъ; изъ чего заключаютъ, что почечуй для человѣка полезенъ и что гораздо лучше побуждать его и искусственно производить, нежели прекращать.

Но противу сего можно сказать, что собственныя чувства человѣка нерѣдко вводятъ его въ заблужденіе и что временное облегченіе нѣкоторыхъ припадковъ не можетъ ручаться за непремѣнную благотворность почечуя. Тѣмъ менѣе можно приписывать ему излѣченіе какихъ либо важныхъ болѣзней, на пр: чревныхъ заваловъ, ломоты, ипохондріи, органическаго поврежденія заднепроходной кишки съ ея сосудами, особливо когда послѣ перваго почечуйнаго истеченія чрезъ нѣсколько времени покажется другое, третіе и т. д. Извѣстно, что люди, подверженные накопленію въ заднепроходной кишкѣ ѣдкаго и жесткаго кала и катышковъ на подобіе козьяго помета, страдаютъ разными тягостными припадками, на почечуй

похожими, и что они тотчасъ получаютъ облегченіе, коль скоро калъ сей будетъ самою натурою либо посредствомъ слабительныхъ испражненъ. Съ симъ сухимъ каломъ вмѣстѣ выходитъ обыкновенно нѣсколько капель крови отъ насильственнаго оной вытѣсненія; легковѣрные и въ семъ случаѣ полученное ими облегченіе обыкновенно приписываютъ показавшейся крови.

Что касается до людей, которые яко бы имѣли почечуй по нѣскольку лѣтъ безъ отяготительныхъ припадковъ, то надлежитъ замѣтить, что утверждавшіе сіе умалчивали всегда о состояніи ихъ гемороидалистовъ въ послѣдствіи времени, ибо намъ извѣстно, что гемороидалисты чувствуютъ себя хуже не въ началѣ появленія почечуя, но въ послѣдствіи (*). Нынѣ весьма нерѣдко случается, что краснолицыхъ, толстобрюхихъ гемороидалистовъ, поглаживая по брюху, поздравляютъ съ здоровьемъ; въ послѣдствіи же времени сіи мнимо-здоровые люди подвергаются сильной одышкѣ, подагрѣ, водяной, каменной болѣзни и т. п. Не должны ли многіе изъ сихъ страдальцевъ винить себя за излишнюю довѣрчивость

(*) Исключая только крайне немногихъ людей, которые всю жизнь воздерживались отъ пресыщенія и отъ спиртуозныхъ напитковъ и были притомъ въ непрерывной дѣятельности.

къ благотворному дѣйствію и коварному дружеству почечуя? Почтенный нашъ Академикъ Уденъ зналъ одного Штабъ-Офицера Прусской службы, у котораго нѣсколько лѣтъ ежедневно истекало до чашки крови; цвѣтъ лица сего геморoидалиста сдѣлался отъ сего блѣднымъ и онъ примѣтно слабѣлъ, хотя могъ еще исправлять свою должность; но по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ онъ померъ отъ водяной болѣзни.

4.

Нѣкоторые писатели, повѣривъ испытавшимъ гибельныя дѣйствія почечуя, остались при мнѣніи, что „*почечуй бываетъ благотворенъ только тогда, когда истеченіе его умѣренно, и что онъ тогда только мучителенъ, когда трудно открывается или когда истеченіе бываетъ недостаточно.*“ Въ семъ послѣднемъ случаѣ совѣтуется обыкновенно гнать почечуй и насильственно производить оный; на каковой конецъ предлагаются піявицы Гг. Маркардомъ, Сталемъ, Юнкеромъ, Руфіемъ и Бехеромъ и нѣсколько дюжинъ рецептовъ лѣкарствамъ чистительнымъ и геморой гонящимъ.

Недостаточнымъ текучій почечуй разумѣютъ обыкновенно тогда, когда съ истеченіемъ крови прочіе геморoидальные припадки въ брюхѣ не исчезаютъ, но продолжаютъ безпокоить больнаго, особливо когда онъ отъ прежде-

бывшаго гораздо сильнѣйшаго истеченія чувствовалъ облегченіе. Но кто могъ опредѣлить заранѣе мѣру текучему почечую сообразно требованіямъ натуры? Не обманываемся ли мы здѣсь въ собственныхъ нашихъ чувствахъ?—Къ тому жъ припадки (приступы гемороидальные, Molimina haemorrh.) не всегда оканчиваются истеченіемъ крови натуральнымъ или искусственно произведеннымъ, но напротивъ весьма нерѣдко для прекращенія оныхъ нужно противусудорожное лѣченіе и возможное сбереженіе крови. Иногда нужно только отвратить раздраженіе въ печени или селезенкѣ или въ мочевомъ пузырѣ, въ маткѣ, или въ кишечномъ каналѣ и т. д.; послѣ сего и всѣ припадки, почечую приписываемые, сами собою исчезнутъ. *Рихтеръ* говоритъ ( ), что „хотя гемороидальное истеченіе крови и будетъ сильно, хотя крови много истекать будетъ, но оное не почитается чрезмѣрнымъ, когда больной еще не очень слабѣетъ и притомъ отъ нѣкоторыхъ припадковъ облегчается.“ Онъ продолжаетъ: „въ той только степени геморой чрезмѣрнымъ почитать надлежитъ, когда теченіе крови будетъ продолжаться долго, когда больной отъ онаго сильно ослабѣетъ, когда у него покажется блѣдность въ лицѣ, особливо на губахъ, когда передъ глазами начнутъ летать мушки, а въ ушахъ ощущает-

(*) Specielle Therap. 111. th. p. 382.

ся жужжаніе, когда аппетитъ пропадетъ, пищевареніе испортится, когда больной станетъ чахнуть и медленная лихорадка начнетъ показываться.“ Но какъ можно Врачу согласиться допустить геморoидалиста до таковаго разстройства въ организмѣ? Не поздно ли уже тогда будетъ помышлять объ умѣреніи и остановленіи почечуя? Что препятствуетъ намъ заблаговременно остановить чрезмѣрно сильное, слѣдственно и вредное для организма, геморoидальное истеченіе? По крайней мѣрѣ я нѣсколько разъ останавливалъ таковое истеченіе приличными средствами, большею частію на всю кровоносную систему и сосудистыя нервы дѣйствовавшими, и никогда не замѣтилъ отъ сего худыхъ послѣдствій.

Примѣръ, приводимый *Рихтеромъ* въ Спец. его Терапіи, томъ 111, стр. 388. (Tznka 1. rob. 1 p. 166.), что нѣкто, теряя нерѣдко проходомъ до 2 фунтовъ крови въ одинъ день, тотчасъ подвергался сильному кровохарканію, коль скоро геморoидальное его истеченіе прекращалось,—никакъ не можетъ служить намъ *правиломъ*. Легко быть можетъ, что геморoидальное истеченіе и кровохарканіе были здѣсь ничто иное, какъ припадокъ сильной слабости и раздражительности въ кровоносной системѣ и что лѣченіе почечуя, которое по видимому здѣсь не одобряется, было палліативное, на одну только заднепроходную кишку направленное.

5.

Нѣкоторые писатели не только что не совѣтуютъ почечуйное истеченіе и самыя шишки истреблять, когда оныя открылись при повсемственномъ геморроѣ (см. § 10), но предлагаютъ въ семъ случаѣ оныя еще побуждать и усиливать, какъ благотворное явленіе. Таковое мнѣніе ведетъ также къ заблужденію и производитъ именно то, что многіе вмѣсто направленія лѣченія на болѣзненно-разстроенную венозную систему и на сосудистые нервы, вмѣсто исправленія венознаго тѣлосложенія и отвращенія важнѣйшихъ болѣзней чревныхъ внутренностей, обыкновенно стараются только побуждать и усиливать почечуй.

6.

Напослѣдокъ изъ разныхъ сочиненій видно, что *люди, у коихъ почечуй* (какъ открытый, такъ и закрытый) *по какой либо причинѣ внезапно исчезалъ, подвергались опаснымъ болѣзнямъ*, какъ то: одышкѣ, желтяницѣ, подагрѣ, водяной, падучей, истерикѣ, сумасшествію, каменной болѣзни и медленной изнурительной лихорадкѣ; также, *что сіи опасныя болѣзни съ обратнымъ появленіемъ почечуя иногда опять прекращались, что въ таковыхъ болѣзняхъ совѣтуется обыкновенно вызывать почечуй немедленно или насильственно производить оный.* Натурально, что таковое мнѣніе многимъ подало поводъ и во всякомъ другомъ

случаѣ страшиться лѣчить почечуй средствами, непринадлежащими къ числу гонящихъ и усиливающихъ почечуй. Я не намѣренъ оспоривать, что отъ внезапнаго прекращенія почечуйнаго теченія крови по сильнымъ какимъ либо причинамъ и въ состояніи, описанномъ въ § 44, дѣйствительно приключаются иногда отяготительные припадки, которые съ новымъ появленіемъ почечуя, т. е., съ прекращеніемъ причины, его остановившей, иногда и облегчаются или и вовсе исчезаютъ; но необходимую вижу надобность въ ограниченіи мнѣнія, которое выходитъ изъ всякой мѣры и весьма нерѣдко напрасный страхъ и великой вредъ причиняетъ. Я хочу только сказать, что многіе въ семъ случаѣ прекращенію почечуйнаго истеченія крови и исчезанію шишекъ приписываютъ гораздо болѣе опасности, нежели въ самомъ дѣлѣ сколько оной бываетъ, и что приписывающіе толь опасныя слѣдствія пріостановленію, исчезанію почечуя по легковѣрію своему, считаютъ оный причиною въ такомъ именно случаѣ, гдѣ онъ самъ большею частію ничто иное есть, какъ припадокъ и слѣдствіе другой важнѣйшей причины.

Здѣсь по всей справедливости можно привести въ примѣръ правило, давно Врачами принятое, что легкая болѣзнь уступаетъ мѣсто *тягчайшей*. Почечуй внезапно исчезаетъ большею частію, когда отъ сильнаго, отъ какой ли-

бо причины происходящаго, раздраженія брюшныхъ органовъ произойдутъ: судороги, воспаленіе и полносочіе въ брюшной полости, или когда въ организмѣ отъ извѣстныхъ какихъ либо причинъ послѣдуетъ сильнѣйшее разстройство. Въ таковомъ точно отношеніи, какъ мнѣ изъ опыта извѣстно, большею частію находится и почечуй съ сильною одышкою, подагрою, водяною, апоплексіею, медленною изнурительною лихорадкою и проч. Текучій почечуй исчезнетъ и пропадутъ почечуйныя шишки, когда у больнаго отъ сильнаго измѣненія въ кровоносной и нервной системахъ случится горячка, апоплексія, судороги, водяная и т. п.; но когда горячка, апоплексія и проч. какимъ либо счастливымъ случаемъ минуются: тогда и почечуй потечетъ попрежнему и снова появятся въ проходѣ почечуйныя шишки. Въ семъ случаѣ могутъ намъ служить примѣромъ и прочія болѣзни, гдѣ мы тоже самое сказать должны, что жесточайшая болѣзнь уничтожаетъ легчайшую, и что сія послѣдняя опять появляется, когда пройдетъ тягчайшая, на пр: рана, сильно гноившаяся, вдругъ засыхаетъ при жестокой горячкѣ, какою либо причиною произведенной; бѣли у женщинъ, молоко въ грудяхъ и родовое очищеніе у роженицы исчезаютъ, когда отъ сильнаго испуга или гнѣва, либо отъ жестокой простуды, либо отъ сильной потери крови сдѣлается сильная перемѣна въ дѣятель-

ности сосудовъ или случится жестокая горячка (Febris puerperalis) и т. п.; но когда все сіе минуется, то и рана нерѣдко опять открывается и гноится; бѣли, молоко, родовое очищеніе также иногда опять сами собою появляются.

Отъ сильнаго воспаленія, на прим: въ мочевомъ пузырѣ или въ шулятахъ вдругъ перестаетъ течь перелой (гонорея), а съ минованіемъ воспаленія нерѣдко опять появляется самъ собою. Пожилая женщина съ прекращеніемъ мѣсячныхъ ея кровей впадаетъ въ жестокую болѣзнь, но не всегда отъ того, что оныхъ не стало, а напротивъ отъ большаго разстройства ея организма послѣ сильнаго испуга, жестокой простуды или послѣ крѣпкихъ лѣкарствъ и отъ старости, ослабившей тѣлесныя силы. Такимъ же образомъ исчезаетъ внезапно почечуй у старика, у коего дряхлость истощеннаго временемъ организма превзойдетъ ту степень разслабленія, при которой до того былъ почечуй.

О лѣченіи почечуя или геморроя и другихъ въ тѣсной связи съ нимъ состоящихъ болѣзней.

§ 34.

Слѣдуетъ ли почечуй лѣчить, или должно оставлять его на попеченіе самой натуры?

Есть примѣры, что нѣкоторые гемороидалисты обходились безъ всякаго врачебнаго пособія. Сіе случиться могло именно: при легкомъ почечуѣ у людей, которые при первомъ появленіи припадковъ онаго немедленно исправляли образъ своей жизни, не пресыщались пищею, оставляли вовсе горячащую, не употребляли кофе, ликеровъ и другихъ крѣпкихъ напитковъ, а пили чистую или ключевую холодную воду, квасъ или слабое пиво, и не сидѣли какъ прикованные къ стулу, но дѣлали болѣе тѣлодвиженія и занимались работою. Таковые немногіе люди, ежели и не избавлялись вовсе отъ почечуя, то по крайней мѣрѣ дѣлали его для организма совершенно безвреднымъ — и такимъ образомъ во всю жизнь наслаждались здоровьемъ.

Но какъ въ числѣ гемороидалистовъ большею частію встрѣчаемъ мы такіе субъекты, у которыхъ почечуй походитъ болѣе на припадокъ важнѣйшаго разстройства въ организмѣ, нежели на первоначальную мѣстную бо-

лѣзнь, — встрѣчаемъ, говорю, такихъ людей, которые, радуясь появленію почечуя и слѣпо вѣря цѣлительности его, не перестаютъ вести жизнь сидячую; время, для отдыха, освѣженія и укрѣпленія тѣла нужное, проводятъ въ клубахъ или дома или въ гостяхъ, сидя за картами нерѣдко до глубокой ночи; сверхъ того во зло употребляютъ крѣпкіе напитки и горячащую пищу безъ всякаго разбора, не смотря нимало на тѣлосложеніе и на мѣру жизненной силы желудка; видимъ наконецъ людей, которые къ врачебнымъ пособіямъ прибѣгаютъ только тогда, когда испытаютъ уже нѣсколько жестокихъ геморoидальныхъ приступовъ; когда въ брюхѣ ихъ уже изрядный хранится запасъ съ зародышами различныхъ болѣзней: то изъ сего слѣдуетъ, что не льзя никоимъ образомъ въ таковыхъ случаяхъ предоставлять почечуй попеченію одной натуры, — не льзя и думать о возможности обойтись безъ врачебныхъ пособій.

§ 35.

Можно ли почечуй излѣчить совершенно, и отъ чего излѣченіе онаго всегда почти сопряжено съ затрудненіями?

Что почечуй совершенно излѣченъ быть можетъ, въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Сіе подтверждается не только имовѣрными писателями и практиками, но и многими людьми, дѣйствительно отъ онаго освободившими-

ся. Впрочемъ успѣхъ излѣченія сей болѣзни много зависитъ отъ строгаго образа жизни, какъ выше объяснено, и отъ прозорливости Врача. Сему послѣднему паче всего знать нужно, есть ли почечуй одна только мѣстная болѣзнь, произродившаяся отъ мѣстнаго разслабленія заднепроходной кишки съ ея сосудами, или оный вмѣстѣ съ тѣмъ составляетъ и припадокъ важнѣйшаго разстройства въ организмѣ. Также самою ли натурою почечуйное истеченіе открылось или произведено оное искусствомъ и насильственно, какъ то бываетъ большею частію у людей, ошибающихся на счетъ благотворности почечуя и у принимающихъ сильныя гонящія средства. Сіе доказываетъ, что до рецептовъ, пилюль и эликсировъ собственно противъ почечуя дѣло доходить можетъ иногда не такъ скоро; по крайней мѣрѣ Врачи слишкомъ поспѣшные или неосторожные въ семъ случаѣ всегда встрѣчаютъ неудачу. Въ семъ-то отношеніи, а не въ другомъ какомъ смыслѣ, должны мы разумѣть и о такъ называемомъ золотомъ правилѣ древнихъ писателей, что „лѣченіемъ почечуя спѣшить не слѣдуетъ.“

Совершенное или радикальное излѣченіе почечуя почти всегда сопряжено бываетъ съ затрудненіями по нижеслѣдующимъ причинамъ: 1) застарѣлый почечуй требуетъ продолжительнаго лѣченія, ибо оный иногда не

прежде кончится, какъ по исправленіи всей венозной системы; пока воспященное кругообращеніе крови отъ разслабленія и засоренія или сращенія гемороидальныхъ сосудовъ попрежнему возстановится, на примѣръ: чрезъ доставленіе сосудамъ естественной ихъ дѣятельности или когда прекращенное порчею сосудовъ кругообращеніе крови возстановится посредствомъ постороннихъ вѣтвей (vena collateralia); а иногда и не прежде, пока не перемѣнится венозное тѣлосложеніе. 2) По причинѣ трудности въ отвращеніи причинъ, почечуй произведшихъ и его поддерживающихъ. Сюда въ особенности принадлежатъ: сидячая жизнь, несоблюденіе діеты, малое употребленіе свѣжей рѣчной или ключевой воды, которая есть, какъ изъ опыта извѣстно; единственное и здоровѣйшее питье для гемороидалиста, — невоздержность отъ спиртуозныхъ напитковъ, всегда для него вредныхъ и проч:. Извѣстно, что многіе изъ гемороидалистовъ, при всей доброй волѣ своей, находятся не въ состояніи избѣжать нѣкоторыхъ болѣзнотворныхъ причинъ; многіе же, имѣя полную свободу распоряжать своею жизнію, добровольно и упорно удерживаютъ вредныя для здоровья привычки, безпрестанно лѣчатся и безпрестанно погрѣшаютъ въ образѣ жизни.

О вспомогательномъ лѣченіи почечуя.

§ 36.

Ежедневныя тѣлесныя занятія или тѣлодвиженіе, строгое наблюденіе діеты и отвращеніе запора низомъ причисляю я къ вспомогательному лѣченію, какъ такое условіе, отъ несоблюденія котораго гемороидалисты тщетно будутъ ожидать и отъ самыхъ врачебныхъ средствъ пособія. Говорить предварительно о семъ почелъ я за нужное потому, что, какъ всякому уже извѣстно, самыя лучшія пилюли, всѣ извѣстные эликсиры и настойки, усердно поглощаемыя, при употребленіи пищи и питія, вовсе противныхъ свойству лѣкарствъ, при сидячей жизни и при упорныхъ запорахъ не токмо что не излѣчиваютъ почечуя, но еще способствуютъ къ произрожденію другихъ различныхъ болѣзней. Ежели почечуй въ врачебной практикѣ и кажется камнемъ преткновенія, то сему едва ли не единственною причиною почесть можно превратный образъ жизни и невоздержность въ пищѣ и питіи со стороны больныхъ, какъ о семъ уже выше сказано. Тѣ изъ гемороидалистовъ, которые предлагаемыя здѣсь *условія* оставятъ безъ вниманія, а станутъ искать въ сей книгѣ только рецептовъ лѣкарствамъ, которыми могли бы безъ труда избавиться отъ мучительнаго почечуя, достойны поистинѣ сожалѣнія. Для нихъ трудъ мой — тщетный!

О тѣлодвиженіи или моціонѣ.

§ 37.

Ежели сидячая жизнь и недостатокъ въ тѣлесномъ упражненіи бываютъ источникомъ почечуя и многоразличныхъ недуговъ, какъ то: разстроеннаго пищеваренія и опухолей въ селезенкѣ и печенкѣ, накопленія вредныхъ мокротъ въ тѣлѣ, особливо въ грудной и брюшной полости, разныхъ поврежденій въ головѣ, разслабленія нервовъ, на прим. ипохондріи, истерики, меланхоліи и т. п.: то тѣлодвиженіе или *моціонъ* есть безъ сомнѣнія первое средство къ излѣченію и предохраненію себя отъ всѣхъ таковыхъ болѣзней. Въ особенности не должны выпускать изъ виду сію естественную для человѣка потребность тѣ люди, о которыхъ упомянуто въ § 18, также люди недостаточные, кои не въ состояніи удовлетворять непомѣрнымъ требованіямъ аптекарей. Для нихъ тѣлесное упражненіе при строгой воздержности отъ крѣпкихъ напитковъ и вредной пищи можетъ съ величайшею пользою замѣнить дорогія лѣкарства. Извѣстно, что сіи послѣднія, какъ бы они полезны ни были, никогда не замѣнятъ тѣлодвиженія.

Выгоды отъ тѣлодвиженія, т. е., тѣлесныхъ упражненій, производимыхъ на открытомъ, свѣжемъ, солнечными лучами оживотворенномъ воздухѣ суть неисчислимы и благотворное имѣ-

ютъ вліяніе какъ на тѣло человѣка, такъ и на его душу. Мускулы, приведенные въ движеніе, производятъ полезное сжатіе и потрясеніе на внутренности и на кровоносные боевые и крововозвратные сосуды и тѣмъ способствуютъ хорошему пищеваренію, лучшему претворенію питательнаго сока въ алую кровь, помогаютъ удобному изъ тѣла изверженію нечистотъ и гасовъ (вѣтровъ), послѣ сваренія пищи и выработанія изъ оной питательнаго сока въ тѣлѣ остающихся; способствуютъ свободному кругообращенію крови и пасоки въ ихъ сосудахъ; возбуждаютъ жизненную дѣятельность органовъ, служащихъ къ отдѣленію и переработыванію разныхъ въ тѣлѣ соковъ. Движеніемъ мускуловъ возбуждается жизненная дѣятельность легкихъ, въ которыхъ кровь отъ сего очищается и дѣлается лучшаго свойства. Тѣлесныя упражненія, сверхъ вышеисчисленныхъ выгодъ, дѣйствуютъ благотворно и на самыя мышицы. Сіи орудія движенія отъ дѣятельности умножаются въ своей массѣ, дѣлаются крѣпче и сильнѣе. Тѣлодвиженіемъ и самый наружный видъ или форма тѣла облагороживается. Взгляните на человѣка, незаботившагося о тѣлодвиженіи, и вы увидите, что онъ пасмуренъ, смотритъ изъ подлобья, скорчился, нетвердъ на ногахъ и т. п. Посмотрите напротивъ на человѣка дѣятельнаго, работящаго, пользующагося животворнымъ солн-

цемъ, благорастворенным воздухомъ — какъ свѣже и пріятно лице его! какой благородный взглядъ, какой правильный станъ, какая мужественная поступь, какая ловкость и проворство! какое мужество и неустрашимость въ опасностяхъ! какая способность ко всѣмъ предпріятіямъ, къ перенесенію трудовъ и какая готовность помогать ближнему!

Тѣлесныя упражненія (моціонъ), какого бы рода, онѣ ни были, не должны производиться до усталости и до изнуренія силъ. Людямъ, отвыкшимъ отъ тѣлодвиженія, чрезмѣру тучнымъ и изнуреннымъ должно начинать съ легкаго моціона и увеличивать оный постепенно. Надлежитъ всегда избирать для себя пріятный родъ моціона, т. е., стараться находить въ немъ удовольствіе; ибо при тѣлесныхъ занятіяхъ, съ принужденіемъ и неохотно производимыхъ, человѣкъ скоро устаетъ. Люди, чрезмѣрно изнѣженные и слабые тѣломъ, также люди, явно расположенные къ болѣзнямъ, и особенно больные, неиначе должны пользоваться моціономъ, требующимъ большаго напряженія силъ, какъ съ крайнею осторожностію, а иногда и вовсе оставлять оный; всего лучше совѣтоваться въ семъ случаѣ съ Врачемъ. Таковую осторожность въ особенности наблюдать слѣдуетъ при расположеніи тѣла къ воспаленію въ легкихъ, къ кровохарканію, кровотеченіямъ изъ мочеваго пузыря и къ чрез-

мѣрному почечуйному истеченію. Сильное и продолжительное тѣлодвиженіе людямъ, страждущимъ отъ упорныхъ запоровъ на низъ, бываетъ вредно, дѣлая оные еще упорнѣе; напротивъ того оно полезно одержимымъ частыми и продолжительными поносами. Излишнее тѣлодвиженіе вредно также людямъ, расположеннымъ къ острымъ ревматизмамъ.

Впрочемъ на счетъ *моціона* должно еще замѣтить, что Врачь, совѣтующій дѣлать тѣлодвиженіе безъ исключенія каждому человѣку, какъ больному, такъ и здоровому, поступаетъ столь же безразсудно, сколь непростительно не пользоваться онымъ, кому нужно. Находить въ покойной малодѣятельной жизни всегдашній вредъ, безъ исключенія для каждаго человѣка, значитъ: не обращать вовсе вниманія на тѣлосложеніе и сдѣланную привычку. Извѣстно, что у насъ многія изъ прекраснаго пола, будучи нѣжно воспитаны, и при маломъ тѣлесномъ упражненіи бываютъ здоровы. Турки и прочіе Азіатскіе народы, мало дѣлающіе тѣлодвиженія, тучны и здоровы. Они удивляются намъ Европейцамъ, находящимъ удовольствіе въ моціонѣ. Турокъ считаетъ себя счастливымъ тогда только, когда можетъ покойно сидѣть на диванѣ. Хотя воспитаніе наше совсѣмъ другое и климатъ нашъ не таковъ какъ у нихъ—отъ чего въ отношеніи къ моціону и не можемъ мы подражать Азіатцамъ;

но при всемъ томъ по справедливости сказать должно, что упущеніе тѣлодвиженія большею частію приноситъ явный и неизбѣжный вредъ тѣмъ только изъ насъ, кто, не бывъ изнѣженъ воспитаніемъ и сдѣлавъ привычку къ дѣятельности, вдругъ предастся нѣгѣ и покою и станетъ вести сидячую жизнь, какъ о семъ сказано въ § 18.

Разные роды тѣлодвиженія или моціона.

§ 38.

Прогулка хотя не заключаетъ въ себѣ всѣхъ условій *моціона*, для геморoидалиста нужнаго, ибо здѣсь приводятся въ дѣятельность однѣ только мышицы ногъ, и ее болѣе назвать можно отдохновеніемъ послѣ занятій, сидя въ комнатѣ производимыхъ; — но она каждому человѣку, желающему наслаждаться здоровьемъ, необходима. Нужно каждый день до обѣда или до ужина пройти пѣшкомъ нѣкоторое пространство, избирая для сего мѣста, изобилующія чистымъ и солнечными лучами оживотвореннымъ воздухомъ, на примѣръ: равнины, холмы и горы — и не смотря, ежели возможно, ни на какую погоду (*). Прохаживаться должно съ ду-

(*) Благоразумнаго человѣка ничто не должно удерживать отъ сей прогулки, а всего менѣе предразсудокъ. Не должно смотрѣть на то, что въ Неаполѣ болѣе стыдятся ходить пѣшкомъ, нежели красть, и что

хомъ веселымъ и совершенно покойнымъ; *мысли свои обращать на шаги, на движеніе мускуловъ ногъ, бедръ и брюха.* Люди, которые во время прогулки погружаются въ глубокое и особенно въ мрачное размышленіе и не чувствуютъ шаговъ своихъ, также тѣ, кои, вышедъ на биржу, на набережную или на булеваръ, стоятъ покойно по нѣскольку часовъ на холоду, нимало не достигаютъ благотворной цѣли прогулки и располагаютъ себя къ различнымъ болѣзнямъ въ груди, въ кишечномъ каналѣ и въ мочевомъ пузырѣ.

Бѣганіе не сходя съ мѣста (exilire (*), quasilauf). Человѣкъ дѣйствуетъ точно такъ, какъ будто онъ бѣжитъ, размахивая руками и поднимая пятки какъ можно выше (доставая даже до задницы) и не сходя притомъ съ мѣста. У Грековъ считалось сіе въ числѣ гимнастическихъ упражненій и прекрасныя Лакадемонянки, чувствуя необходимость въ тѣлодвиженіи, пользовались также симъ моціономъ въ своихъ комнатахъ. Сей родъ *моціона* заслуживаетъ и у насъ подражаніе.

есть и у насъ въ Россіи довольно легкомысленныхъ и чванствомъ напыщенныхъ людей обоего пола, которые не пользуются моціономъ потому только, что ходить пѣшкомъ и заниматься хозяйствомъ почитаютъ они удѣломъ однихъ бѣдныхъ и простолюдимовъ.

(*) Plinius.

Ѣзда въ экипажахъ съ гибкими рессорами едва ли можетъ считаться моціономъ; впрочемъ съ пользою могутъ проѣзжать въ нихъ при худой погодѣ слабосильные и немогущіе прогуливаться пѣшкомъ. Проѣзжаться ежедневно полезно и потому уже, чтобы воспользоваться открытымъ, свѣжимъ воздухомъ, который возбуждаетъ дѣйствіе легкихъ и освѣжаетъ кровь и все тѣло, чего комнатный воздухъ, отъ дыханія людей и неподвижности своей легко портящійся, производить не можетъ.

Умѣренная верьховая ѣзда составляетъ весьма полезное движеніе для груди и въ особенности для брюха. Она полезна для слабосильныхъ, отъ ходьбы скоро устающихъ и для чрезмѣрно тучныхъ людей, которые отъ пѣшеходства чувствуютъ одышку и скоро утомляются. Верьховая ѣзда не одобряется для тѣхъ, у коихъ почечуйныя опухоли бываютъ снаружи и особливо когда оныя воспалены.

Подвижныя креслы или качалка съ длинными вмѣсто ножекъ полукружными полозьями. Сидящій на сихъ креслахъ можетъ самъ взадъ и впередъ качаться и доставлять движеніе мышицамъ брюха, хребта и бедръ. Хотя моціонъ сей и весьма слабой, но по крайней мѣрѣ доставляетъ ту выгоду, что брюшные органы не столь бываютъ сжаты, какъ при спокойномъ сидѣніи съ согбеннымъ напередъ тѣломъ. У Шведовъ

видалъ я таковыя креслы въ большомъ употребленіи для геморoидалистовъ слабосильныхъ, для людей старыхъ и для подагриковъ, немогущихъ пользоваться инымъ дѣятельнѣйшимъ тѣлодвиженіемъ.

Умѣренная билліардная игра полезна въ особенности для тѣхъ, коимъ дурная или холодная погода и другія какія либо обстоятельства препятствуютъ пользоваться инымъ выгоднѣйшимъ тѣлодвиженіемъ на чистомъ, открытомъ воздухѣ.

Танцованье или *пляска*, приводя всѣ системы организма въ движеніе, составляетъ вмѣстѣ и превосходнѣйшее средство для доставленія тѣлу правильнаго вида и легкости. Пляска во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, даже и у дикихъ, была и понынѣ находится въ употребленіи, и потому танцы какъ въ кругу домашнемъ, такъ и въ общественномъ, должны быть уважаемы и поддерживаемы — какъ необходимая потребность для физическаго благосостоянія людей. Запрети танцы — и большая часть прекраснаго пола останется вовсе безъ тѣлеснаго упражненія. Танецъ, оживляемый музыкою, можетъ побудить къ движенію и тѣхъ обоего пола людей, кои по мнимой слабости или по лѣности отъ всякаго другаго моціона отказываются.

Но танцы для каждаго возраста полезны только тогда, когда предаются имъ съ умѣрен-

ностію, съ веселымъ духомъ и совершенною свободою, въ залѣ пространной, гдѣ воздухъ чистъ и гдѣ нѣтъ пыли и сквознаго вѣтра. Надлежитъ замѣтить, что ни въ какомъ родѣ тѣлодвиженія не можетъ быть столько злоупотребленія, какъ въ танцованьѣ. Стоитъ только взглянуть на такъ называемыхъ *страстныхъ танцовщицъ* и танцоровъ на другой или на третій день послѣ бала: красные глаза, блѣдныя щеки, удушающій кашель, колотье въ боку, скорый пульсъ, безсонница и т. п. показываютъ ясно неумѣренность въ танцованьѣ и каковъ былъ воздухъ въ танцовальной залѣ! Ежели мы видимъ много молодыхъ людей, изуродованныхъ отъ танцовъ (а иногда и скоропостижно отъ нихъ умершихъ), то сіе бываетъ либо отъ неблагоразумія танцующихъ, либо отъ непростительной безпечности хозяевъ и старшинъ на счетъ сбереженія здоровья танцующихъ юныхъ и пылкихъ гостей; всего болѣе убиваетъ питіе холодной воды и выхожденіе на стужу и на сквозной вѣтеръ тотчасъ послѣ танца съ разгоряченнымъ тѣломъ. Особенно вредны быстрые и слишкомъ продолжительные вальсы.

Крайне пагубенъ нынѣшній обычай (легкомысленностію введенный) оставаться на балѣ за полночь до 5 часовъ утра, и совершенно противный прежнему,—когда на балъ пріѣзжали въ 6 часовъ вечера и въ 12 разъѣзжались! Мнѣ очень странно кажется, что многіе родители,

съ неусыпною попечительностію дѣтей своихъ воспитывающіе, во всѣхъ прочихъ обстоятельствахъ совѣтуются съ своими Врачами, что для дѣтей ихъ полезно и что вредно, а о танцахъ ни слова. Врачь предостерегъ бы многихъ безъ сомнѣнія и преподалъ бы въ разсужденіи танцовъ совѣтъ сообразоваться съ тѣлосложеніемъ, а дѣтямъ, имѣющимъ наклонность къ воспаленіямъ, къ кровотеченіямъ и т. п. и вовсе запретилъ бы танцовать. Такимъ образомъ многіе молодые люди избавились бы отъ чахотки — нынѣ столь обыкновенной!

Вощеніе, натираніе столовъ воскомъ. Многія благоразумныя и всякихъ предразсудковъ чуждыя дамы пользуются симъ домашнимъ моціономъ, все тѣло въ движеніе приводящимъ. Мнѣ дѣйствительно многія изъ нихъ извѣстны, которыя съ охотою симъ занимаются, и увѣряютъ, что съ тѣхъ поръ имѣютъ онѣ хорошій аппетитъ, свѣжее, натурально румяное лице и крѣпость силъ; чего безъ *моціона* вовсе было лишились и начали жаловаться на геморoидальные припадки.

Занятія въ саду или въ огородѣ представляютъ каждому пріятнѣйшій моціонъ. Разумѣется, что здѣсь не довольно быть однимъ только зрителемъ или распорядителемъ упражненій; но должно самому участвовать въ копаніи грядъ и канавокъ, въ пересаживаніи и подрѣзываніи деревъ и проч. Пребываніе по нѣ-

скольку часовъ въ день въ саду или въ огородѣ, гдѣ деревья и растѣнія наполняютъ воздухъ бальзамическими испареніями, благотворно для человѣка, особливо при движеніи. Здѣсь легкія, кровь и все тѣло освѣжаются и возбуждаются къ жизненной дѣятельности. Однакожъ вечеромъ, по закатѣ солнца, надлежитъ выходить изъ саду, ибо испаренія земли и самыхъ цвѣтовъ въ сіе время бываютъ вредны. Многіе изъ сидящихъ въ садовыхъ бесѣдкахъ до поздней ночи, особливо спящіе въ саду, подвергались различнымъ болѣзнямъ, какъ то: головной боли, коликѣ въ животѣ, кашлю и лихорадкѣ.

Путешествіе, временная поѣздка въ деревню и пребываніе въ лѣтнее время на дачѣ доставляютъ полезнѣйшее тѣлодвиженіе людямъ, живущимъ въ городахъ въ спертомъ, испорченномъ воздухѣ и обремененнымъ дѣлами, либо предавшимся суетѣ мірской. Временное наслажденіе сельскою природою благотворно какъ для рожденнаго съ живымъ, пылкимъ воображеніемъ, съ идеями нѣжными и меланхолическими, такъ и для нечувствительнаго къ прелестямъ Поезіи. Здѣсь Природа говоритъ сердцу даже и самаго холоднаго зрителя. Открытый, чистый воздухъ, лазуревое небо, благоуханіе цвѣтовъ, источникъ чистой воды, прохладу и новую жизнь по жиламъ нашимъ разливающій, умѣренная сельская пища, раннее

вставаніе, прогулка по полямъ и лугамъ съ душею веселою и свободною, полезны не въ одномъ только воображеніи, но элементарною своею вещественностію дѣйствуютъ удивительно на возстановленіе здоровья. Жаль, что много есть странныхъ людей, которые, живя въ деревнѣ или на дачѣ, вмѣсто благоразумнаго наслажденія природою, все лучшее время года сидятъ, играютъ въ карты, раскладываютъ грандпасьянсъ, пьютъ грокъ, мадеру, портеръ и пресыщаются городскою пищею.

Плаваніе или купанье въ водѣ, на прим: въ бассейнѣ, въ чистомъ, безопасномъ мѣстѣ въ рѣкѣ или въ морѣ принадлежитъ также къ полезному и пріятному моціону. Извѣстно всякому, съ какимъ удовольствіемъ Руской простолюдимъ купается въ водѣ и какую свѣжесть и крѣпость тѣла отъ сего получаетъ! *Агатинъ*, знаменитый Римской Врачь, сказалъ: „кто въ кратковременной своей жизни желаетъ наслаждаться здоровьемъ, тотъ долженъ чаще купаться въ холодной водѣ.“ Благомыслящіе родители, желающіе видѣть дѣтей своихъ способными пользоваться симъ спасительнымъ средствомъ, должны пріучать ихъ къ сему съ самаго дѣтства ежедневнымъ обмываніемъ всего ихъ тѣла холодною водою (*).

(*) Наставленіе на сей случай можно найти въ переведенномъ мною на Россійскій языкъ въ 1806 году

Ходить или *ѣздить на охоту* для людей, неизнѣженныхъ воспитаніемъ, также весьма полезно. Охота соединяетъ въ себѣ многоразличныя тѣлодвиженія: здѣсь случается ѣздить верьхомъ, много ходить пѣшкомъ, бѣгать, прыгать, кричать, хохотать и т. п.; слѣдственно здѣсь не одни только мускулы ногъ и рукъ и брюха въ движеніи, но и легкія, вдыхая въ себя воздухъ свѣжій и чистый, оживляютъ кровь во всемъ организмѣ; притомъ и самъ охотникъ находится большею частію въ пріятнѣйшемъ расположеніи духа. Я въ особенности предубѣжденъ въ пользу сего моціона, потому что отецъ мой былъ страстный любитель охоты и ей наиболѣе обязанъ онъ тѣмъ, что до 80го года своей жизни никогда не имѣлъ нужды въ врачебныхъ пособіяхъ. Я знаю также одного почтеннаго человѣка, страждущаго завалами въ печени и гемороидальными запорами, который равнымъ образомъ охотою примѣтно поддерживаетъ свое здоровье. Пришедъ съ охоты, онъ всегда бываетъ веселъ и на долгое время остается доволенъ своимъ здоровьемъ, вовсе не принимаясь за пилюли, безъ которыхъ въ другое время никакъ обойтись не можетъ. *Галенъ* и другіе древніе Врачи весьма одобря-

---

сочиненіи знаменитаго *Гуфеланда:* полезный совѣтъ матерямъ въ разсужденіи физическаго воспитанія дѣтей.

ютъ охоту какъ предохранительное отъ болѣзней средство. Аравійскій Врачь *Razes* увѣряетъ, что даже при свирѣпствующей чумѣ (pestis) егери оною не заражались, между тѣмъ какъ прочіе люди отъ ней умирали.

Токарная работа и пиленіе дровъ, съ умѣренностію обѣими руками производимыя, составляютъ также полезный моціонъ для геморроидалистовъ не слишкомъ нѣжнаго сложенія. Многіе люди, большую часть жизни своей сидя проведшіе и почти только однимъ перомъ (и можетъ быть еще картами) дѣйствовавшіе, не находя другихъ способовъ для *моціона* и будучи чужды предразсудковъ, нѣсколько лѣтъ поддерживаютъ крѣпость силъ своихъ *пиленіемъ*. Они занимаются симъ въ часы отдыха, запираясь въ комнатахъ или сараяхъ.

Декламированіе, то есть, громкое чтеніе лучшихъ сочиненій, пѣніе и громкіе разговоры, на тощій желудокъ ежедневно производимые, составляютъ небезполезный моціонъ, въ особенности для людей съ испорченнымъ желудкомъ, одержимыхъ частыми въ желудкѣ судорогами и желудочною ипохондрическою тоскою, также для людей, занятыхъ продолжительнымъ писаніемъ или чтеніемъ, особенно съ напряженнымъ размышленіемъ. Впрочемъ оно вредно людямъ, расположеннымъ къ кровохарканію и подверженнымъ выпаденію заднепроходной кишки.

Треніе тѣла, производимое сухою рукою, либо фланелью, либо щеткою или перчатками изъ конскаго волоса, принадлежитъ также къ *моціону.* Оно возбуждаетъ дѣятельность кожи и испарину и оживляетъ кругообращеніе крови. Сама природа побуждаетъ къ сему моціону какъ человѣка, такъ и другихъ животныхъ.

Расправленіе костей, извѣстное поглаживаніе и пожиманіе тѣла и членовъ руками, въ банѣ производимое (Kneten, massagiren, Massag), относится также къ моціону и довольно извѣстно у нашихъ простолюдимовъ. Оно въ большомъ было употребленіи въ странахъ Восточныхъ. Не безъизвѣстно было также и у Римлянъ. Оно возбуждаетъ жизненныя дѣйствія кожи, желѣзъ, мускуловъ и нервовъ; при усталости служитъ оживляющимъ средствомъ, а при недѣятельности и лѣни средствомъ, возбуждающимъ кругообращеніе крови. По увѣренію Г. Ле Блонда сія ручная операція и понынѣ въ употребленіи у Негровъ. Онъ говоритъ, что буде операція сія не доставляетъ облегченія, или напротивъ, когда больной чувствуетъ себя отъ оной хуже, то въ такомъ случаѣ ее вовсе оставляютъ; буде же больному она пріятна и онъ чувствуетъ себя лучше, тогда ее продолжаютъ и постепенно усиливаютъ. Ле Блондъ былъ очевидный свидѣтель, какъ значительно большая опухоль селезенки симъ только простымъ средствомъ менѣе нежели въ четыре недѣли была излѣче-

на. Онъ одобряетъ сію операцію въ ипохондріи, въ кишечныхъ спазмахъ и въ коликѣ, гдѣ не угрожаетъ воспаленіе. Вѣтры, верьхомъ и низомъ при семъ исходящіе, облегчаютъ страданіе больнаго.

Сверхъ вышесказанныхъ родовъ *моціона* можетъ каждый по возможности и по особой наклонности пользоваться и другими различными гимнастическими упражненіями, на пр: лазить на деревья, всходить по веревчатымъ лѣстницамъ и проч.; *ходить на ходуляхъ*, кататься съ льдяныхъ горъ, бѣгать на конькахъ и на лыжахъ; играть въ горѣлки, въ мячь, въ воланъ, въ кегли; волтижировать, то есть, прыгать, упираясь руками на лошадь, на столъ, на палку и т. п., бороться, *играть въ чихарду*, скакать на концахъ доски и проч.

§ 39.

Ни для кого не настоитъ столько надобности въ изысканіи способовъ къ *моціону*, какъ для Статскихъ Чиновниковъ, включая въ то число и Военные Департаменты. Пользуя нѣсколько лѣтъ больныхъ изъ сего сословія, къ безпрерывному, такъ сказать, сидѣнію осужденнаго, я удостовѣрился изъ опыта, что большая часть изъ нихъ одержимы бываютъ почечуемъ, желудочными корчами отъ неваренія желудка и отъ вѣтровъ, завалами, отвердѣніями и даже нарывами въ печени и въ брыжейкѣ, поврежденіями въ легкихъ и въ моче-

комъ пузырѣ, ломотою, ипохондріею, сухоткою и чахоткою.

Къ отвращенію сихъ печальныхъ слѣдствій сидячей жизни, имѣющихъ вліяніе и на семейства сихъ людей, можно предложить слѣдующее:

Во первыхъ, Статскимъ Чиновникамъ необходимо, сколь можно чаще, пользоваться свѣжимъ, открытымъ воздухомъ; въ лѣтнее же время полезно было бы, подражая нашимъ военнымъ чинамъ или нѣкоторымъ иноземцамъ, избрать для нихъ на сей предметъ загородныя постоянныя мѣста; на примѣръ, каждый Департаментъ могъ бы за городомъ верстахъ въ трехъ и болѣе устроить разныя для моціона заведенія; ввести національныя и иноземныя веселыя игры и упражненія, разнообразно все тѣло въ движеніе приводящія, исключая игру въ карты. Прогулка къ симъ, такъ сказать, лагерямъ и обратно въ городъ служила бы уже сама по себѣ полезнымъ моціономъ. Тѣ изъ сихъ Чиновниковъ, кои вмѣсто необходимо нужнаго ежедневнаго *моціона* на свѣжемъ, открытомъ воздухѣ, по выходѣ изъ должности, садятся тотчасъ за карты или идутъ въ клубы и просиживаютъ до глубокой ночи, неминуемо ускоряютъ разстройство своего здоровья.

Во вторыхъ, наблюдать строгую разборчивость въ пищѣ, употребляя болѣе простую, питательную, менѣе сложную; отказываться

отъ званыхъ обѣдовъ и ужиновъ, ибо никому столько не вредитъ обремененіе желудка жирносочною, горячащею пищею и спиртуозными напитками, какъ человѣку, ведущему жизнь сидячую.

Въ третьихъ, и въ самомъ времени обѣда не слѣдовало бы слишкомъ много отставать отъ сдѣланной съ малолѣтства привычки. Нынѣшнее обыкновеніе Статскихъ Чиновниковъ сидѣть за три часа по полудни безъ обѣда пагубно для ихъ здоровья. Пища поглощается въ сіе время безъ надлежащаго аппетита и желудокъ обременяется. Аппетитныя капли, къ которымъ обыкновенно прибѣгаютъ, вредятъ еще болѣе.

Гораздо благоразумнѣе поступаемо было еще за нѣсколько лѣтъ предъ симъ, когда Статскіе Чиновники приходили къ должности въ 7 часовъ поутру, а расходились по домамъ въ 12.

Въ четвертыхъ, не отставать отъ ежедневнаго питія чистой холодной воды. Она укрѣпляетъ грудь и освѣжаетъ кишечный каналъ (см. о пользѣ холодной воды).

Въ пятыхъ, изнѣженность кожи бываетъ главною причиною ломотныхъ (ревматическихъ) недуговъ у Статскихъ Чиновниковъ; почему и надлежитъ имъ наружность тѣла, то есть, кожу содержать во всегдашней чистотѣ и въ естественномъ ея тонѣ или крѣпости. Для сего нужно пользоваться банею, особливо осенью и весною, а лѣтомъ купаться въ рѣкѣ, или те-

реть иногда все тѣло полотенцами, намоченными холодною водою съ примѣсью хлѣбнаго вина. Иногда раздѣваться донага и выставленное на воздухъ тѣло тереть крѣпко сухою рукою. Все сіе укрѣпляетъ кожу, возбуждая сосуды и нервы ея къ противудѣйствію противъ вліянія атмосферы и непогоды.

Въ шестыхъ, при продолжительномъ сидѣніи за дѣлами, особливо умственнаго напряженія требующими, полезно держать ноги теплѣе, наипаче въ зимнее время, на пр: подстилать подъ ноги войлокъ, коверъ или т. п. ибо при таковой работѣ ноги обыкновенно холодѣютъ, а отъ охлажденія ногъ страждетъ желудокъ и грудь, и часто болитъ поясница.

Въ седьмыхъ, стараться въ точности исполнять сказанное въ § 41 въ статьѣ 7 и 8 на счетъ порядочнаго испражненія низомъ и мочи и проч., дабы отвращеніемъ задержанія мочи и экскрементовъ безпрерывно поддерживать свободное кругообращеніе крови и прочихъ соковъ въ брюшной полости.

Въ осьмыхъ, полезно было бы въ канцелярскихъ комнатахъ столы устроить такимъ образомъ, чтобы доска, на коей пишутъ, могла подниматься (для писанія въ стоячемъ положеніи) и опускаться (для писанія сидя). Сіе имѣло бы ту важную выгоду, что Чиновникъ, долженствующій большую часть дня сидѣть, можетъ тогда исправлять свою должность по про-

изволу и стоя, и тѣмъ избавиться отъ вреднаго сжатія внутренностей, въ грудной и брюшной полости находящихся; каковой невыгодѣ подвергается онъ всегда въ согбенномъ напередъ сидячемъ положеніи. Впрочемъ при писаніи, въ каждомъ положеніи, должно держать себя сколько можно прямѣе, не нагибаясь впередъ.

О діетѣ геморoидалистовъ.

§ 40.

Одержимые почечуемъ должны непремѣнно наблюдать строгую воздержность въ пищѣ и питіи. За малѣйшее нарушеніе обязанности сей всякой разъ наказываются они строго ожесточеніемъ почечуйныхъ припадковъ, и чѣмъ чаще погрѣшаютъ противу сего, тѣмъ болѣе удаляютъ отъ себя столь желаемое ими исцѣленіе. Даже и тѣ геморoидалисты обязаны наблюдать строгую разборчивость и воздержность въ пищѣ и въ напиткахъ, у которыхъ аппетитъ и пищевареніе кажутся быть въ должномъ порядкѣ; — сего требуетъ отъ нихъ извѣстная потеря равновѣсія въ дѣятельности нервовъ и кровоносныхъ сосудовъ — полюсовъ кишечнаго канала.

Геморoидалисту надлежитъ отказываться отъ званыхъ большихъ обѣдовъ; ему гораздо полезнѣе употреблять пищу, изъ немногихъ блюдъ состоящую, менѣе сложную, и то съ умѣренностію, а отнюдь не пресыщаться пищею горячащею, чрезмѣру жирною, умножающею пи-

тательный сокъ въ большемъ количествѣ, нежели сколько тѣлу нужно, и сильно возвышающею венозную систему (см. § 18). Онъ не долженъ употреблять въ пищу копченыхъ яствъ, съ перцомъ, горчицею и другими пряностями приготовленныхъ и вѣтры и запоръ на низъ причиняющихъ. Для него крайне вредны: кофе, крѣпкой шоколатъ, мадера, ликеры, водка, особливо слишкомъ крѣпкая, грокъ, пуншъ, крѣпкое и сильно питающее пиво. Все сіе производитъ полносочіе и жаръ въ брюхѣ, сильно волнуетъ кровь и напираетъ ее къ сосудамъ заднепроходной кишки. Особенно же отъ спиртуозныхъ напитковъ и горячительной пищи долженъ онъ воздерживаться весною и въ жаркое сухое лѣто. Геморoидалисту при умѣренномъ употребленіи мясной полезна наиболѣе растительная пища, отвращающая запоръ; на прим: зеленыя щи изъ крапивы, изъ щавелю, изъ кашки или тысячелистника (A. millefol), изъ медуницы аптечной (Pulmonaria offic.), изъ свеклы и проч. морковь въ похлебкахъ, и особливо сырой ея корень, на тощакъ употребляемый, картофель, свѣжія сливы или сушеныя, зрѣлые сырые или печеные плоды, какъ то: сочныя груши, виноградъ, абрикосы, плоды квитовые, винныя ягоды, ягоды барбарисовыя въ похлебкѣ и проч. желе изъ различныхъ ягодъ; борщъ изъ свеклы квашеной съ сѣменами, вѣтры гонящими, каковы тиманъ, коріандръ и проч. или съ мушкатнымъ

орѣхомъ. Впрочемъ плоды надлежитъ употреблять съ умѣренностію, особливо тѣ, кои причиняютъ вѣтры; гораздо полезнѣе кушать плоды на тощій желудокъ, на пр: по утрамъ вмѣсто завтрака или спустя часа три послѣ обѣда, но не за самымъ столомъ. Соленые огурцы и россолъ огуречный особенно полезны для геморoидалистовъ, страждущихъ запоромъ.

Кислая пища и питіе нравятся больше геморoидалистамъ и бываютъ для нихъ полезны (исключая нѣкоторыхъ сложностей въ болѣзни), вѣроятно потому, что при возвышенной венозной системѣ тѣло изобилуетъ угольнымъ и водотворнымъ веществами.

Питье для геморoидалиста есть 1) *вода*, какъ здоровѣйшее въ сравненіи со всякимъ другимъ. Вода свѣжая, умѣренно холодная составляетъ лучшее средство для прохлажденія излишняго жара въ брюхѣ, для разведенія и утонченія желудочныхъ соковъ, принятой пищи и слишкомъ густаго питательнаго сока и наконецъ для отвращенія запора низомъ. Мнѣніе, что Невская вода причиняетъ почечуй, вовсе несправедливо. Сія вода найдена лучшею и самою здоровою для питья и въ пищу. Къ водѣ съ пользою прибавляется: сокъ брусничный, клюковный, барбарисовый, рябинный и т. п., разныя варенья изъ ягодъ, хорошее не слишкомъ крѣпкое виноградное вино, не слишкомъ крѣпкая наливка. Замѣчено, что рябиновка имѣетъ свойство послаблять на низъ; поче-

му она для гемороидалистовъ, одержимыхъ запоромъ, особенно полезна. 2) *Квасъ, изъ солоду* приготовляемый, кислыя щи, легкое домашнее полпиво. 3) *Хрѣновой квасъ, хрѣновое легкое полпиво.* 4) *Сокъ березовый* прѣсный и заквашенный.

Нѣчто на счетъ водки и прочихъ спиртуозныхъ напитковъ.

Привычка нѣкоторыхъ людей нѣсколько разъ въ день пить водку сколько съ одной стороны предосудительна, столько съ другой крайне вредна для здоровья. Большая часть гемороидалистовъ должны отъ водки вовсе отказаться.

Отъ винъ, водки, ликеровъ и пунша должны воздерживаться исключительно тѣ люди, кои, употребивъ какого либо изъ сихъ напитковъ даже съ умѣренностію, тотчасъ чувствуютъ: a) онѣменіе и вялость въ языкѣ, b) потерю аппетита, c) скуку, наклонность ко сну и къ брани вмѣсто веселости, которая у другихъ отъ умѣреннаго употребленія сихъ напитковъ обнаруживается, d) головную боль и головокруженіе и e) примѣтное ослабленіе памяти. Спиртуозные напитки безвредными для таковыхъ людей могутъ быть только тогда, когда они предварительно употребятъ другія приличныя возбуждающія крѣпительныя средства и клейкую питательную пищу.

Главнѣйшее однакожъ опредѣленіе приличнѣйшей для гемороидалистовъ пищи и питія за-

виситъ отъ назначенія Врача, и большею частію отъ собственнаго выбора и особеннаго къ чему расположенія, отъ долговременной опытности, *идіозинкрасіи* — и привычки больнаго. Геморoидалисту нужно быть самому для себя, такъ сказать, поваромъ. Ему надлежитъ придерживаться пищи, которая дознана имъ полезною, и непремѣнно убѣгать той, которая горячитъ и причиняетъ вѣтры и запоръ на низъ.

Плутархъ совѣтовалъ тѣмъ людямъ, кои приглашены къ знатному обѣду, дня два напередъ попоститься, дабы желудокъ накопилъ силъ къ переваренію пищи; по моему мнѣнію, столь же необходимо каждому человѣку, а особенно гемороидалисту, и послѣ роскошнаго или слишкомъ сытаго обѣда дня два попоститься, умножить тѣлодвиженіе и болѣе пить холодной воды, дабы исправить желудокъ и прохладить жаръ въ брюхѣ.

Объ отвращеніи запора на низъ.

§ 41.

Запоръ, или рѣдкое, съ великимъ трудомъ сопряженное, испражненіе низомъ, для каждаго человѣка тягостенъ; для гемороидалиста же онъ несносенъ. Кто благовременно отвращаетъ запоръ, у того почечуй есть уже гораздо сноснѣйшая болѣзнь и излѣчивается успѣшнѣе. Въ особенности настоитъ надобность въ от-

вращеніи онаго людямъ тѣлосложенія черножелчнаго, вспыльчивымъ и злымъ, также часто подвергающимся гемороидальной тоскѣ, головной боли, ипохондріи, меланхоліи и истерикѣ.

Задержанные жесткіе экскременты и отдѣляющіеся отъ нихъ во множествѣ острые гасы или вѣтры весьма непріятное производятъ впечатлѣніе на брюшные нервы, и не только причиняютъ болѣзни тѣла, но и дѣлаютъ человѣка мрачнымъ.

Къ отвращенію запора на низъ служитъ слѣдующее:

Во 1хъ, средства, возбуждающія аппетитъ и укрѣпляющія желудокъ, употреблять сколько можно рѣже, ибо сильно вяжущія, горячительныя и изсушающія изъ сихъ средствъ раздраженіемъ своимъ, особливо когда они долго дѣйствуютъ, сильно побуждаютъ сосуды ко всасыванію изъ кишекъ слизи и водяности въ нутръ тѣла, (необходимыхъ къ умягченію и увлаженію кишечнаго канала). По сей причинѣ страстные охотники до горькихъ аппетитныхъ капель, до эссенціи жизни и до настоекъ изъ разныхъ травъ, кореньевъ, изъ теріаку и т. п. большею частію страждутъ запорами отъ сухости въ кишкахъ и отъ притупленія чувствительности оныхъ.

Во 2хъ, избѣгать, сколько возможно, лѣкарствъ и клистировъ, сильно слабящихъ на

низъ, также не употреблять безъ крайней надобности и осторожности пилюль и эликсировъ изъ средствъ чистительныхъ и побуждающихъ почечуй, каковы на пр: сокъ изъ *сабура, колоцинты* и т. п. Средства сіи, причиняя сильное слабленіе, изгоняютъ изъ кишечнаго канала вмѣстѣ и натуральную слизь и водяность, отъ недостатка коихъ послѣ каждаго сильнаго слабленія обыкновеннымъ послѣдствіемъ бываетъ великая сухость въ толстыхъ кишкахъ, особливо въ заднепроходной, и задержаніе густыхъ экскрементовъ. Онѣ, равно какъ и горячащія вяжущія горькія капли и настойки, продолжительнымъ насильственнымъ дѣйствіемъ своимъ на кишечный каналъ притупляютъ органическую чувствительность и раздражимость онаго, въ особенности же въ заднепроходной кишкѣ. Слѣдствіемъ сего бываетъ обыкновенно то, что натуральное раздраженіе, экскрементами производимое, не можетъ уже надлежащимъ образомъ возбуждать помянутую кишку къ противудѣйствію и испражненію; въ ней накопляется непомѣрно много густыхъ экскрементовъ (Accumulatio alvina), испражняются же изъ оной токмо жидкости. Вотъ причина тому, что чѣмъ чаще и съ меньшею осторожностію геморoидалисты употребляютъ сильныя слабительныя или чистительныя къ отвращенію запора, тѣмъ болѣе сей послѣдній становится упорнымъ и тягостнымъ.

Въ 3хъ, стараться болѣе всего пользоваться діететическими средствами. Иногда нужно бываетъ діету въ полномъ ея смыслѣ перемѣнить и пищу, причинившую запоръ, вовсе оставить. Водянистая жидкая и мягкая пища въ семъ случаѣ гораздо полезнѣе, нежели сухая и твердая; особливо сей послѣдней должно избѣгать за ужиномъ. Весьма благоразумно поступаютъ тѣ, кои вмѣсто ужина употребляютъ вареный черносливъ, приправленный сахаромъ и некрѣпкимъ виномъ. Полезно раза два въ недѣлю вмѣсто ужина съѣсть куска два селедки. Вмѣсто питья употреблять чистую холодную воду съ прибавленіемъ, смотря по обстоятельствамъ, соку или варенья изъ ягодъ: рябины, малины, барбариса и т. п.; отваръ сливъ или грушъ; питейный медъ; *сиропъ*, сваренный изъ меду, уксусу и морковнаго соку (каждаго по равной части), составляетъ съ холодною водою пріятное питье, побуждающее слабленіе низомъ; холодная вода съ примѣсью винограднаго вина; легкое полпиво; хорошій квасъ или кислыя щи съ мятою; Зельцерская вода на тощій желудокъ, и проч.

Въ 4хъ, отнюдь не забывать умѣреннаго тѣлодвиженія; умѣреннаго, говорю, потому, что сильное и продолжительное тѣлодвиженіе, также какъ и продолжительное сидѣніе, располагаетъ къ запору.

Въ 5хъ, не спать въ пуховикахъ и слишкомъ мягкихъ перинахъ, не кутать себя слиш-

комъ тепло, не оставаться по утру долго въ постелѣ, не сидѣть на теплой лежанкѣ. Теплое одѣяніе полезно одержимому поносомъ, а нетеплое страждущему отъ упорныхъ запоровъ.

Въ 6хъ, купаться въ рѣкѣ или садиться минуты на двѣ въ холодную ванну или мыть почаще брюхо холодною водою. Мнѣ сказывали, что одинъ Французъ, жившій на берегу рѣчки, въ лѣтнее время испражнялся неиначе, какъ стоя въ водѣ. Французъ сей, сильно страдавшій отъ упорныхъ запоровъ, увѣрялъ, что онъ никогда такъ свободно и легко не испражнялся, какъ стоя въ водѣ.

Въ 7хъ, полезно вообще пріучать испорченную натуру къ испражненію низомъ всегда въ одно извѣстное время и всего лучше утромъ; пока натуральный позывъ самъ собою въ свое время не появится, можно побуждать оный завтракомъ изъ нѣсколькихъ чашекъ зеленаго чаю съ ржанымъ или ситнымъ хлѣбомъ и съ масломъ. Полезно каждый день по утру съѣсть нѣсколько корешковъ сырой моркови, запивая стаканомъ холодной воды; выпить стаканъ холодной воды съ рябиновкою, выкурить трубку табаку, пройтись по комнатѣ, потирая нѣсколько минутъ брюхо и поясницу холодною рукою или полотенцомъ, обмоченнымъ въ холодной водѣ и т. п. Извѣстно изъ опыта, что пріучить такимъ образомъ натуру къ испраж-

ненію низомъ всегда въ одно время весьма не трудно, и что со всегдашнимъ поддерживаніемъ сего навыка сопряжена очевидная польза.

Примѣчаніе. Въ арміи эскадронные и ротные Начальники, усердно пекущіеся о сохраненіи здоровья ввѣренныхъ имъ людей, умѣютъ пріучать нижнихъ чиновъ къ исполненію сей натуральной потребности всякое утро и прежде нежели одѣнутся они въ мундиръ. Требованіе сіе безъ сомнѣнія многимъ покажется сначала смѣшнымъ и труднымъ въ исполненіи; но скоро оказывается очевидная отъ сего польза. Извѣстно, что пріученные такимъ образомъ люди на ученьѣ и на походѣ идутъ весело, не просятся на сторону и не падаютъ замертво на землю, между тѣмъ какъ у другихъ, пренебрегающихъ сіе пріученіе натуры, люди на ученьѣ, а особливо на походѣ, идутъ съ пасмурнымъ видомъ, отстаютъ и безпрестанно просятся на сторону; а какъ сіе послѣднее по разнымъ причинамъ не всегда можно позволить, то случалось, что многіе изъ нихъ отъ запора, отъ колики въ животѣ и отъ раздутія пузыря задержанною мочею падали замертво на землю, и если не умирали на мѣстѣ, то въ послѣдствіи подвергались неизлѣчимымъ болѣзнямъ.

Способъ пріучать къ сему нижнихъ чиновъ состоитъ: a) въ завтракѣ изъ куска ржанаго хлѣба съ солью и изъ ковша воды, b) въ моціонѣ при чищеніи лошадей и собственной своей

аммуниціи, с) въ насильственномъ понужденіи и умѣренномъ напряженіи къ испражненію всегда въ назначенное время, хотя бы въ первые дни оное и тщетно было производимо.

Въ 8хъ, къ отвращенію упорныхъ запоровъ принадлежитъ также, чтобы натуральные позывы къ испражненію низомъ и мочи удовлетворялись всякой разъ немедленно. Кто сему не слѣдуетъ, у того сіи натуральные позывы пропадаютъ, задержанныя испражненія вскорѣ дѣлаются густы, жестки и повреждаютъ заднепроходную кишку; задержанная моча непомѣрно растягиваетъ и портитъ оболочки и сосуды мочеваго пузыря; почему люди, задерживающіе долго въ себѣ мочу, подвергаются обыкновенно непроизвольному истеченію оной, пузырному геморою, параличу въ пузырѣ и каменной болѣзни.

Картежные игроки, ученые, приказные и мастеровые самопроизвольно и по причинамъ самымъ маловажнымъ часто отказываютъ благодѣтельному позыву натуры, и потому нерѣдко находимъ мы ихъ съ вышеупомянутыми болѣзнями.

Въ 9хъ, *Рихтеръ* и *Стунцеръ* совѣтовали гемороидалистамъ, въ облегченіе затруднительнаго испражненія низомъ (при упорныхъ запорахъ), испражняться не садясь на стулчакъ, но вольно (aus freier Hand), или въ такомъ си-

дячемъ положеніи, при коемъ колѣни приподняты сколько возможно выше и ближе къ брюху.

Въ 10хъ, каждому изъ гемороидалистовъ, страждущему отъ упорныхъ запоровъ и отъ непомѣрнаго накопленія вѣтровъ въ кишечномъ каналѣ, необходимо нужно имѣть у себя клистирный сприцъ, дабы можно было немедленно подать себѣ помощь въ жестокой коликѣ и въ другихъ недугахъ. Въ особенности полезны продающіеся нынѣ въ Санктпетербургѣ ручные клистирные сприцы средней величины, коими больный самъ себѣ безъ труда можетъ поставить промывательное.

Для ординарнаго клистира можно брать двѣ чайныя чашки *отвара* изъ *льнянаго сѣмени* (или слабаго *ромашковаго чаю*, либо простой тепловатой воды), одну столовую ложку *обыкновенной соли* или вмѣсто оной одну унцію *Сибирской слабительной соли* (Sulphas magnesiae) и двѣ столовыя ложки *деревяннаго* или *льнянаго* масла. Либо взять половину столовой ложки свѣжей *бычачьей желчи*, развести въ двухъ чайныхъ чашкахъ теплой воды, прибавивъ одну столовую ложку деревяннаго или *льнянаго масла*. Можно также взять двѣ чайныя чашки воды, крѣпко намыленной простымъ домашнимъ мыломъ, и прибавить къ ней двѣ столовыя ложки того либо другаго масла. Для отвращенія накопленія густыхъ и жесткихъ экскре-

ментовъ въ заднепроходной кишкѣ и для побужденія слизистой ея плевы можно съ пользою употреблять раза два въ недѣлю *клистиръ* изъ сабура:

Возьми: сгущеннаго соку сабура 12 гранъ, очищеннаго поташу одну драхму, раствори въ двухъ чайныхъ чашкахъ теплой воды и прибавь по столовой ложкѣ *шафранной* настойки и *деревяннаго масла.*

Либо раствори четыре пилюли изъ нижепоказанныхъ *Шотландскихъ пилюль* въ двухъ чайныхъ чашкахъ теплой намыленной воды.

Для внутренняго употребленія къ отвращенію упорныхъ запоровъ нужно: 1) раза два въ недѣлю пить по хорошему стакану огуречнаго россолу съ примѣсью дессертной ложки *кремортартару* или *винощелочной соли* и немного мѣлкаго сахару; 2) либо взять сѣрныхъ цвѣтовъ и Александрійскаго листа по полудрахмы, *кремортартару* (или *винощелочной* или *винокупоросной* соли) двѣ драхмы и небольшой кусокъ *сахару* съ двумя каплями *мятнаго* или *ромашковаго* или *рутнаго масла,*—смѣшавъ, истереть въ мѣлкой порошокъ; *пріемъ:* два раза въ день отъ одной до двухъ чайныхъ ложекъ съ холодною водою. 3) Вмѣсто сѣры можно употребить такъ называемые порошки *сваривающіе* (Pulvis digestivus); для сего берет-

ся: *винокупоросной соли* (Sulphatis Potassae) половина, а иногда и цѣлая драхма, *раковыхъ жерновокъ* одинъ скрупулъ, *померанцовой корки* десять гранъ и одно зерно *чернаго перцу,* все сіе смѣшай и сотри въ порошокъ. *Пріемъ:* таковыхъ порошковъ отъ двухъ до трехъ въ сутки.

4) *Пилюли,* отъ запору наиболѣе одобряемыя, суть:

a) Сабурныя,

Возьми: *сгущеннаго сока сабура* (Aloes), *сгущенной бычачьей желчи,* каждаго по полудрахмѣ, *мыла Венеціанскаго* одинъ скрупулъ, смѣшай и раздѣли на пилюли, каждую въ три грана вѣсомъ; *пріемъ:* на ночь отъ четырехъ до шести пилюль.

b) Колоцинтныя,

Возьми: *экстракта колоцинтоваго сложнаго* (extr. colocynth. compos.) одну драхму, *экстракта ромашковаго* полдрахмы, смѣшай и сдѣлай пилюли, каждую въ 2 грана вѣсомъ; *пріемъ:* на ночь отъ двухъ до четырехъ пилюль.

c) Пилюли Шотландскія,

Возьми: *желтой камеди* или *гуммы* (Gummires. Stalagmit. Cambogioid.) одну драхму, *сгущеннаго соку сабура* двѣ драхмы, сотри особо въ порошокъ, потомъ смѣшай вмѣ-

стѣ и прибавь: *масла анисоваго* 30 капель, *сахару*, водою смоченнаго, сколько потребно, смѣшай все вмѣстѣ и сдѣлай пилюли, каждую вѣсомъ въ 4 грана; *пріемъ:* отъ одной до двухъ пилюль на ночь.

Примѣчаніе. Изъ всѣхъ вышесказанныхъ средствъ къ отвращенію упорныхъ запоровъ слѣдуетъ сколько возможно избирать слабѣйшія и простыя, и дабы не сдѣлать къ однимъ и тѣмъ же привычки, надлежитъ отъ времени до времени оныя перемѣнять. Нужно имѣть въ виду сказанное въ § 41 на счетъ во зло употребляемыхъ слабительныхъ, а равно и на счетъ *сабура* § 59; не должно также излишне заботиться объ отвращеніи запора врачебными средствами, когда одержимый запоромъ мало употребилъ пищи, когда передъ запоромъ имѣлъ изобильное испражненіе, когда брюхо мягко и впало и когда нѣтъ никакихъ отяготительныхъ припадковъ.

О благовременномъ отвращеніи запоровъ низомъ стараться въ особенности должны тѣ люди, кои подвержены чрезмѣрному съуженію заднепроходной кишки. См. замѣчан. въ § 19.

О наружномъ лѣченіи легкаго почечуя, зависящаго отъ мѣстнаго разслабленія заднепроходной кишки.

§ 42.

Когда человѣкъ, впрочемъ здоровый, имѣетъ почечуй отъ мѣстнаго разслабленія заднепроходной кишки и ея сосудовъ, отъ причинъ, непосредственно на сію только часть дѣйствовавшихъ, тогда большею частію бываетъ достаточно слѣдующее лѣченіе:

1) Геморoидалистъ при наблюденіи діеты долженъ каждый день дѣлать тѣлодвиженіе (моціонъ) и стараться ежедневно имѣть свободное, легкое испражненіе низомъ (§ 40 и 41).

2) Ежедневно или по крайней мѣрѣ черезъ день тотчасъ послѣ испражненія низомъ промывать проходъ холодною водою съ краснымъ виномъ или съ уксусомъ. Гораздо полезнѣе вмѣсто воды брать для сего простуженный отваръ изъ ароматическихъ травъ, каковы суть: *розмаринъ, пижма, калуферъ, заря, Божье дерево,* либо отваръ изъ *дубовой коры.* На бутылку воды или ароматическаго отвара съ пользою можно прибавлять двѣ драхмы буры (Subboras sodae) или полстакана *примочки кислой.* См. Военн. Фармакоп. Г. *Виллiе* часть 2, стр. 98. Для сего каждому почти геморoидалисту нужно имѣть у себя *биде,* извѣстный деревянный продолговатый стулъ со вставленнымъ въ оный

фаянсовымъ или оловяннымъ либо жестянымъ продолговатымъ же тазомъ, на которомъ, сидя верьхомъ, можно обмывать проходъ и дѣтородныя части и плескать на нихъ изъ таза воду либо другія жидкости; всего лучше, особливо для чистоты, употреблять для сего садовую жестяную лейку безъ рѣшетки.

3) Раза три въ недѣлю прикладывать непосредственно къ проходу не болѣе какъ на часъ тряпку либо губку, намоченную холодною водою либо вышеупомянутою жидкостію съ *бурою* либо *квасцами*. Для многихъ, имѣющихъ почечуйныя шишки, оказалась весьма полезною примочка изъ полунціи *буры*, растворенной въ одномъ фунтѣ розовой воды.

4) Одинъ или два раза въ недѣлю ставить промывательное изъ холодной воды или изъ простуженнаго отвара цвѣтовъ *дикой розы*, либо изъ отвара травы *золотой розги* (Solidago virga aurea).

Клистиры изъ холодной воды, по совѣту Гг. *Рихтера*, *Гилдебрандта* и *Шмуккера*, надлежитъ впускать въ проходъ вскорѣ по испражненіи низомъ, сначала не болѣе трехъ унцій на каждый клистиръ, а въ послѣдствіи можно брать и болѣе. Больной ложится въ сіе время горизонтально на лѣвой бокъ и старается удержать въ себѣ клистиръ сколь можно долѣе. Холодъ отъ клистира долженъ быть ощутителенъ, но безъ боли въ заднепроходной кишкѣ.

По сей причинѣ люди слишкомъ чувствительные должны къ степени холода привыкать исподоволь. Сначала воду для клистира можно даже подогрѣвать.

5) Раза два въ недѣлю тереть проходъ съ минуту времени льдомъ или прикладывать къ проходу ледъ, мѣлко истолченный и завернутый въ тряпку. Отъ холодной воды и льда расширенныя геморoидальныя вены сжимаются и кровь возвращается къ общему кругообращенію; равнымъ образомъ возстановляется и сжимательная сила мышицы, проходъ смыкающей (Sphincter ani), подкрѣпляются разслабленные сосуды и низпаденіе оныхъ предупреждается. Холодные клистиры, примочки и треніе льдомъ употребляются послѣ утренняго испражненія, когда тѣло не въ поту; так ке въ отсутствіе геморoидальнаго приступа и не въ то самое время, когда кровь течетъ проходомъ. Впрочемъ и въ послѣднемъ случаѣ сіи холодныя средства употребляются, когда кровотеченіе будетъ чрезмѣру сильно и опасно; тогда именно полезно воду со льдомъ или снѣгомъ прикладывать непосредственно къ брюху и къ поясницѣ, или больный можетъ сѣсть задницею въ сосудъ, наполненный водою со льдомъ. Сіи наружныя средства не должно также употреблять, когда у геморoидалиста идетъ кровь гортанью или носомъ.

6) Всѣ вышеописанныя наружныя средства съ пользою могутъ быть употребляемы и въ томъ

случаѣ, когда заднепроходная кишка у геморoидалиста будетъ часто выходить наружу отъ разслабленія смыкающей проходъ мышицы.

Сверхъ сказаннаго въ § 55 на счетъ обратнаго вправленія кишки и укрѣпленія смыкающаго проходъ мускула и волоконъ самой кишки, могущей причинить неизлѣчимый и тяжкій недугъ, больному должно: 1) остерегаться отъ поднятія чего нибудь тяжелаго, не дѣлать сильнаго тѣлодвиженія, особенно поутру рано, прежде нежели испразднится низомъ, и послѣ обѣда, когда заднепроходная кишка еще полна; 2) не говорить громко и не кричать; 3) избѣгать пищи и питія, запоръ причиняющихъ, и не менѣе того стараться предупреждать поносъ и не принимать слабительныхъ лѣкарствъ; 4) послѣ каждаго обратнаго вправленія кишки оставаться на часъ времени въ покойномъ горизонтальномъ положеніи, и 5) панталоннаго пояса крѣпко не затягивать.

О припадочномъ лѣченіи почечуя или о лѣченіи геморoидальнаго приступа.

§ 43.

Для отвращенія *геморoидальнаго приступа,* происшедшаго отъ *полнокровія* и отъ *сильнаго разгоряченія* крѣпкими напитками и горячащею пищею, нужно немедленно прохладить брюхо и уничтожить раздраженіе и сильный

приливъ крови къ заднепроходной кишкѣ; здѣсь приличенъ только прохлаждающій методъ лѣченія. Больный долженъ держать себя въ умѣренномъ, болѣе прохладномъ воздухѣ, не тепло кутаться и не лежать въ пуховикахъ или перинахъ, но на тюфякѣ, — не пить кофе, винъ и немедленно оставить употребленіе всякой горячащей пищи, равно какъ и крѣпкихъ, раздражающихъ лѣкарствъ и горькихъ съ сабуромъ настоекъ и пилюль. Надлежитъ довольствоваться легкою прохлаждающею пищею и питьемъ, на пр: овсяною, ячною, или гречневою кашицею съ черносливомъ или свѣжимъ масломъ, похлебками и компотами изъ плодовъ и т. п. Вмѣсто обыкновеннаго чаю пить холодную воду съ примѣсью сиропа, сваренаго изъ ренсковаго уксуса, морковнаго сока и меду по равной части, воду съ сокомъ или вареньемъ изъ кисловатыхъ ягодъ, слабый лимонадъ или молоко коровье, или миндальный аршадъ или сокъ (эмульсія) изъ сѣмянъ конопляныхъ, маковыхъ, огуречныхъ, арбузныхъ и другихъ прохлаждающихъ. Для утоленія непомѣрной жажды и уменьшенія жара, особенно когда дѣйствіе печени слишкомъ усилено и въ кишечномъ каналѣ примѣтны желчныя нечистоты, весьма полезно изобильное питье раствора одной драхмы *кислоты винокаменной* (Acidum tartaricum), въ бутылкѣ малинной или брусничной воды или отвара ячной крупы подслащеннаго сахаромъ.

Поелику запоръ на низъ чрезвычайно ожесточаетъ геморoидальный приступъ, то и надлежитъ доставить больному немедленно свободное, легкое испражненіе низомъ. Для сего нужно поставить легкое нераздражающее и отнюдь негорячее промывательное (клистиръ) и пить лимонадъ или черносливную воду съ *кремортартаромъ* или *винощелочною солью*, либо сыворотку, которую иногда можно настаивать съ полунціей травы, извѣстной подъ именемъ *ленъ слабительный* (Linum catharticum), или смѣшивать съ *винощелочною солью*. Полезенъ также слѣдующій растворъ винощелочной соли: *возьми:* винощелочной соли (tartras potassae) шесть драхмъ, раствори въ одномъ стаканѣ слабаго чаю изъ *Александрійскаго листа*, прибавь одну столовую ложку сиропа изъ уксуса, съ медомъ сваренаго (oxymel simplex); *пріемъ:* каждый часъ по одной столовой ложкѣ, пока послѣдуетъ нужное послабленіе низомъ. Не льзя здѣсь не замѣтить, что сильныя и горячительныя слабительныя крайне вредны. Сверхъ клистира снаружи слѣдуетъ употребить частое обмовеніе прохода холодною водою съ уксусомъ.

О лѣченіи жестокаго геморoидальнаго приступа посредствомъ піявицъ и кровопусканій.

§ 44.

Хотя болѣзненные почечуйные припадки иногда и облегчаются появленіемъ теченія крови изъ геморoидальныхъ сосудовъ, но при всемъ томъ благоразуміе требуетъ остерегаться отъ насильственнаго открытія или усиливанія почечуйнаго теченія посредствомъ такъ называемыхъ сильныхъ почечуй гонящихъ средствъ, а стараться отвращать таковые припадки другими приличными средствами. Извѣстно, что когда истеченіе крови для облегченія разныхъ припадковъ будетъ необходимо, то оное производится самою натурою.

Піявицы и кровопусканіе нужны бываютъ единственно въ нижеслѣдующихъ случаяхъ: когда геморoидальный приступъ случится у человѣка крѣпкаго тѣлосложенія, у полнокровнаго, у коего пульсъ полонъ и твердъ и жизненная дѣятельность кровоносныхъ сосудовъ чрезмѣру возвышена, и который притомъ разгоряченъ крѣпкими напитками и горячащею пищею или неосторожнымъ употребленіемъ сильныхъ лѣкарствъ; или когда у женщины въ подобномъ случаѣ мѣсячное очищеніе остановилось, умножило полнокровіе и сильно раздражило кровоносные сосуды: то для скорѣйшаго уничтоже-

нія сильнаго раздраженія, особливо въ животѣ, достигающаго иногда до величайшей степени, даже до воспаленія, равно и для отвращенія другихъ важнѣйшихъ припадковъ, на прим: жестокой головной боли и круженія головы и проч., нужно въ таковыхъ случаяхъ сверхъ вышеписаннаго прохлаждающаго лѣченія немедленное кровопусканіе изъ руки или ноги. Для отвлеченія же раздраженія и наклонности къ воспаленію отъ брюшныхъ органовъ непосредственно къ заднепроходной кишкѣ и сколь возможно болѣе къ гемороидальнымъ сосудамъ и къ наружнымъ частямъ прохода нужно иногда и открытіе теченія крови изъ гемороидальныхъ жилъ и изъ частей ближайшихъ къ проходу посредствомъ піявицъ. Сія мѣра врачеванія бываетъ тѣмъ успѣшнѣе, когда больный сего рода и прежде уже имѣлъ таковой жестокой приступъ, который посредствомъ теченія крови проходомъ облегчался. Въ семъ случаѣ надлежитъ посредствомъ легкихъ мягчительныхъ клистировъ произвесть свободныя, легкія испражненія низомъ, больнаго посадить въ мягчительную тепловатую ванну, или при недостаткѣ оной на теплые мягчительные пары, дабы такимъ образомъ привлечь болѣе крови къ наружнымъ гемороидальнымъ сосудамъ, ляшки больнаго потирать теплою рукою, и тотчасъ послѣ сего припустить отъ 8 до 12 піявицъ къ самому проходу и къ заднепроходной промеж-

ности. Если же піявицъ не случится, то пустить рожечную кровь изъ упомянутыхъ частей и изъ верхней и внутренней части ляшекъ.

Прохлаждающій методъ лѣченія (§ 43), кровопусканіе и піявицы приличны также для геморoидалистовъ, страждущихъ и отъ припадковъ, воспаленія въ гемороидальныхъ венахъ и воротной жилѣ, оканчивающихся обыкновенно истеченіемъ изъ прохода бѣлой, зеленоватой, на матерію похожей слизи и мочею съ слизистою осадкою, то есть, когда гемороидалистъ, запустившій болѣзнь свою, жалуется на судорожную жгущую или палящую боль въ пахахъ, въ поясницѣ, въ проходѣ и въ шулятахъ, когда отъ боли не можетъ онъ пошевелить ногъ, чувствуетъ сильное безпокойство и досаду и имѣетъ притомъ легкіе лихорадочные припадки.

Надлежитъ впрочемъ замѣтить, что піявицы и кровопусканія для гемороидалистовъ весьма рѣдко бываютъ нужны и что привыкшіе при малѣйшемъ усугубленіи гемороидальныхъ припадковъ къ сему методу обыкновенно ожесточаютъ свой почечуй и подвергаютъ себя кромѣ того самопроизвольно неизбѣжному разстройству въ организмѣ.

§ 45.

Гемороидальный приступъ, ожесточившійся отъ *простуды*, врачуется легкимъ от-

крытіемъ испарины; для сего больный долженъ на нѣсколько дней остаться дома, поставить себѣ клистиръ изъ ромашковаго чаю съ деревяннымъ масломъ, пить болѣе чай изъ бузинныхъ или липовыхъ или ромашковыхъ цвѣтовъ либо изъ сушеной малины и т. п. и принимать притомъ слѣдующую микстуру, легкую, но весьма дѣйствительную для произведенія пота безъ сильнаго разгоряченія тѣла: возьми *киселя бузиннаго* и *можжевеловаго* (Roob sambuci et R. juniperi), того и другаго по пяти драхмъ, простой теплой воды три унціи и *Миндерероваго россолу* (Acetas ammoniae liquidus) полторы унціи, смѣшай; сіе принять въ два или три пріема въ теченіи трехъ часовъ времени, запивая вышеупомянутымъ чаемъ. Здѣсь полезна также тепловатая ванна; когда же оной нѣтъ, то посадить больнаго на теплые пары, либо приложить къ брюху сухаго подогрѣтаго овса (отрубей или муки), завернутаго въ тряпку, или сдѣлать къ брюху и къ заднепроходной промежности припарку посредствомъ суконокъ, обмоченныхъ въ теплый отваръ ароматическихъ травъ.

§ 46.

Ожесточеніе *геморроидальнаго приступа отъ судорогъ* въ животѣ, сопровождаемаго припадками *ипохондріи* или *истерики*, лѣчится мягчительными противусудорожными промывательными, теплою ванною съ ароматическими травами, каковы суть: ромашка, калуферъ,

Божье дерево, кошечья мята, мята обыкновенная, мята перечная; втираніемъ въ брюхо противусудорожныхъ мазей (см. о лѣченіи геморoид. колики). Для внутренняго же употребленія полезны: *чай* изъ цвѣтовъ липовыхъ, тысячелистника и ромашки; *спиртъ оленьяго рога* въ семъ же чаю капель по 5 черезъ часъ; наливка или чай изъ *маунного корня* съ *померанцовыми зелеными листьями* и *ромашкою*. Весьма полезны также *противусудорожныя капли;* на пр: возьми: *капель бобровой струи, капель маунного корня, капель вонючей камеди* и *болеутолительнаго эликсира* по равной части, на пр: по драхмѣ, смѣшай; *пріемъ:* отъ 60 до 80 капель на сахарѣ въ рюмкѣ съ вышеупомянутымъ чаемъ, раза три или четыре въ день, смотря по надобности.

Ожесточеніе *гемороидальнаго приступа* отъ *испуга* или *жестокаго гнѣва* съ изліяніемъ въ желудокъ и въ верхнія кишки острой желчи врачуется рвотнымъ и сложнымъ риверовымъ питьемъ, на пр: возьми: *очищеннаго углекислаго поташу* (Subcarbonas potassae depuratus) 40 гранъ, раствори въ двухъ рюмкахъ простой *мятной воды*, прибавь одну столовую ложку *лимоннаго соку* (въ недостаткѣ онаго уксусу) и столько же *ревенной водянистой настойки* (Tinct. rhei aquosa), смѣшай; сіе употребить въ два пріема въ теченіи двухъ часовъ времени, а буде нужно, то и повторить. Впрочемъ

желчь, слизь и нечистоты въ кишечномъ каналѣ, кои ожесточаютъ припадки почечуя, изгоняются легкими слабительными и клистирами. Для слабительнаго считаю я въ семъ случаѣ слѣдующій составъ наилучшимъ; возьми: *слабительнаго электуара* одну унцію, *кислоты винокаменной* (Acidum tartaricum) два скрупула, *ревеннаго сирола* одну унцію, воды *рутной* или *вишневой* или воды *простой мяты* 4 унціи, смѣшай; *пріемъ:* каждый часъ по столовой ложкѣ.

О лѣченіи текучаго почечуя.

§ 47.

Ежели почечуйное истеченіе крови не сильно, тѣлосложеніе гемороидалиста не разстроено и онъ чувствуетъ себя притомъ здоровымъ; ежели находится въ состояніи раздраженія и воспаленія, описанномъ въ § 44, или когда при таковомъ расположеніи подверженъ сильному волненію крови, заставляющему опасаться удара (апоплексіи), или когда имѣетъ притомъ кровохарканіе либо кровотеченіе изъ носу: то въ таковыхъ случаяхъ почечуйнаго истеченія крови останавливать не должно. Во всякомъ же другомъ случаѣ истеченіе сіе, хотя бы оно было и періодическое, слѣдуетъ принимать за разстройство въ организмѣ, за предвѣщаніе будущихъ важнѣйшихъ болѣзней, и потому надлежитъ безъ отлагательства изыскать причину

сего истеченія и стараться объ остановленіи онаго. Особенно же при чрезмѣрномъ почечуйномъ теченіи (Haemorrhoides nimiae, profusae) Врачь отнюдь не долженъ оставаться въ бездѣйствіи, ибо здѣсь какъ причины, такъ и слѣдствія кровотеченія весьма важны. Въ семъ случаѣ кровотеченіе останавливается либо тотчасъ для отвращенія опасныхъ послѣдствій, или постепенно, когда большой опасности не предвидится.

Если истеченіе крови сдѣлалось отъ сильнаго волненія въ крови при довольно крѣпкомъ тѣлосложеніи и отъ разгоряченія напитками и горячащею пищею либо отъ чрезмѣрно сильнаго тѣлодвиженія: то въ такомъ случаѣ для остановленія истеченія крови достаточны иногда бываютъ: строгая прохладительная діета, свободное и легкое испражненіе низомъ и употребленіе холоднаго чаю изъ верхушекъ травы *тысячелистника* вмѣстѣ съ *розовыми цвѣтами* и съ прибавленіемъ на стаканъ онаго отъ 15 до 20 капель *Галлеровой кислоты*, или вмѣсто сего чаю изобильное употребленіе *сыворотки, съ квасцами* приготовленной, на прим: возьми: свѣжаго *коровьяго молока снятаго* одну бутылку, *квасцовъ*, въ порошокъ истолченныхъ, полторы драхмы, вскипяти на легкомъ огнѣ, дай отстояться и къ процѣженной сывороткѣ прибавь полунціи сахару; *пріемъ:* четыре раза въ день по чайной чашкѣ. Въ семъ

случаѣ съ пользою употребляема была сыворотка, приготовленная съ травою либо съ свѣжимъ сокомъ *кислицы рогатой* (Oxalis corniculata). Полезнымъ также найденъ слѣдующій составъ изъ *кисличной соли*; возьми: *кисличной соли* (Acidum oxalicum, Sal acetosellae), *масла изъ тысячелистника* (ol. A. milleffol), *сахару* и *Аравійской камеди* каждаго по двѣ драхмы, крѣпкаго чаю или наливки изъ *сѣмянъ крапивныхъ*, либо изъ цвѣтовъ *тысячелистника* шесть унцій, смѣшай; *пріемъ:* каждый часъ по одной столовой ложкѣ. *Гиртаннеръ* съ пользою предписывалъ экстракты травы *тысячелистника* и *дерева лазуреваго* (Extr. Ligni Haemathoxili Campechiani), растворенные въ *мятной водѣ* съ примѣсью кислыхъ *Галлеровыхъ* капель. Полезно также брюхо, поясницу и проходъ мыть холодною водою съ уксусомъ. Больный долженъ держать себя въ покоѣ, не предаваться гнѣву или огорченію и лежать болѣе на спинѣ. Клистиръ ставится изъ холодной воды съ уксусомъ или изъ краснаго вина.

Кровоистеченіе, происходящее отъ мѣстнаго разслабленія заднепроходной кишки, отъ причинъ, непосредственно на оную дѣйствовавшихъ, останавливается иногда наружными средствами, о коихъ говорено въ § 42.

Когда чрезмѣрная слабость въ нервахъ и судорожныя движенія бываютъ причиною чрезмѣру сильнаго гемороидальнаго теченія: то

въ семъ случаѣ полезны или крѣпкой чай изъ верхушекъ *тысячелистника*, изъ *звѣробойника* (Hypericum perforatum) и изъ листьевъ *калуфера* (Tanacetum balsamita) по равной части, или наливка изъ *маунпаго* корня (R. Valerianae Sylvestr.), травы *маіорана кошечьяго* (Herb. Teucrii mari) и цвѣтовъ краснаго полеваго маку (Papauer rhoeas), также по равной части каждаго. Къ чаю и наливкѣ съ пользою можно прибавлять: слабую *купоросную* или *Минсихтову кислоту*, сложный *лавандный спиртъ*, *коричневыя капли*, *болеутолительный эликсиръ* (Elixir paregoricum), противусудорожныя съ *вонючею камедью* капли, смот. § 46 и проч. Либо *возьми: экстракта* изъ *тысячелистника* одну драхму, раствори въ шести унціяхъ крѣпкой наливки травы *звѣробойника* вмѣстѣ съ корнемъ *маунпымъ* (либо *маіораномъ кошечьимъ*), прибавь *Минсихтовой* кислоты (Elixir Acidum M.) либо просто *кислоты сѣрной* разведенной одну драхму, *лаванднаго сложнаго спирту* двѣ драхмы и *сиропу полеваго маку* одну унцію, смѣшай. *Пріемъ:* каждый часъ по столовой ложкѣ.

Въ непомѣрномъ геморoидальномъ кровотеченіи при чрезвычайной раздражительности и чувствительности кишечнаго канала и при сильномъ поносѣ съ особенною пользою употребляется слѣдующій порошокъ: *возьми:* травы съ цвѣтами *Сибирской белены* (Hb. Hyosciami

Physaloid.) 4 грана, порошка *рвотнаго корня* (call. Ipecacuanhae) четверть грана, *мушкатнаго цвѣта* (macis) 4 грана, *корицы* и *сахару* по 10 гранъ, смѣшай и сотри въ порошокъ; *пріемъ:* 4 раза въ день по одному порошку въ крѣпкомъ отварѣ *живокоста* (Symphitum offic.). Съ пользою можно также употребить въ семъ случаѣ и слѣдующій порошокъ: возьми экстракта *целибушнаго* (Exts. nuc. vomicae), листьевъ *блекоты* (Herb. Hyosciami nigri) по 4 грана каждаго, *квасцовъ* и *сахару* каждаго по 10 гранъ, смѣшай и сотри въ порошокъ. *Пріемъ:* отъ 3 до 4 разъ въ день (смотря по обстоятельствамъ) по одному порошку въ чаѣ изъ розовыхъ листьевъ, изъ тысячелистника либо звѣробоя. Теплая суконочная припарка на брюхо изъ отвара ароматическихъ специй съ уксусомъ или съ краснымъ виномъ и клистиръ изъ клейкихъ средствъ составляютъ здѣсь приличное наружное лѣченіе. *Клистиръ* изъ крѣпкаго отвара *Американской крамеріи* или изъ раствора *экстракта* сего же корня въ семъ случаѣ весьма полезенъ.

Непомѣрно сильное гемороидальное теченіе, происходящее отъ великаго разслабленія и непомѣрно великой раздражительности въ системѣ кровоносныхъ сосудовъ требуетъ употребленія нижеслѣдующихъ средствъ, избирая приличнѣйшія изъ нихъ, смотря по обстоятельствамъ:

Крамерія Американская для внутренняго употребленія занимаетъ здѣсь, какъ и во всѣхъ другихъ кровотеченіяхъ, первое мѣсто. Объ образѣ употребленія ея смотри § 72 о кровохарканіи.

Холодная наливка хины съ *коричневыми каплями* и съ сиропомъ изъ цвѣтовъ *краснаго маку* (Syrupus Papaveris Raead.); *камедь кино* (Succus Eucalipti resiniferi), распущенная въ растворѣ *вишневаго* или *Аравійскаго клею* и въ отварѣ корня *змѣевика* (Dec. rad. Bistortae) съ *розовою консервою*. Отваръ колумбы съ *нафтою купоросною* или съ *Галлеровою кислотою;* наливка изъ *лишая дубоваго* (Lichen Plicatus) съ *лаванднымъ сложнымъ спиртомъ* и *коричневымъ сиропомъ;* отваръ или наливка изъ травы *барвинка* (Vinca minor) или *вербейника* (Herba salicaria, Lysimachia vulg.); отваръ или свѣжевыжатый сокъ травы и сѣмянъ *крапивы большой* и *жгучки* съ *купоросною нафтою* или съ *Гофмановыми каплями* или съ старымъ рейнвейномъ; отваръ листьевъ и стеблей *кашкары* безъ всякой примѣси.

Прим. Употребляя *кашкару* или *Сибирскую подснѣжную розу* (Rhododendron chrysanthum) съ пользою для подагриковъ и ломотныхъ, имѣлъ я случай испытать, что она есть вмѣстѣ и превосходное средство въ остановленіи сильныхъ продолжительныхъ гемороидальныхъ кровотеченій, зависящихъ отъ разслабленія и

болѣзненной раздражительности кровоносныхъ сосудовъ. Въ 1818 году употребилъ я съ великою пользою сіе средство для Г. П....., въ Санктпетербургѣ живущаго, который при мучительной ломотѣ съ опухолью и наростами въ членосоединеніяхъ рукъ и ногъ страдалъ также болѣе двухъ лѣтъ отъ сильнаго гемороидальнаго кровотеченія. Ежедневная потеря значительнаго количества крови примѣтно лишала его всякой надежды вылѣчиться отъ ломоты; день ото дня становился онъ слабѣе; стягивающіе клистиры и внутрь даваемыя лучшія изъ вяжущихъ крѣпительныхъ средствъ вмѣстѣ съ минеральными кислотами не оказали никакого успѣха; дѣйствіе ихъ продолжалось только на однѣ, много на двое сутокъ, послѣ чего теченіе опять появлялось попрежнему. Но какъ скоро больный началъ пить отваръ *кашкары* безъ примѣси другихъ средствъ, то по прошествіи трехъ сутокъ непомѣрное и столь долго продолжавшееся гемороидальное истеченіе совершенно прекратилось и уже не возобновлялось. Больный началъ примѣтно укрѣпляться и черезъ три недѣли, хотя наросты и опухоли въ членосоединеніяхъ остались, не чувствовалъ уже болѣе мучительной подагрической боли и сталъ дѣйствовать руками и ногами. Двѣ унціи стеблей и листьевъ *кашкары* варены были съ двумя бутылками воды въ горшкѣ, замазанномъ тѣстомъ, въ вольномъ жару. Больный

пилъ сего отвара по утру и ввечеру по одной чайной чашкѣ. Равнымъ образомъ въ Маѣ мѣсяцѣ прошлаго 1819 года отваръ *кашкары* предписанъ былъ мною въ Придворномъ госпиталѣ одному изъ Придворныхъ лакеевъ съ желаемымъ успѣхомъ. Средство сіе, менѣе нежели въ 8 дней, остановило у него непомѣрное геморoидальное истеченіе крови и отвратило жестокіе головные припадки ревматизма.

Какъ употребленіе сего средства въ кровотеченіяхъ доселѣ было неизвѣстно, то и рекомендую я Гг. Врачамъ испытать оное въ чрезмѣрномъ почечуѣ. Быть можетъ, что оное окажется полезнымъ и въ кровохарканіи, въ кровавомъ мочетеченіи и въ болѣзненныхъ чрезмѣрныхъ маточныхъ кровотеченіяхъ отъ великой слабости и раздражительности въ системѣ кровоносныхъ сосудовъ, особливо при ломотѣ.

Масло мастичное (Oleum Mastiches) въ семъ послѣднемъ случаѣ также многимъ геморoидалистамъ употреблено было съ превосходнымъ успѣхомъ.

Чрезмѣрное геморoидальное истеченіе, *отъ простуды* происшедшее, врачуется съ весьма хорошимъ успѣхомъ потогонными средствами (о коихъ говорено въ § 45).

Когда никакое внутреннее врачебное средство не можетъ остановить чрезмѣру сильнаго почечуйнаго кровотеченія, то, по совѣту

Беля и другихъ писателей, употребляется вкладываніе въ проходъ корпейныхъ или изъ ветхой холстины сверточекъ (закладокъ, Pessaria), намоченныхъ въ растворѣ *квасцовъ* либо слабой *купоросной кислоты*, либо въ *винномъ спиртѣ*. Или, по совѣту *Петита*, берутся два *тампона;* одинъ изъ нихъ съ двумя крѣпкими нитками влагается сначала въ задній проходъ, а за нимъ другой, надъ коимъ связываются нитки перваго такъ, чтобъ тампоны сіи могли сжать кровоточащія вены (смотри руководство къ преподаванію Хирургіи Г. Академика *Буша* 1808); либо, по совѣту *Фогеля*, заложить въ проходъ цѣльной сухой *дождевикъ* (*земляную губку*, Lycoperdon Bovista). Либо, по совѣту *Леврета*, взять баранью (или другаго животнаго) кишку и завязавъ верхній конецъ оной, впустить повыше въ проходъ, потомъ съ нижняго конца наполнить водою, завязать и засунуть сколько можно выше въ заднепроходную кишку. Впрочемъ когда можно найти жилу, изъ коей кровь течетъ непомѣрно, то всего лучше перевязать ее шелковинкою.

Чрезмѣрно сильное кровотеченіе, бывающее изъ мѣшковатой почечуйной опухоли, останавливается, по совѣту знаменитаго *Рихтера*, вырѣзываніемъ оной (§ 56).

О укрѣпленіи геморoидалистовъ послѣ большой потери крови.

§ 48.

Извѣстно, что люди, потерявшіе много крови чрезъ геморoидальное (*) истеченіе, находятся въ опасности подвергнуться разнымъ и притомъ весьма опаснымъ болѣзнямъ. Я имѣлъ случай видѣть нѣсколькихъ разслабленныхъ непомѣрною потерею крови геморoидалистовъ въ слѣдующемъ состояніи: вся наружность ихъ тѣла покрывается блѣдностію и желтизною и бываетъ холодна, пульсъ малый и бьетъ слабо, трепетаніе сердца, сильная одышка, слабость зрѣнія, жужжаніе въ ушахъ, круженіе головы, истерическіе и другіе судорожные припадки, холодныя ноги, а иногда и отекъ оныхъ и прочія явленія и слѣдствія худосочія и разслабленія всего организма, угрожаемаго водяною и другими неизлѣчимыми болѣзнями, которыя обыкновенно скоро обнаруживаются, коль скоро не будутъ заранѣе приняты нужныя предосторожности. Врачу, желающему возстановить здоровье таковаго больнаго, нужно прежде всего обратить вниманіе на важнѣйшія части или системы, въ жизненной дѣятельности своей измѣнившіяся. Скорѣе всего нужно исправить пищевареніе и крово-

(*) Равно какъ и чрезъ всякое другое.

твореніе и потомъ исключительно дѣйствовать на кровоносную систему и исправленіе всего тѣлосложенія. Пища таковыхъ больныхъ должна быть сообразна съ болѣзненнымъ расположеніемъ организма и большею частію питательная, легко сваримая и побуждающая, но отнюдь негорячащая. *Діета*, предписанная сухотному гемороидалисту, прилична и въ семъ случаѣ, съ тою только разницею, что здѣсь смѣлѣе можно позволить больному кислую пищу и питье. Комната, въ коей больной живетъ, должна быть сухая и теплая; больному нужно пользоваться умѣреннымъ моціономъ на открытомъ, чистомъ воздухѣ и остерегаться всего, что усиливаетъ волненіе въ крови и возмущаетъ духъ.

Для возбужденія дѣятельности кожи, какъ органа, имѣющаго величайшее вліяніе на всю внутренность организма, полезно больному нѣсколько разъ садиться въ теплую ванну, съ ароматическими травами и пшеничными отрубями приготовленную, въ которую, смотря по обстоятельствамъ, можно прибавлять и вино. Въ послѣдствіи же надлежитъ больному пріучать себя мало помалу и къ холодной ваннѣ желѣзной, натуральной либо искусственно приготовленной.

Послѣ приличныхъ состоянію болѣзненнаго организма летучихъ и легкихъ возбуждающихъ

средствѣ нужно для подкрѣпленія кровоносныхъ сосудовъ, пасочной системы и мускуловъ употребить постоянно дѣйствующія *крѣпительныя средства*. Наилучшія въ семъ случаѣ суть: *хина* и *желѣзо*. Нижеслѣдующіе два состава употребляю я всегда съ отмѣнною пользою.

1) Возьми: *Виттовыхъ хинныхъ капель* (Tinct. Cinchon. R. Whytti),
коричневой воды (Aqua L. Cinnamomi), каждаго по двѣ унціи,
купоросной нафты (Aether Sulphuric.) одну драхму,
лаванднаго спирту (Spirit. Lavendulae comp.) двѣ драхмы,
сиропу померанцоваго двѣ столовыя ложки, смѣшай.

Пріемъ: четыре раза въ день по столовой ложкѣ съ таковымъ же количествомъ воды.

Сей составъ крѣпительныхъ средствъ весьма скоро возстановляетъ разслабленныя силы не только послѣ большой потери крови, но и въ сильномъ разслабленіи, послѣ жестокихъ и продолжительныхъ гнилыхъ и нервныхъ горячекъ и послѣ поносовъ.

2) Возьми: *углекислой воды* (Aqua acidi carbonici recenter parata) восемь унцій,
Виттовыхъ хинныхъ капель одну унцію,

скипидарнаго масла одну драхму,
слизи Аравійской камеди одну унцію,
смѣшай.

Пріемъ: взболтавши, принимать поутру и ввечеру по одной чайной чашкѣ (*). Составъ сей, дѣйствуя на пасочные и кровоносные сосуды, на печень и весь кишечный каналъ, укрѣпляетъ желудокъ, поправляетъ отправленіе печени и кровотвореніе и отвращаетъ накопленіе воды въ тѣлѣ и примѣтнымъ образомъ возстановляетъ здоровье разслабленнаго, какъ гемороидалиста, такъ и другихъ субъектовъ, впадшихъ въ разслабленіе и худосочіе отъ непомѣрныхъ бѣлей, отъ чревныхъ заваловъ и т. п. Впрочемъ на счетъ поправленія притупленной чувствительности и раздражительности (Torpide Schwäche), бываемой обыкновенно послѣ большой потери крови, смотри § 69.

О лѣченіи слизистаго или мокротнаго почечуя.

§ 49.

При лѣченіи слизистаго почечуя (§ 8) должно имѣть въ виду какъ причины онаго, такъ и другія въ организмѣ болѣзни, слизетеченіе сопровождающія; на примѣръ: 1) слизистый почечуй, происшедшій отъ раздраженныхъ и воспа-

(*) При сей микстурѣ весьма полезно употреблять *желѣзныя* Бестужевскія капли.

ленныхъ почечуйныхъ шишекъ, лѣчится мягчительными болеутолительными и разрѣшающими наружными средствами, описанными въ § 51, съ прекращеніемъ закрытаго почечуя исчезаетъ большею частію самъ собою и мокротный почечуй. 2) Сопровождаемый истеченіемъ крови врачуется устраненіемъ причинъ сего послѣдняго и средствами, описанными въ § 47. 3) Происходящій отъ заваловъ брюшныхъ внутренностей отвращается неиначе какъ излѣченіемъ заваловъ и устраненіемъ причинъ, отъ коихъ оные произошли, см. § 61. 4) Въ мокротномъ почечуѣ, зависящемъ отъ разслабленія и чрезмѣрнаго ослизенія мокротной плевы проходной кишки, гемороидальныхъ сосудовъ и вратожильной системы, также отъ слизистаго состоянія (Status pituitosus) всего кишечнаго канала полезны нижеслѣдующія средства: a) *соль винощелочная* въ соединеніи съ горькими разрѣшающими экстрактами, на примѣръ:

Возьми: Соли винощелочной (Tartras Potassae или Tartarus tartarisatus),
экстракта одувančиковъ (extr. Leont. taraх), каждаго отъ 2 до 3 драхмъ, раствори въ шести унціяхъ мятной воды или отвара можжевеловыхъ ягодъ, смѣшай.

Пріемъ: по двѣ столовыя ложки черезъ каждые два часа. b) *Растворъ углекислаго поташа* (ol. tartar persolut.), отъ 15 до 30 капель, три

раза въ день въ столовой ложкѣ водянаго *ревеннаго настоя* (Infus. Rhei aquos.). c) *Минеральныя желѣзныя воды*, на пр: *Эгерская* или *Пирмонтская* и проч. d) *Углекислая вода* (aqua acidi carbonici), въ замѣнъ минеральныхъ водъ, въ смѣшеніи съ наливкою *девясильнаго корня* и *колытчатаго ревеня* (Infus. aquos. Rad. Inulae Helen. et Rhei palmati). При тѣлосложеніи флегматико-венозномъ и при ослизеніи вратожильной системы предписываю я съ пользою составъ изъ *углекислой воды* съ скипидарнымъ масломъ, см. § 48, и *желѣзныя Бестужевскія капли*. e) *Нашатырь* есть наилучшее средство въ слизистомъ состояніи кишечнаго канала и въ мокротномъ почечуѣ. Онъ дается вмѣстѣ съ *ревенемъ*, *померанцовою коркою* и *корнемъ Аароновой брады* (Rad. ari maculati); особенно также полезенъ онъ въ соединеніи съ сабуромъ и крѣпкою водкою (§ 64). f) *Корень девясила большаго* (R. Inulae Heleni) дѣйствуетъ весьма хорошо при разслабленіи и ослизеніи вратожильной системы. На полунцію сего корня, мѣлко изрѣзаннаго, наливаютъ шесть унцій кипятка, ставятъ у легкаго огня и по процѣженіи употребляютъ по двѣ столовыя ложки разъ шесть въ день. g) *Хина* въ видѣ холодной наливки водянистой или винной (Infusum chinae frigidum aquosum vel vinosum) съ примѣсью *нашатыря* и сироповъ *морскаго луку* и *касиморевеннаго* (Syr. squille mar. et cichorei cum

Rheo). h) *Горецъ аптечной* (Rad. Polygan bistortae) въ пилюляхъ или въ порошкѣ отъ 10 гранъ до 2 скрупуловъ на пріемъ. i) *Ягоды можжевеловыя* полезно больному ѣсть сырыя по малой горсткѣ поутру на тощакъ и къ ночи, или въ отварѣ, либо поджареныя въ видѣ *кофе*. Средство сіе весьма дѣйствительно въ мокротномъ почечуѣ при чревныхъ завалахъ, вѣтрахъ въ кишкахъ и ломотѣ. k) *Трава толокнянка* (Hb. Arbutus Uvae ursi) въ отварѣ или въ порошкѣ. l) *Кофе изъ фруктовъ каштановыхъ* или *дубовыхъ желудей* поджареныхъ.

При вышеупомянутыхъ средствахъ для внутренняго употребленія въ мокротномъ почечуѣ полезны также и наружныя, на прим: m) *клистиръ* изъ свѣжеприготовленной *известковой воды*, попеременно съ смѣсью изъ полуторыхъ драхмъ *буры* и *отвара цвѣтовъ шиповника* или отвара травы *толокнянки*. n) *Морской лукъ* (Scilla m.) считаю я также весьма полезнымъ или въ видѣ легкаго настоя или вареный съ медомъ (Oxymel squillitic.) для прибавленія къ клистиру. Когда геморроидалистъ страдаетъ отъ безпрерывнаго судорожнаго позыва къ испражненію на низъ, то въ семъ случаѣ полезенъ: o) *клистиръ* изъ крѣпкой *наливки шафрана* либо травы *белены* (Infusum croci et H. Hyosciami N.); сверхъ того p) больной долженъ садиться на пары *отвара девясила*

или *ароматическихъ травъ* съ *уксусомъ* и чаще обмывать проходъ губкою, намоченною вышеупомянутымъ теплымъ отваромъ.

При лѣченіи слизистаго почечуя у женщинъ надлежитъ всегда обращать вниманіе и на рукавъ матки, ибо истеченіе изъ онаго слизи сопровождаетъ весьма часто почечуй.

О лѣченіи закрытаго почечуя.

§ 50.

Закрытый почечуй (*закрытый геморой*, *почечуйныя шишки*), зависящій отъ мѣстнаго токмо разслабленія проходной кишки съ ея сосудами, излѣчивается съ меньшимъ трудомъ; онъ большею частію исчезаетъ съ устраненіемъ причинъ, непосредственно на заднепроходную кишку дѣйствовавшихъ, и помощію средствъ, описанныхъ въ § 42 (смот. о вспомогательномъ и о наружномъ лѣченіи почечуя).

Закрытый почечуй, который, основываясь на венозномъ тѣлосложеніи, зависитъ болѣе отъ внутреннихъ причинъ и имѣетъ тѣсную связь съ другими повреждениями въ организмѣ, на прим: съ измѣненіемъ въ вратожильной системѣ, съ разстройствомъ всего кишечнаго канала и съ завалами чревными, прекращается уже гораздо съ большимъ трудомъ, а часто и не прежде, какъ по излѣченіи упомянутыхъ недуговъ.

Совершенному излѣченію закрытаго почечуя и разрѣшенію гемороидальныхъ шишекъ или опухолей вспомоществуетъ сказанное выше на счетъ діеты, тѣлодвиженія и отвращенія запоровъ; сверхъ того полезны въ сей болѣзни нижеслѣдующія средства:

1) *Сѣрные порошки для разрѣшенія закрытаго почечуя,* на примѣръ:

Возьми: очищенной сѣры полунцію,
соли винощелочной (tartras potassae) одну унцію,
сахару три драхмы,
масла коричневаго или *мятнаго* или *рутнаго* 30 капель, смѣшай и сотри въ порошокъ.

Пріемъ: четыре раза въ день по чайной ложкѣ въ чайной чашкѣ отвара *мыльной травы.* Когда послѣ сего пріема больнаго будетъ сильно слабить, то вмѣсто 4 разъ принимать только 2 раза въ день.

Примѣчаніе. Сей порошокъ дѣйствуетъ на чревныя вены, усиливаетъ кругообращеніе крови въ оныхъ и отвращаетъ венозное накопленіе крови въ брюхѣ и въ особенности въ проходной кишкѣ, прекращаетъ упорный запоръ на низъ и колику, отъ онаго происходящую. Сіи порошки полезны также гемороидалистамъ, страждущимъ вмѣстѣ и отъ ипохондріи, ломоты и застарѣлой сыпи, и тѣмъ, кои мно-

го употребляли *меркуріальныхъ* (ртутныхъ) средствъ.

2) *Растворъ среднихъ солей для разрѣшенія закрытаго почечуя.*

Возьми: соли винокулоросной или *сѣрнокислаго поташа* (Sulphas potassae, tartar. vitriol.), либо *соли винощелочной*, либо *сѣрнокислой соды* (Sulphas sodae или sal mirabile glauberi) двѣ драхмы,
сахару одну драхму, раствори въ 4 унціяхъ отвара корня съ листьями *одуванчиковъ*, либо отвара *нарычника узлокореннаго* (Scrophularia nodosa), потомъ прибавь:
капель померанцовыхъ одну столовую ложку, смѣшай. *Пріемъ:* одну половину принять на тощій желудокъ, а другую на ночь.

Среднія соли превосходнымъ образомъ дѣйствуютъ на разрѣшеніе почечуйныхъ опухолей, на отвращеніе запора на низъ, на изгнаніе слизи и вѣтровъ, въ кишечномъ каналѣ накопившихся. Онѣ возбуждаютъ жизненную силу разслабленныхъ и ослизенныхъ конечностей чревныхъ боевыхъ жилъ и разрѣшаютъ завалы въ брюшныхъ органахъ.

3) *Микстура изъ горькихъ разрѣшающихъ экстрактовъ.*

Возьми: экстракта кудряваго волчца (extr. cardui Bened.),
экстракта корня мыльной травы (extr. saponar.), каждаго по три драхмы,
сѣрнокислаго поташу (Sulphas potassae) полунцiи, раствори въ шести унцiяхъ померанцовой воды, прибавь,
сиропа мятнаго одну унцiю, смѣшай.

Прiемъ: отъ одной до двухъ столовыхъ ложекъ четыре раза въ день.

4) *Возьми: экстракта* изъ корня и травы *львинаго зуба,* (Extr. Leontod. taraxac.),
экстракта р машковаго, каждаго по двѣ драхмы,
соли винощелочной (Tartras potassae) полунцiю, раствори въ шести унцiяхъ *мятной воды*, прибавь:
сгущеннаго соку морковнаго (Roob Dau . carotae) одну унцiю, смѣшай.

Прiемъ: четыре раза въ день по столовой ложкѣ.

5) *Винная настойка или капли отъ закрытаго почечуя.*

Возьми: *травы кудряваго волчца* (Herb. cardui Benedict.),
травы почечуйника (Herb. Polygan. Hydropiper),
корня кирказона (R. Aristoloch. clemat.),

корня мыльной травы (R. Saponar.),
верхушекъ тысячелистника (Summit. A. Millefol.),
ревеню копытчатаго, каждаго по три драхмы,
шафрану и *сгущеннаго сока сабура* (extr. aloes) по полуторы драхмы,
перцу стручковаго одну драхму.

Корни и травы мѣлко изрѣзать, а сабуръ истолочь въ крупной порошокъ, смѣшать все вмѣстѣ и налить штофомъ простаго хлѣбнаго вина, дать стоять шесть дней въ тепломъ мѣстѣ и потомъ процѣдить.

Пріемъ: отъ половины до цѣлой небольшой рюмки передъ обѣдомъ и ужиномъ. Виннаго спирту и пѣнника для сей настойки употреблять я не совѣтую, ибо они для гемороидалистовъ слишкомъ крѣпки и портятъ благотворное дѣйствіе прочихъ средствъ, въ оную входящихъ.

Сія *настойка* съ превосходною пользою замѣняетъ многіе извѣстные доселѣ горькіе *эликсиры* и *капли*, съ водкою употребляемыя. Вещи, въ оную входящія, не только возбуждаютъ позывъ на пищу и помогаютъ пищеваренію, но вспомоществуютъ при томъ разрѣшенію чревныхъ заваловъ и отвращенію накопленія въ кишечномъ каналѣ слизи и вѣтровъ.

Многіе излѣчились совершенно отъ закрытаго почечуя предписанными въ семъ § средствами, употребляя оныя нѣсколько мѣсяцовъ сряду, при надлежащей діетѣ и воздержности, вмѣстѣ съ внѣшними средствами, о коихъ сказано будетъ ниже. Впрочемъ о лѣченіи закрытаго почечуя, соединеннаго съ чревными завалами, говорено будетъ въ § 61. Гемороидальные приступы при закрытомъ почечуѣ, воспалительнаго свойства, отвращаются прохлаждающими средствами и піявицами (§ 51). Закрытый почечуй, соединенный съ разслабленіемъ и притупленіемъ кровоовозвратныхъ жилъ и сосудистыхъ нервовъ чревной полости лѣчится средствами побуждающими, какъ то: минеральными водами и проч. смотри § 59.

О лѣченіи воспаленныхъ болящихъ почечуйныхъ шишекъ или гемороидальныхъ опухолей.

§ 51.

Когда почечуйныя опухоли или шишки чрезмѣрно надуты, сильно воспалены и большую причиняютъ боль; когда гемороидалистъ страждетъ притомъ отъ жестокаго приступа, отъ судорогъ и наклонности къ воспаленію въ брюшныхъ органахъ: въ такомъ случаѣ полезны прохлаждающія лѣкарства и діета, припущеніе піявицъ или, смотря по степени воспаленія, и самое кровопусканіе. Для сего надлежитъ руковод-

ствоваться сказаннымъ въ §§ 49 и 50. Сверхъ того кромѣ мягчительныхъ, боль унимающихъ клистировъ прикладывать къ *воспаленнымъ шишкамъ* мягчительныя, противувоспалительныя и боль утоляющія средства, примочки и припарки, на примѣръ:

1) Первое мѣсто занимаетъ здѣсь *холодная вода;* намоченная ею тряпка либо губка прикладывается къ воспаленнымъ и болящимъ шишкамъ и чаще возобновляется. Многіе отвратили воспаленіе въ почечуйныхъ шишкахъ и укротили жестокую въ оныхъ боль однимъ симъ простымъ средствомъ.

2) *Возьми: бѣлой Гулардовой воды* (Solutio super acetatis plumbi) шесть унцій,
слизи изъ *сѣмянъ квитовыхъ* (Mucilago seminum cydonior) три унціи, смѣшай.

Тряпку, намоченную въ сей холодной примочкѣ, прикладывать чаще къ воспаленнымъ и болящимъ почечуйнымъ шишкамъ.

3) *Возьми: масла* изъ растѣнія, называемаго *Царскій скипетръ* (Oleum verbasci), двѣ унціи,
масла кунжутнаго (Oleum sesami orientalis) одну унцію,
три яичные бѣлка,
свинцоваго уксуса (Superacetas plumb. liquidus) одну унцію, смѣшай.

Прикладывать снаружи къ шишкамъ, какъ выше сказано.

4) Возьми: *холодной воды* два стакана,
уксусу ренскаго полстакана, смѣшай.

Остудить на льду и прикладывать, какъ выше сказано.

5) Возьми: *свѣжаго соку изъ корня рѣпейника* (Rad. Bardanae, Arctium Lappa),
свѣжаго соку изъ зрѣлыхъ *грушъ* или *яблоковъ*,
свинцовой Гулардовой воды (Solutio Superacetat. Plumbi), каждаго по одной чайной чашкѣ,
свѣжій яичной бѣлокъ, смѣшай
и употребляй снаружи, какъ выше сказано.

6) Возьми: *листьевъ дикаго льна* (Hb. Antirrhin. linar.),
листьевъ заячьей капусты (Sedum telephium),
листьевъ большаго молодила (Hb. semperviv. tectorum),
льнянаго сѣмени, каждаго по одной унціи,

изрѣжь мѣлко и смѣшавъ вмѣстѣ, истолки въ ступкѣ. Изъ сего сварить на молокѣ съ бѣлою Гулардовою водою (по ровной части) густую припарку и прохладивъ, прикладывать непосредственно на почечуйныя шишки.

Съ пользою также можно употребить:

7) *Кислое* холодное молоко въ видѣ примочки, какъ сказано о холодной водѣ.

О лѣченіи почечуйнаго вереда.

§ 52.

Когда воспаленіе въ почечуйныхъ шишкахъ (см. § 51) пройдетъ или разрѣшится и расширенный кровоносный сосудъ и плевы, составлявшія опухоль, попрежнему съужатся, т. е., придутъ въ естественное свое состояніе: то вмѣстѣ съ болью исчезаютъ обыкновенно и почечуйныя шишки; но случается, что воспаленіе шишекъ оканчивается затвердѣніемъ, переходящимъ въ сухія *почечуйныя бородавки*, либо въ нагноеніе, и тогда сіе послѣднее называется *почечуйнымъ вередомъ*.

Почечуйный вередъ или *чирей*, приходя въ нагноеніе, причиняетъ жестокую боль не только въ проходѣ и въ частяхъ, около онаго находящихся, но чрезъ сочувствіе и во всемъ тѣлѣ. Испражненіе низомъ пріостанавливается, а иногда и испущеніе мочи затрудняется, больной не только не въ состояніи ходить, но и въ постелѣ съ трудомъ пошевелиться можетъ, теряетъ аппетитъ и отъ безсонницы и головной боли весьма изнемогаетъ. Какъ *вередъ* сей образуется не изъ одного воспаленнаго кровоноснаго сосуда, но вмѣстѣ и изъ клетчатой

плевы и другихъ смежныхъ частей, то и бываетъ упоренъ къ излѣченію и легко переходитъ въ свищъ (фистула) и язвы или раны (Ulcera Haemorrhoidalia), также упорныя къ излѣченію.

Лѣченіе почечуйнаго вереда состоитъ въ пособіи натурѣ къ скорѣйшему приведенію нарыва въ созрѣніе, въ испраздненіи матеріи и въ заживленіи раны. Для перваго употребляются мягчительныя припарки, кои должны быть негорячи и не имѣть въ себѣ ничего сильно раздражающаго; въ противномъ случаѣ воспаленіе увеличится и нарывъ можетъ перейти въ антоновъ огонь.

1) Мягчительная припарка.

Возьми: *травы просвирняка аптечнаго* (Herba Althaae officinal.),
травы просвирокъ или *рожи* (Herba Malvae),
сѣмянъ льняныхъ и *листьевъ донника* (T. Meliloti), каждаго по одной горсти, изрѣжь мѣлко и истолки въ ступкѣ, потомъ прибавь крошекъ отъ мякиша *бѣлаго хлѣба* одну же горсть, вари съ свѣжимъ *молокомъ* до тѣхъ поръ, пока все хорошо разварится и сдѣлается кашею, которую, наложивъ густо на тряпку, и теплую (но отнюдь негорячую), какъ выше сказано, приложить къ вереду. Сіе возобновлять разъ шесть въ сутки. При пере-

мѣнѣ припарки проходъ около вереда каждый разъ обмывать губкою, намоченною подогрѣтымъ *молокомъ*.

Когда послѣ двухъдневной припарки вередъ совершенно не созрѣетъ, тогда нужно сдѣлать слѣдующую припарку:

2) Возьми: *мякиша бѣлаго хлѣба*, мѣлко искрошеннаго, двѣ горсти,
луку рѣпчатаго, очищеннаго и истолченнаго, столовую ложку,
меду обыкновеннаго столько же,
молока свѣжаго, сколько нужно,

все сіе вари дотѣхъ поръ, пока разварится и сдѣлается кашею, которую, наложивъ густо на тряпку, приложи непосредственно къ вереду. Сіе надлежитъ также возобновлять раза четыре въ сутки, промывая между тѣмъ проходъ тепловатымъ молокомъ.

Когда созрѣвшій послѣ сего нарывъ самъ собою не прорвется, то приложить къ оному часовъ на восемь мѣдовую лепешку и потомъ уже открыть его ланцетомъ и выпустить гной. При выжиманіи гноя отнюдь не дѣлать сильнаго давленія. Для совершеннаго смягченія почечуйнаго вереда и испраздненія изъ него всей матеріи надлежитъ послѣ вскрытія нарыва еще дня три употреблять первую мягчительную припарку, а потомъ для вытягиванія оставшагося гноя и заживленія раны прикладывать пластырь *діахильный сложный* (Empl. Gummiresinosum).

Об утолении геморроидальной боли нервного свойства

Геморроидальная боль в проходе нервного свойства, сверх показанных в предыдущем параграфе средств отвращается нижеследующими средствами

1. Мазь дикольная (Unguentum de linaria), во всех аптеках имеющаяся, еще издревле почитается в сем случае полезною и ныне многими употребляемая с успехом.

Н. Вольф хранил сие средство как секретное, и часто вылечивал им от геморроя. Наконец, он открыл свой секрет, состоящий в следующем: он брал пригоршни травы с листьями дикого льна (Herba linariae vulgaris), только с потребным количеством свежего свиного сала, потом, вскипятив, пока сделается из него пятка мазь, вынимал оную, остуживал и при употреблении смешивал с желтком яичным. Больной намазывал сию мазь на тряпочку тоненькую, либо на кусок шелковой материи и прикладывал к большим геморроидальным шишкам.

Гэрсе совэтует мазь эту приготовить из одних цветов дикого льна. Он утолит ее в одну минуту. Геморроидальные боли у таких больных, которые от оной не могли ни прямо стоять, ни ходить, ни сидеть.

2) Свинцовый протеарат (уксуснокислый) (Cerat Saturnini), губной розовой помады, светлый не соленый жир, масло какао-вое, масло миндальное и масло оливковое, намазанные на тряпку, прикладывать к геморроидальным шишкам и чтобы возобновиться.

3. Корень норичника узлокорнистого (radix Scrophulariae nodosae, Braunwurzel) (черные или hemorrhoides называются также ежевичные головки), для утоления геморроидальных болей, признан многими врачами как наиполезнейшее средство. Зеродт говорит, что сила его рассуждения, несмешанного дешевы ни чем, либо в соединении с вышеупомянутым льном диким в зерне в виде примочки, либо в виде мази, столь действительна для утоления геморроидальной боли, что нельзя было бы было, чтобы

Проявление и для всех прочих болезней даровало нам подобное столь верно и скоро действующее средство. Сеннетр торжественно заявляет (утверждает), что один больной страдал от нестерпимой геморроидной боли и в минуту излечен был сим растением. О такой чудесной силе Норичника подтверждают также Сальмендер, Етмиллер и Доон-Гере. Один унц (30 гр.) мелко изрезанного корня Норичника варить в 2 фунтах воды (720 гр.) и этим отваром прикладывать снаружи болящие геморроидальные шишки. Советуют также для утоления жестокой геморроидной боли, отвар сей принимать и внутрь от половины до целой бутылки в утро. Равным образом и свежие истолченные листья Норичника прикладывать снаружи к проходу.

1. Жабник щитовидный (Chb. et vad. ranunculi ficaria) найден также полезным от геморроидальной боли. Истолченные корень и листы его растения прикладываются к болящим геморр. отекшим шишкам.

листья, с ними наготовленные, дающая внутрь, перегнанная вода (aqua destill. rapunculi fisajo) употребляется снаружи в виде примочки. Сосенандер остановился удачно сим средством против обильное геморроид. истечения угрожившему больному водяной болезнью.

5. Мешунный корень. Лепиц. уверяет, что он не находит лучшего средства к излечению геморроид. боли, кои сей корень

в) Наркотич. растения, как то: листья белены (нь. Hyoscyamus niger). сонной одури (кореньки белладона), пейоты (нь. Solanum nigri) дурмана (нь. Datura stramonium), суть превосходнейшие средства для утоления геморроид. боли наравне свойства. Надлежит только употреб. их с большой осторожностью, и отнюдь не в виде спирта, но водою, в виде примарок (fomenta anodyna) и мазей.

О смягченіи и разрѣшеніи жесткихъ невоспаленныхъ почечуйныхъ шишекъ.

§ 53.

Когда воспаленіе въ почечуйныхъ опухоляхъ прекращено, но жесткость и боль еще остаются, то для смягченія и разрѣшенія оныхъ больной долженъ 1) садиться на тепловатые пары изъ отвара мягчительныхъ травъ, на прим:

Возьми: *травы просвирокъ* (H. Malvae.),
льнянаго толченаго сѣмени и
ромашки, каждаго по горсти,

вскипяти съ водою (одной бутылки для сего достаточно) потомъ процѣди. Къ сему отвару, прибавляется нѣсколько коровьяго молока и наливается на горячую плитку или кирпичь, подставленный въ тазу подъ пустымъ стуломъ, на который больной садится. Либо 2) изъ сего же отвара сдѣлать гузенную ванну (Insessio), то есть, садиться раза два въ день на полчаса задницею въ сосудъ, наполненный симъ теплымъ отваромъ. Сверхъ того прикладывать къ шишкамъ нижеслѣдующія мази и примочки:

3) Возьми: *проскурнячной мази* (Ungv. de Alth.)
двѣ унціи,
неаполитани шесть драхмъ,
экстракта шафраннаго двѣ драхмы,
смѣшай,

намазавъ густо на тряпку или на корпію, прикладывать непосредственно на жесткія почечуйныя опухоли.

4) Возьми: *свинцоваго церата* (Ceratum Superacetatis Plumbi) двѣ унціи,
эссенціи Галбановой полторы драхмы,
буры и
опія, каждаго по драхмѣ, смѣшай.

Прикладывать такимъ же образомъ, какъ и предъидущую.

5) Возьми: *сѣрныхъ цвѣтовъ* полунціи,
скипидару (Balsamum Pineolaric.) одну унцію,
яичнаго бѣлка и
можжевеловаго масла (Oleum juniperi communis), каждаго по двѣ драхмы, смѣшай.

Прикладывать два раза въ день на 2 или на 3 часа. Между тѣмъ почечуйныя опухоли и проходъ промывать чаще губкою либо корпіею съ слѣдующимъ растворомъ *буры:*

6) Возьми: *буры* двѣ драхмы, раствори въ осьми унціяхъ отвара листьевъ *белены* (Decoct. Hb. Hyosc. Nig.) или *болиголова* (Dec. H. cicutae).

Сей же самый растворъ *буры*, для утоленія боли въ почечуйныхъ опухоляхъ и для разрѣшенія оныхъ, съ пользою также прикладывать можно

къ проходу на корпіи или тряпкѣ въ видѣ примочки.

Мокротныя невоспаленныя почечуйныя шишки разрѣшаются слѣдующимъ средствомъ:

1) *Возьми:* листьевъ *козачьяго можжевельника*, мѣлко изрѣзанныхъ, одну унцію, вари съ однимъ фунтомъ воды въ закрытомъ сосудѣ, пока укипитъ до половины, процѣди и потомъ раствори въ семъ отварѣ,
буры (Subboras sodae) двѣ драхмы.

Корпія или тряпка, онымъ намоченная, прикладывается къ шишкамъ.

2) *Возьми: масла* изъ *козачьяго можжевельника* (ol. Juniper. Sabinae двѣ драхмы, *масла* изъ растѣнія *Царскій скипетръ* (ol. verbasci) полунціи,
свинцоваго церата одну унцію, смѣшай.

Намазавъ на свертокъ корпіи, прикладывать къ почечуйнымъ шишкамъ.

3) *Возьми: чернильныхъ орѣшковъ* въ самый мѣлкій порошокъ истертыхъ, двѣ драхмы,
эссенціи Галбанной двѣ драхмы,
свинцоваго церату одну унцію, смѣшай.

Употреблять снаружи, какъ выше сказано.

Сухія жесткія *почечуйныя бородавки* должно сначала смягчить или прикладываніемъ мягчительной припарки (§ 52) или однимъ печенымъ лукомъ и потомъ прикладывать на оныя вышепоказанныя мази изъ масла *козачьяго можжевельника* и *чернильныхъ орѣшковъ*.

§ 54.

Когда *почечуйныя опухоли*, глубоко въ проходной кишкѣ сидящія, при испражненіи сдавливаются внизъ и сжимающими проходъ мускулами ущемляются въ самомъ проходѣ: то для отвращенія таковаго ущемленія (Incarceratio) надлежитъ опухоли пальцомъ, вымазаннымъ яичнымъ бѣлкомъ или дерявяннымъ масломъ, вправить вверьхъ на прежнее ихъ мѣсто.

Примѣчаніе. Какъ ущемленныя такимъ образомъ опухоли снаружи непримѣтны и узнаются только мѣстнымъ изслѣдованіемъ, то причиняемую ими боль легко можно ошибкою принять за обыкновенныя гемороидальныя боли и тѣмъ причинить больному большой вредъ, и потому таковый случай долженъ служить намъ доказательствомъ, сколь нужно при лѣченіи почечуя *мѣстное изслѣдованіе* въ проходѣ (*).

(*) При лѣченіи почечуя отнюдь не должно выпускать изъ вида мѣстнаго изслѣдованія или осмотра прохода, къ чему бы гемороидалистъ болѣзнь свою ни относилъ, т. е., текучій ли онъ или слѣпый или слизистый, но всегда нужно осмотрѣть мѣсто болѣзни. Симъ только образомъ можно удостовѣриться о

§ 55.

Почечуйныя опухоли, при испражненіи выходящія наружу, надлежитъ немедленно вправлять внутрь, дабы онѣ внѣ прохода не ущемлялись. Сіе вправленіе, производимое пальцомъ, вымазаннымъ въ яичномъ бѣлкѣ, весьма облегчается, когда больный ляжетъ въ сіе время на спину, приподнявъ задницу, и когда довольно сильно будетъ разводить ягодицы одну отъ другой. При семъ долженъ онъ удерживаться отъ малѣйшаго жиленья, къ которому раздраженная кишка ежеминутно его побуждаетъ.

Для укрѣпленія разслабленныхъ оболочекъ и сосудовъ кишки, выходящей наружу, одобряется прикладываніе тряпокъ, намоченныхъ *краснымъ виномъ, растворомъ буры* или *квасцовъ* съ отваромъ ароматическихъ травъ, *отваромъ завязнаго корня* или *чернильныхъ*

настоящемъ состояніи болѣзни. Извѣстно, что не одинъ разъ находимы были свищи въ проходѣ и шишки отъ венерическаго зараженія (Condylomata), между тѣмъ какъ больные увѣряли, что у нихъ почечуйныя *шишки*, слизистый почечуй и т. п. Врачи, несоблюдающіе сей предосторожности, легко могутъ ошибиться и начать лѣчить болѣзнь, коей у больнаго вовсе нѣтъ, могутъ потерять время, нужное къ отвращенію иногда важныхъ болѣзней. Къ послѣднимъ можно отнести *съуженіе* проходной кишки (Strictura int. recti) и скиррозныя затвердѣнія.

орѣшковъ или дубовой коры, либо просто *холодною водою*. *Шмуккеру* удалось въ 24 часа совершенно излѣчить застарѣлое выпаденіе заднепроходной кишки единственно примочками и клистирами изъ холодной воды.

Недавно имѣлъ я случай видѣть превосходное дѣйствіе піявицъ въ отвращеніи застарѣлаго выпаденія заднепроходной кишки, и именно: одному больному для излѣченія сильнаго геморoидальнаго приступа, послѣ сильнаго тѣлодвиженія и неумѣреннаго употребленія винъ приключившагося, нужно было къ почечуйнымъ шишкамъ, вышедшимъ наружу вмѣстѣ съ внутреннею оболочкою проходной кишки, припустить 13 піявицъ. Симъ способомъ больной не только излѣчился отъ мучительной въ проходѣ геморoидальной боли, но вмѣстѣ съ тѣмъ сверхъ чаянія и отъ застарѣлаго выпаденія кишки (Prolapsus intestini r.). Воспаленіе, піявицами произведенное, вѣроятно, способствовало къ срощенію и укрѣпленію внутренней ослабшей и отдѣлившейся плевы заднепроходной кишки; о семъ смотри еще § 42 пунктъ 6.

§ 56.

Случается, что отъ несоблюденія вышесказанной предосторожности почечуйныя опухоли или шишки, выпадшія наружу, иногда ущемляются и опухаютъ такъ сильно, что никоимъ образомъ ни вправлены, ниже истреблены быть не

могутъ. Въ семъ случаѣ для облегченія страданій больнаго и для отвращенія нагноенія и самаго антонова огня нужно почечуйную опухоль прорѣзать ланцетомъ и очистивъ ее отъ ссѣвшейся крови и слизи, обмыть теплою водою съ краснымъ виномъ; разрѣзанныя части соединить повязкою, состоящею изъ компресса, намоченнаго краснымъ виномъ, либо теденовою примочкою отъ ранъ и Т образнаго бинта.

Ежели прорѣзанная опухоль велика и такъ разслаблена и толста, что не только не льзя ожидать скораго заживленія, но еще можно опасаться произрожденія свищовой (фистулюзной) раны и продолжительнаго нагноенія: то въ такомъ случаѣ весь пустой мѣшокъ вырѣзывается и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Надлежитъ замѣтить, что сію *операцію* всего лучше дѣлать тогда, когда почечуйный мѣшокъ уже совершенно освобожденъ отъ крови и слизи, или когда онъ по крайней мѣрѣ ослабленъ. Опасеніе могущаго яко бы случиться сильнаго воспаленія, таковаго же кровотеченія и сращенія прохода послѣ сей операціи неосновательно, и гемороидалисты вовсе не имѣютъ причины страшиться сей операціи, въ чемъ увѣряютъ насъ и лучшіе Хирурги.

Знаменитый Хирургъ *Рихтеръ* совѣтуетъ въ семъ случаѣ почечуйный мѣшокъ захватывать щипчиками (pincette) и отрѣзывать ножницами, но только такимъ образомъ, чтобы

третья или четвертая часть мѣшка при основаніи его оставалась невырѣзанною. Остатокъ сей помогаетъ какъ скорѣйшему соединенію раны, такъ и удобнѣйшему унятію кровотеченія.

Операція бываетъ также нужна и тогда, когда отъ частаго выхожденія внутреннихъ почечуйныхъ опухолей наружу внутренняя оболочка проходной кишки до того разслабнетъ и утончится, что навсегда остается внѣ прохода висящею. Сія оболочка обыкновенно усажена бываетъ жесткими почечуйными шишками, представляя вѣнцеобразную около прохода опухоль величиною съ куриное яицо и болѣе. Таковое выпаденіе шишекъ хотя и вправляется, но вскорѣ выходитъ опять наружу и нерѣдко никакими средствами излѣчено быть не можетъ. Въ семъ случаѣ совѣтуется опухоль вырѣзать близь самаго края внѣшняго проходъ сжимающаго мускула. Какъ сіе выпаденіе есть одна только внутренняя оболочка кишки, то и вырѣзываемая опухоль надъ проходомъ бываетъ обыкновенно весьма тонка и рана послѣ операціи остается легкая.

Бель предлагалъ, какъ единственное надежное средство къ истребленію большихъ почечуйныхъ мѣшковъ около прохода, дѣлать перевязываніе (das Abbinden) шелковинкою. Двѣ навощенныя шелковинки (лигатуры) вдѣваются въ одну иглу, которою прокалывается почечуй-

ный мѣшокъ въ срединѣ его основанія, и съ обѣихъ сторонъ лигатурами перевязывается; послѣ чего черезъ два или три дня перевязанная почечуйная опухоль отпадаетъ. Сей перевязки не имѣлъ я еще случая дѣлать; но только извѣстно намъ отъ *Рейля* и другихъ писателей, что послѣ оной оказываются иногда вредныя послѣдствія, какъ то, головная боль, воспаленіе въ проходной кишкѣ, а иногда и выше, икота, лихорадка и судороги.

Объ отвращеніи сильнаго сжатія или съуженія заднепроходной кишки.

§ 57.

Случается, что заднепроходная кишка отъ затвердѣнія и опуханія оболочекъ, отъ сращенія плевистыхъ ея волоконъ, отъ *варикознаго* распуханія венъ (*) или отъ судорогъ въ діаметрѣ своемъ чрезвычайно съуживается или сжимается (Strictura intestini recti). Таковое важное болѣзненное состояніе ошибкою, къ великому вреду больнаго, можетъ быть принято за упорный запоръ отъ другихъ маловажныхъ причинъ или за внутреннія почечуйныя опухоли. Болѣзнь сію узнать можно наружнымъ изслѣдованіемъ прохода пальцомъ, въ проходъ впу-

(*) *Petit* видѣлъ всю внутреннюю сторону заднепроходной кишки до S образнаго сгиба ободочной съ варикознымъ расширеніемъ венъ.

щеннымъ, при чемъ проходная кишка ощущается стѣсненною, именно небольшими шишками или плевистыми маленькими волокнами (Bonetus); либо впущенію пальца препятствуетъ жесткое кольцо, образующееся изъ внутренней оболочки кишки, похожее на хрящъ (Morgagni); по затруднительному, болью сопровождаемому, испражненію низомъ, при которомъ экскременты (калъ) выходятъ тонкіе, свитые на подобіе червя либо въ видѣ маленькихъ катышковъ (*). Въ послѣдствіи экскременты дѣлаются водянистыми, похожими на поносъ, котораго Scherwin прекращать не совѣтуетъ. Сверхъ того при испражненіи съ жестокимъ жиленьемъ испражняется и матерія гною подобная. Напослѣдокъ начинаетъ страдать и все тѣлосложеніе больнаго; безпрерывныя отрыжки, а иногда и рвота становятся мучительны. Замѣчено, что при сей болѣзни около прохода образуются нарывы, которые либо открываются въ рукавѣ матки (у женщинъ), либо причиняютъ сращеніе заднепроходной кишки съ мочевымъ пузыремъ (у мущинъ); отъ сего экскременты и вѣтры выходятъ мочевымъ каналомъ. Всего чаще однакожъ открываются сіи нарывы въ мягкихъ частяхъ ягодицы и произ-

(*) Упорные запоры низомъ хотя и составляютъ главный припадокъ съуженія кишки, но оный, ко вреду больнаго, большею частію неузнается, поелику слабительныя лѣкарства легко отвращаютъ таковые запоры.

водятъ свищевыя раны. *Thomas Copeland* замѣчаетъ, что сжатіе толстыхъ кишекъ нерѣдко принимается за болѣзнь, извѣстную подъ именемъ *Miserere* или *Ileus* (завитіе кишекъ).

Къ отвращенію сѣуженія заднепроходной кишки совѣтуется: 1) вкладываніе въ проходъ врачебныхъ свѣчекъ (Bougies), масломъ или меркуріальною мазью вымазанныхъ и отъ времени до времени увеличиваемыхъ; 2) употребленіе тонкихъ закладокъ изъ грецкой высушенной губки (съ тѣмъ, чтобъ оная въ кишкѣ разбухла). Въ крайнихъ случаяхъ 3) для расширенія сѣужившейся кишки, а иногда и для вспомоществованія къ испражненію сильно сгустившихся экскрементовъ, можно употребить машинку и сприцъ, изобрѣтенныя Гг. *Москатіемъ* и *Маззоніемъ* (*). Въ сильномъ же кольцеобразномъ сжатіи нужно 4) заднепроходную кишку въ задней, къ крестцовой кости обращенной ея части, бистуріею съ пуговкою надрѣзать (**). *Petit* находилъ болѣзнь сію большею частію соединенную съ венерическою, и потому меркуріальныя средства внутрь и снаружи посредствомъ врачебныхъ свѣчекъ ока-

---

(*) См. die neuesten Wahrheiten und Erfahrungen für Aerzte und Wundaerzte von D. A. *Löffler*. 111 L. 606 pag.

(**) Copeland и Ford.

Wiseman доказалъ, что сія важная болѣзнь посредствомъ таковой операціи дѣйствительно иногда излѣчивается.

зывали хорошее дѣйствіе. Впрочемъ отъ внутреннихъ средствъ, исключая смягчающихъ и тѣхъ, кои нужны для поддержанія свободнаго испражненія низомъ, никакой здѣсь пользы ожидать не льзя, развѣ когда судорожныя сокращенія мускуловъ, проходъ сжимающихъ, будутъ тому причиною; въ таковомъ случаѣ полезны теплые ароматическіе пары, опій или *масло белены* снаружи.

Ежели съуженіе кишки случится у женщинъ, у которыхъ, по мнѣнію *Коеланда*, оное чаще и бываетъ, то Врачу должно обратить вниманіе на состояніе ихъ матки, не она ли причиною сего сжатія, нѣтъ ли въ маткѣ опухоли, прижимающей кишку, задерживающей экскременты и воспящающей свободное кругообращеніе крови. При множествѣ почечуйныхъ шишекъ, стѣснляющихъ діаметръ заднепроходной кишки, кромѣ врачебныхъ свѣчекъ, полезны и впрыскиванія въ проходъ раствора *сѣрнокислаго цинка* (Sulphas Zinci) и *буры*.

О распознаваніи и лѣченіи скиррознаго затвердѣнія заднепроходной кишки.

§ 58.

Скиррозное затвердѣніе заднепроходной кишки (Carcinoma intestini recti) можетъ быть какъ слѣдствіемъ почечуя, такъ и причиною онаго. Оно причиняетъ припадки, похожіе на вышеописанное *съуженіе проходной кишки*

(Strictura intest. R.) и по ошибкѣ легко можетъ быть принято какъ за съуженіе, такъ и за почечуй, слѣдственно и лѣчено методомъ совсѣмъ противнымъ столь важной болѣзни, каковъ есть *скирръ*. Для предупрежденія сей ошибки, могущей нанесть великій вредъ больному и даже ускорить его смерть, счелъ я за нужное описать здѣсь сію болѣзнь.

Скиррозное затвердѣніе проходной кишки узнается по нижеслѣдующимъ явленіямъ: больной чувствуетъ колючую или какъ бы сверлящую боль въ проходной кишкѣ; боль сія бываетъ и безъ побужденія къ испражненію, при испражненіи же гораздо усиливается и дѣлается жесточайшею, нежели какова бываетъ при вышеописанномъ съуженіи проходной кишки. При съуженіи боль напротивъ ощущается только во время испражненія или вскорѣ послѣ онаго. Стѣны проходной кишки, страждущей во всемъ ея пространствѣ, сжаты и въ діаметрѣ своемъ съужены до того, что испражненіе экскрементовъ становится весьма болѣзненнымъ, а напослѣдокъ и совершенно задерживается. Изъ прохода сильно истекаетъ въ большомъ количествѣ слизь, гемороидальныя вены раздуваются, образуютъ около прохода опухоль и испускаютъ изъ себя кровь, какъ при почечуѣ. Больные сего рода скоро изнуряются и худѣютъ, все тѣлосложеніе въ болѣзни сей болѣе страждетъ, и здѣсь болѣе сочувственныхъ болѣзней

замѣчается, нежели при простомъ съуженіи кишки; желѣза брыжейки обыкновенно напослѣдокъ также поражаются скирромъ. Dr. *Baillie* замѣчаетъ, что когда въ которой либо части кишекъ случится ракъ, то неминуемо поражаются онымъ вмѣстѣ и желѣза брыжеечныя.

Лѣченіе. Извѣстно, что *скиррозная опухоль*, переходящая въ *ракъ*, вообще излѣчивается только помощію операціи (совершеннымъ вырѣзываніемъ пораженной части), и то не всегда. Здѣсь же Г. *Кларкъ* (*) находитъ операцію безполезною и потому совѣтуетъ лучше оной не дѣлать, а предоставить натурѣ. Онъ говоритъ, что отъ всѣхъ наружныхъ средствъ пользы также весьма мало ожидать можно; напротивъ всѣ пластыри и другія сильно раздражающія средства всегда большой вредъ причиняютъ. При *скиррозной* затвердѣлости проходной кишки больной долженъ наблюдать строгую *діету*. Полезнѣйшая въ семъ случаѣ пища есть растительная, съ малымъ количествомъ мясной. Всѣ спиртуозные напитки вредны. Въ началѣ болѣзни, при крѣпкомъ тѣлосложеніи и воспалительномъ состояніи проходной кишки, совѣтуется припустить піявицъ къ поясницѣ и около задняго прохода, только отнюдь не къ самой затвердѣлости; стараться отвращать на-

(*) Clarke über die Krankheiten des Weibes, übersetzt von Dr. Heineken, 1818.

копленіе въ прямой кишкѣ густыхъ и жесткихъ экскрементовъ; для сего одобряются легкія слабительныя, каковы суть: *сѣрный цвѣтъ, манна, масло клещевинное* (Oleum ricini), *Александрійскій листъ* и соль *слабительная* (Sulphas magnesiae). Истеченія слизи останавливать не слѣдуетъ и потому не употреблять вяжущихъ средствъ какъ снаружи, такъ и внутрь. Части около прохода чаще промывать теплою водою или теплымъ молокомъ, дабы острота истекающей слизи не вредила кожѣ.

Сверхъ вышесказаннаго нахожу я полезнымъ въ сей скиррозной затвердѣлости употребленіе внутрь: 1) *углекислой воды* съ экстрактомъ *болиголова;* 2) больному болѣе давать пить отвара изъ травы *череда* или *водопласная заноска* (Bidens tripartita), какъ средство, съ успѣхомъ иногда употребляемое, особливо простолюдимами, въ золотухѣ, въ венерической и ракѣ. Снаружи для обмытія прохода, также для дѣланія больному гузенной ванны и для окуриванія больнаго мѣста, совѣтую брать слѣдующій отваръ или *декоктъ:*

3) Возьми: *травы съ стеблемъ чистотѣла* (H. Chelidonii maj.),
травы череды (Hb. Bidens tripartita) и
травы болиголова (Herb. Conii Macul.),
каждаго по горсти, изрѣжь мѣлко и смѣшай.

Все сіе положить въ горшокъ и налить двумя бутылками кипячей воды; горшокъ покрыть и замазать тѣстомъ и поставить въ вольной жаръ въ печь, гдѣ должно прѣть часовъ шесть, потомъ процѣдить и гущу выжать. 4) Вмѣсто питья совѣтую больному употреблять Зелцерскую воду, или одну саму по себѣ, либо въ смѣшеніи съ отваромъ молока съ винными ягодами. 5) Снаружи къ затвердѣлости полезно прикладывать свѣжее масло, сбитое изъ сливокъ, одно само по себѣ въ видѣ мази, либо 6) въ смѣшеніи съ винными ягодами, густо сваренными съ молокомъ, въ видѣ припарки. Сіе послѣднее средство и питье внутрь отвара винныхъ ягодъ съ молокомъ съ пользою употреблялъ Американскій Медикъ *Рошъ* отъ *рака*. Мнѣ кажется, что не безполезно употребить въ сей болѣзни и гузенную ванну изъ барды.

О лѣченіи средствами почечуй гонящими.

§ 59.

Многіе изъ гемороидалистовъ, досадующихъ на то, что почечуй у нихъ не открывается, или что оный течетъ недостаточно, охотно прибѣгаютъ къ настойкамъ, пилюлямъ и эликсирамъ, почечуй гонящимъ. Многіе даже и изъ Врачей ищутъ рецепты таковымъ средствамъ и находятъ ихъ въ разныхъ древнихъ сочиненіяхъ. Жаль, что здѣсь многіе весьма ошибаются въ образѣ дѣйствія сихъ средствъ и что

слово *гнать* не такъ понимаютъ, какъ бы слѣдовало.

Слово *гнать почечуй* или *геморой* (Pellere, Treiben) означаетъ въ самомъ дѣлѣ ничто иное, какъ *возбужденіе* или *раздраженіе*, производимое извѣстными средствами на кровоносные и пасочные сосуды, сосудистые нервы и плевы къ органическому оныхъ противодѣйствію. Средства сіи въ умѣренныхъ пріемахъ, раздражая онѣмѣлые, ослабленные и ослизенные кровоносные сосуды вратожильной системы и прочихъ чревныхъ органовъ, приводятъ накопившуюся и застоявшуюся въ нихъ кровь въ движеніе. Они, возбуждая мышечныя волокны и слизистую плеву толстыхъ кишекъ, пришедшихъ въ состояніе лѣности, недѣятельности или онѣмѣлости (Torpor, Atonia), также усиливая испареніе сихъ кишекъ, вспомоществуютъ слабленію на низъ и отвращенію тягостнаго накопленія густыхъ и жесткихъ экскрементовъ и вредныхъ паровъ; возбужденіемъ же жизненной дѣятельности волоконъ и сосудовъ способствуютъ уничтоженію судорогъ и опухолей въ печени, селезенкѣ, брыжейкѣ, въ почкахъ и проч.

Примѣчаніе. Сіи средства въ большихъ пріемахъ, дѣйствуя слишкомъ сильно, причиняютъ чрезмѣрный приливъ соковъ къ частямъ тѣла, ими раздражаемымъ, и въ сильной степени своего дѣйствія вытѣсняютъ кровь изъ

конечностей сосудовъ. По сей причинѣ и производятъ онѣ иногда кровотеченіе изъ геморoидальныхъ сосудовъ, изъ матки, изъ мочеваго пузыря и т. д., и потому названы *гонящими*.

Изъ вышеобъясненнаго образа дѣйствія средствъ, почечуй гонящихъ (Pellentia), открывается само собою, что гораздо приличнѣе и справедливѣе слово *гнать почечуй* перемѣнить на слово *побуждать* чревные сосуды и внутренности (incitare, stimulare), и что изъ сего же оказывается, какъ грубо ошибаются тѣ люди, кои средства сіи употребляютъ съ тѣмъ, чтобы гнать изъ тѣла почечуйную кровь. Ежели сіи побуждающія средства усиленнымъ дѣйствіемъ своимъ и (дѣйствительно) откроютъ текучій почечуй, какъ выше сказано: то простаки обыкновенно думаютъ, что отъ сей-то истекшей крови зависитъ весь успѣхъ облегченія или излѣченія; они никакъ не хотятъ понять, что здѣсь благотворное дѣйствіе лѣкарствъ основывается на сдѣланной ими перемѣнѣ въ жизненной дѣятельности (Irritatio et Reactio) геморoидальныхъ и прочихъ съ ними въ связи состоящихъ сосудовъ и нервовъ.

Случаи, въ коихъ употребленіе побуждающихъ или такъ называемыхъ почечуй гонящихъ средствъ возбраняется, суть: 1) когда геморoидалистъ полнокровенъ, крѣпкаго тѣлосложенія и когда брюшные органы находятся въ состояніи сильнаго раздраженія съ наклонностію

къ воспаленію, и 2) когда жестокіе припадки въ брюхѣ, остановившіе внезапно почечуйное теченіе, еще продолжаются. Для стариковъ, людей худосочныхъ и малокровныхъ, средства сіи хотя и не вовсе запрещаются, но при всемъ томъ должны быть употребляемы неиначе, какъ съ величайшею осторожностію, и то въ смѣшеніи съ противусудорожными и крѣпительными средствами, съ питательною, легкою пищею и съ употребленіемъ теплыхъ ароматическихъ ваннъ.

Средства, *побуждающія сосуды* и *внутренности чрева* или такъ называемыя почечуй гонящія, суть:

1) Пилюли изъ сабура.

Возьми: *сгущеннаго сока сабура* (Gummiresinae Aloes) одну драхму,
мыла бѣлаго полдрахмы,
сиропа аммоніачнаго (Surupi ammoniaci), сколько потребно, смѣшай и сдѣлавъ пилюли, каждую вѣсомъ въ два грана, обсыпь порошкомъ плаунным. *Пріемъ*: отъ двухъ до четырехъ пилюль на ночь.

Примѣчаніе. Количество сихъ пилюль и нижепоказанныхъ порошковъ опредѣляется вѣрнѣе по мѣрѣ производимаго ими слабленія на низъ, которое не должно быть сильно; иначе, особливо при водянистыхъ испражненіяхъ, могутъ онѣ вредить.

2) Порошки изъ сабура.

Возьми: *сгущеннаго соку сабура* (Extr. Aloes aquos.) два грана,
сахару десять гранъ,
масла коричневаго или *сассафраснаго* (Ol. cinnamomi vel sassafras) двѣ капли, смѣшай и сотри въ порошокъ.

Пріемъ: поутру и ввечеру по одному порошку для тѣхъ, кои пилюль принимать не могутъ.

Примѣчаніе. При боляхъ въ толстыхъ кишкахъ съ пользою примѣшивается въ составъ сихъ пилюль и порошковъ *экстрактъ белены* (Succus spissatus hyosc.) отъ двухъ до трехъ гранъ на каждый пріемъ.

Сабуръ есть любимое гемороидалистовъ средство; нѣтъ почти ни однихъ пилюль, ни капель, особливо настоекъ, гдѣ бы не было сабуру. Онъ дѣйствуетъ раздраженіемъ своимъ на сплетеніе брюшныхъ нервовъ и въ особенности на части, въ низу таза лежащія и пришедшія въ состояніе нечувствительности (Torpor), на прим: дѣйствуя на слизистую плеву нижняго конца кишечнаго канала, на гемороидальные сосуды и на мочевой пузырь, побуждаетъ онъ ихъ къ жизненной дѣятельности, усиливаетъ въ оныхъ обращеніе крови, разбиваетъ накопленія слизи и кровяные застои и отвращаетъ запоръ.

Впрочемъ употребленіе сабура требуетъ осторожности. При запорѣ долженъ онъ по-

буждать испражненіе низомъ не ранѣе какъ черезъ сутки и отнюдь не производить водянистыхъ испражненій, но только отвращать накопленіе густаго и жесткаго кала въ проходной кишкѣ. Вотъ главная отъ него польза страждущимъ отъ упорныхъ запоровъ, отъ разстроеннаго пищеваренія, отъ расположенія къ кислотамъ и вѣтрамъ, къ желтяницѣ и меланхоліи. Но онъ полезенъ только тогда, когда употребляется съ умѣренностію; въ противномъ случаѣ причиняетъ онъ чрезмѣрный приливъ крови къ гемороидальнымъ сосудамъ и къ дѣтороднымъ частямъ, вмѣсто густаго кала гонитъ изъ кишекъ съ большимъ насиліемъ, рѣзью и жиленьемъ нужную слизь и водяность, оставляя въ нихъ великую сухость и жаръ. Всѣ лѣкарственные составы, содержащіе въ себѣ *сабуръ*, вредны какъ для людей слишкомъ раздражительныхъ, такъ и при почечуйныхъ воспаленныхъ шишкахъ, почечуйныхъ кровоистеченіяхъ и при мѣсячномъ у женщинъ очищеніи.

3) *Очищенная сѣра* (Sulphur sublimat), см. *сѣрные порошки* § 50.

4) Пилюли побуждающія колоцинтовыя.

Возьми: *экстракта колоцинтнаго* (Extr. colocynthid.) двѣ драхмы,
экстракта тысячелистника (Extr. millefolii),

Аравійской камеди (Gummi Acaciae verae), каждаго по одной драхмѣ,
масла ромашковаго (Oleum chamomillae) 30 капель,
сиропа шафраннаго (Syrup. croci) сколько потребно, смѣшай

и сдѣлай пилюли, каждую въ два грана вѣсомъ. *Пріемъ:* отъ четырехъ до шести пилюль на ночь.

5) Возьми: *экстракта колоцинтнаго сложнаго* (Extr. colocynth. comp.) одну драхму,
экстракта черной чемерицы (Extr. hellebor. nigri) одинъ скрупулъ,
Аравійской камеди сколько потребно, смѣшай,

сдѣлай пилюли, каждую въ два грана и обсыпь порошкомъ солотковаго корня. *Пріемъ*: поутру и ввечеру отъ одной до двухъ пилюль.

Примѣчаніе. Сіи пилюли нашелъ я весьма полезными для гемороидалистовъ, подверженныхъ ипохондріи и для страждущихъ отъ гемороидальной чревной тоски съ запоромъ на низъ.

Колоцинты употреблять слѣдуетъ вмѣстѣ съ клейковатыми средствами. Сіе побуждающее чревныя внутренности средство въ особенности полезно въ почечуѣ съ частнымъ параличемъ и съ накопленіемъ въ тѣлѣ водянистыхъ мокротъ, въ меланхоліи и сѣумасшествіи.

6) Пилюли изъ чемерицы черной.

Возьми: *экстракта чемерицы черной* (Extr. helleboris nigri) три драхмы,
экстракта кудряваго волчца (Extr. cardui Benedicti) одну драхму,
экстракта шафраннаго одну драхму, смѣшай и сдѣлай пилюли въ два грана каждую.
Пріемъ: отъ 6 до 8 пилюль на пріемъ, смотря по дѣйствію и надобности.

7) Капли изъ чемерицы сложныя побуждающія.

Возьми: *капель чемерицы черной* (Tinctur. helleboris nigri) двѣ драхмы,
капель красавицы (Tincturae belladonnae) полдрахмы,
воды лавро-вишневой (aqua lavrocerasi) одну унцію, смѣшай.
Пріемъ: отъ сорока до шестидесяти капель раза два въ день, въ чашкѣ чаю изъ ромашки либо тысячелистнику.

Чемерица черная побуждаетъ толстыя кишки и брюшные кровоносные и пасочные сосуды, особливо вратожильной системы, отвращаетъ неравномѣрное затрудненное обращеніе крови и накопленіе слизистыхъ и водянистыхъ мокротъ; и потому она полезна не только гемороидалистамъ, но и подверженнымъ тихой меланхоліи, ипохондріи, помѣшательству въ умѣ и отъ водяной болѣзни. Употребленіе сего сред-

ства требуетъ однакожъ осторожности; для людей же съ чрезмѣрно раздражительнымъ тѣломъ, съ большими чревными завалами и при лихорадочныхъ движеніяхъ вовсе предписывать сего средства не слѣдуетъ.

8) *Среднія соли*, какъ то: *винощелочная* (Tartras potassae) и *винокупоросная* (Sulphas potassae) составляютъ также превосходное побуждающее средство; о употребленіи оныхъ смотри § 61.

9) *Перецъ* полезенъ для одержимыхъ закрытымъ почечуемъ съ большими мокротами, при трудномъ пищевареніи съ изгагою, слизями и вѣтрами въ кишкахъ; съ пользою также дается онъ въ упорномъ запорѣ, происходящемъ отъ недостаточной чувствительности (Torpor) слизистой плевы нижняго конца кишекъ. *Черной перецъ* глотаютъ по утрамъ отъ 4 до 8 зеренъ заразъ, а иногда столько же на ночь. *Бѣлой перецъ* менѣе горячитъ, и потому можно глотать его отъ 8 до 12 зеренъ. Отъ излишняго употребленія *перца* происходитъ большое раздраженіе въ кишкахъ, сильной приливъ крови къ онымъ и къ мочевому пузырю, жиленье и колика.

10) *Имбирь* (Ammomum Zingiber) принадлежитъ также къ пріятнымъ побуждаюшимъ средствамъ и примѣтнымъ образомъ поправляетъ *тонъ* въ кишкахъ, т. е., возбуждаетъ

дѣятельность и раздражительность мышечныхъ волоконъ и мокротныхъ плевъ грудной и брюшной полостей и мочевыхъ путей. Онъ весьма полезенъ при накопленіи въ брюхѣ слизи и вѣтровъ и при мокротахъ въ груди. Умножая нѣсколько червообразное движеніе кишекъ и возбуждая толстыя изъ нихъ къ дѣятельности, споспѣшествуетъ къ отвращенію геморoидальныхъ запоровъ низомъ. *Имбирь* можно принимать въ порошкѣ съ сѣрными цвѣтами отъ 6 до 10 гранъ раза два или три въ день; лучше однакожъ употреблять оный вмѣсто чаю или вмѣсто водянистой настойки, подслащенной сахаромъ. Всего пріятнѣе пить его въ видѣ *имбирнаго меду* и *имбирнаго пива*. Сей послѣдній напитокъ съ пользою для здоровья замѣняетъ иногда портеръ и вино; помощію его избавился я совершенно отъ продолжительнаго щекочущаго кашля, который временно, а наиболѣе ночью, сильно меня безпокоилъ. Впрочемъ *имбирь*, также какъ и *перецъ*, должно употреблять съ умѣренностію, т. е., не разгорячать онымъ брюшныхъ органовъ.

11) Шафранныя побуждающія капли.

Возьми: *шафранныхъ капель* (Tinctura croci), *капель сабурныхъ* (Tinctura aloes), каждаго по двѣ драхмы, смѣшай.

Пріемъ: отъ 20 до 40 капель два раза въ день въ чайной чашкѣ мятнаго чаю.

Шафранъ (Crocus) возбуждаетъ жизненную дѣятельность сосудистыхъ нервовъ кишечнаго канала и матки; побуждаетъ мѣсячное очищеніе у женщинъ; полезенъ геморoидалистамъ тѣлосложенія слабаго и вмѣстѣ слишкомъ раздражительнаго, расположеннымъ къ ипохондріи, истерикѣ, подверженнымъ частой коликѣ и вѣтрамъ. *Шафранъ* слѣдовало бы часто употреблять вмѣсто *олія* тѣмъ изъ геморoидалистовъ, у коихъ *олій*, уменьшая кишечныя отдѣленія, причиняетъ запоръ, и потому бываетъ вреденъ.

12) Порошки изъ буры побуждающіе.

Возьми: *бурокислой соды* (Subboras sodae, borax),
сѣрныхъ цвѣтовъ, каждаго по десяти гранъ,
шафрана три грана,
сахару одинъ скрупулъ, смѣшай

и сотри въ порошокъ. *Пріемъ:* четыре раза въ день по порошку.

Бура (Subboras sodae) давно уже извѣстна, какъ полезное средство для возбужденія дѣятельности кровоносныхъ сосудовъ и сосудистыхъ нервовъ, для уничтоженія накопленій и кровяныхъ застоевъ; въ особенности дѣйствуетъ она на матку и на мочевые пути; также весьма полезна снаружи отъ почечуйныхъ опухолей.

13) Декоктъ изъ козачьяго можжевельника.

Возьми: листьевъ *козачьяго можжевельника* полторы унціи,
воды двѣ бутылки,
вари въ горшкѣ, замазанномъ тѣстомъ, въ вольномъ жару, пока укипитъ до половины, потомъ процѣди.

Пріемъ: по небольшой чайной чашкѣ съ сахаромъ поутру и ввечеру.

Электуаръ изъ козачьяго можжевельника.

Возьми: листьевъ *козачьяго можжевельника*,
сахару, каждаго по полторы драхмы,
сотри вмѣстѣ въ видѣ консервы, потомъ прибавь густаго померанцоваго или шафраннаго *сиропа* одну унцію, смѣшай. *Пріемъ:* по двѣ чайныя ложки черезъ каждые два часа.

Козачій можжевельникъ (Juniperus sabina) принадлежитъ къ сильно побуждающимъ средствамъ; особливо раздражаетъ онъ сильно нервы кровоносныхъ жилъ и слизистую плеву кишекъ; равнымъ образомъ специфически дѣйствуетъ на матку и на мочевые пути. Онъ весьма одобряется для одержимыхъ закрытымъ почечуемъ, кои страждутъ вмѣстѣ и отъ застарѣлой ломоты съ опухолью и наростами въ членосоединеніяхъ костей и въ сокращеніи оныхъ; полезенъ также для женщинъ, имѣющихъ закрытый почечуй

съ прекращеніемъ мѣсячнаго очищенія и при большомъ накопленіи мокротъ въ маткѣ и опуханіи оной отъ слабости и нечувствительности ея волоконъ и сосудовъ — что случается большею частію у женщинъ, много разъ рождавшихъ.

Масло козачьяго можжевельника дается отъ одной до четырехъ капель на пріемъ въ сахарномъ сиропѣ или съ другими, болѣзненному состоянію приличными, средствами. Впрочемъ при употребленіи козачьяго можжевельника внутрь требуется большая осторожность, ибо большіе пріемы онаго приводятъ кровь въ сильное волненіе и причиняютъ кровотеченія и воспаленія въ кишкахъ, оканчивающіяся всегда антоновымъ огнемъ.

§ 60.

Минеральныя цѣлительныя, особливо кисловатыя *воды*, коихъ главнѣйшая дѣйствительность зависитъ отъ гаса угольной кислоты, принадлежатъ также къ наилучшимъ побуждающимъ средствамъ. Сюда въ особенности относятся: воды *Кавказскія кислыя*, *Андреяпольскія*, *Липецкія*, *Билинская*, *Селтерская*, *Фашингерская*, *Эгерская*, *Шарлоттенбрунская*, *Пирмонтская* (кислая), *Дрибургская*, *Швальбахская*, *Эмская* и проч.

Доброта сихъ водъ узнается изъ слѣдующихъ отличительныхъ ихъ свойствъ: при взболтаніи онѣ пѣнятся и жемчужатся, имѣютъ

крѣпкой, летучій, въ носъ кидающійся запахъ, пріятный, кисловатый и освѣжающій вкусъ, и распространяютъ по всему тѣлу нѣкоторое пріятное ободряющее чувство; онѣ должны производить легкое испражненіе низомъ и гнать мочу, но не горячить и не волновать кровь и не причинять сильныхъ кровотеченій.

Воды сіи употребляются либо сами по себѣ, стакана по два въ $\frac{1}{2}$ или въ 1 фунтъ въ сутки, либо въ смѣшеніи съ виномъ, на пр: Бургонскимъ для подкрѣпленія слабаго желудка, или съ кислотою виннаго камня, либо съ лимоннымъ сокомъ и съ сахаромъ. Примѣсь сія не безполезна и служитъ для лучшаго отдѣленія гаса угольной кислоты. Когда же нужно, чтобы вода болѣе слабила, то можно на каждый стаканъ прибавлять двѣ чайныя ложки *винощелочной соли* (Tartras potassae) или *кремортартару* съ сахаромъ и пить во время самаго шипѣнія.

Дѣйствіе сихъ минеральныхъ водъ есть слѣдующее: онѣ исправляютъ разслабленное пищевареніе, возвышаютъ жизненную силу кровоносныхъ сосудовъ, усиливая обращеніе крови, вспомоществуютъ очевидно разрѣшенію застоевъ кровяныхъ и мокротныхъ, возбуждаютъ *тонъ* въ кишкахъ, отвращаютъ накопленіе слизи, мокротъ и гнилыхъ вредныхъ гасовъ въ кишечномъ каналѣ, отвращаютъ изгагу, рвоту и колику отъ судорогъ, равно и запоръ на низъ.

Извѣстно, что люди, страдавшіе отъ закрытаго почечуя и отъ другихъ разныхъ важныхъ поврежденій въ брюшныхъ органахъ, благоразумнымъ употребленіемъ однѣхъ сихъ водъ при діетѣ и тѣлодвиженіи исцѣлялись въ короткое время тогда, какъ всѣ другія средства не помогали. О минеральныхъ водахъ для разрѣшенія чревныхъ заваловъ и вообще о правильномъ употребленіи сего средства говорено будетъ особо въ § 63.

Въ замѣнъ минеральныхъ водъ въ закрытомъ почечуѣ съ пользою употреблены быть могутъ: углекислая вода (Aqua acidi carbonici) и другія, гасъ угольной кислоты отдѣляющія вещества: (Potio riveri, mixtura Hulmiana, pulvis aerophorus voglerii, mixtura ammonia-citrica etc.).

О лѣченіи геморроидальной болѣзни, соединенной съ чревными завалами.

§ 61.

Завалы или *обструкціи* въ брюшныхъ органахъ (см. § 22), содѣйствуя къ произрожденію почечуя, сильно ожесточаютъ припадки онаго и крайне затрудняютъ его излѣченіе. Безъ истребленія заваловъ и причины оныхъ не льзя иногда и думать объ основательномъ излѣченіи почечуя.

По таковой тѣсной связи почечуя съ чревными завалами и по уваженію, что они сами

по себѣ уже составляютъ одну изъ главнѣйшихъ причинъ многоразличныхъ хроническихъ болѣзней, нынѣ столь обыкновенныхъ, считаю я нужнымъ предложить подробнѣе о распознаваніи сего недуга и о способѣ излѣченія онаго.

Доселѣ не имѣемъ мы еще вѣрныхъ признаковъ для точнаго познанія заваловъ, кроющихся въ брюшныхъ органахъ, и какъ событія сіе подтверждаютъ, то и самые извѣстнѣйшіе практики весьма часто ошибаются въ распознаваніи сего недуга, а особливо въ правильномъ назначеніи страждущаго органа. Вотъ преимущественные *признаки*, по коимъ заключить можно о присутствіи чревныхъ заваловъ: припадки разстроеннаго пищеваренія и кровотворенія, отступленія отъ естественнаго состоянія натуральныхъ отдѣленій и испражненій, болѣзненно-возвышенная венозная система, сильное біеніе жилъ, въ брюшной полости ощущаемое, слизи и нечистоты, часто въ кишечномъ каналѣ накопляющіяся, малый позывъ на пищу, изгага, тошнота, частое выплевываніе клейкихъ мокротъ, неправильныя испражненія низомъ, почечуй, бѣли и неправильное мѣсячное очищеніе у женщинъ, ворчаніе и нѣкоторое непріятное болѣзненное ощущеніе въ брюхѣ или чревная тоска, вспылчивый и брюзгливый характеръ и другіе ипохондрикамъ свойственные припадки; постоянная боль, сопровождаемая судорогами, въ которой либо части брюха, хро-

ническая сыпь на лицѣ (мѣдный или фіялковый носъ Gutta rosacea) или на другихъ частяхъ тѣла, опухоль и отвердѣлость внѣ брюха, въ страждущемъ органѣ ощущаемая, лице блѣдное, желтоватое, тучность или одутловатость тѣла, водяная болѣзнь или сухость и изнуреніе тѣла.

При лѣченіи чревныхъ заваловъ Врачь долженъ имѣть въ виду: 1) произведеніе ежедневнаго свободнаго и легкаго испражненія низомъ; 2) постепенное возбужденіе или укрѣпленіе желудка и всего кишечнаго канала безъ запора на низъ; 3) приличное возбужденіе вратожильной системы, конечностей боевыхъ и пасочныхъ сосудовъ и желѣзъ брыжейки и другихъ брюшныхъ органовъ, пришедшихъ въ состояніе нечувствительности и засоренія; 4) отвращеніе чрезъ усиленное отдѣленіе и испражненіе чрезмѣрнаго накопленія клейкой слизи, жиру, водянистыхъ мокротъ, испорченной желчи и вѣтровъ. Всегда однакожъ надлежитъ соблюдать ту осторожность, чтобы не раздражать чрезмѣру брюшныхъ органовъ, не приводить въ волненіе крови, не умножить полносочія въ брюхѣ и не разстроить органовъ пищеваренія.

Средства противу сей болѣзни многочисленны. Я упомяну только о главнѣйшихъ. Впрочемъ приличная діета и тѣлодвиженіе составляютъ здѣсь необходимое условіе.

1) *Холодная,* чистая, ключевая или рѣчная *вода,* ежедневно на тощій желудокъ по утру и послѣ обѣда по одному стакану употребляемая, есть превосходное средство для людей, расположенныхъ къ чревнымъ заваламъ. Она разводитъ и утончаетъ какъ желудочные и кишечные соки, такъ и принятую пищу; разводитъ слишкомъ густой питательный сокъ (chylus) и желчь; вспомоществуетъ отдѣленіямъ и свободнѣйшему испражненію изъ тѣла вредныхъ, горючихъ и соляныхъ частей, какъ чрезъ испарину, кожею и легкими, такъ и мочею и низомъ; она придаетъ разслабленному желудку и всему кишечному каналу *тонъ* и отвращаетъ запоръ низомъ и накопленіе вѣтровъ.

Примѣчаніе. Чистая холодная вода, какъ и всякая другая невинная вещь, будучи во зло употреблена, при всей своей неоспоримой цѣлебности можетъ быть вредна и даже убійственна. Какъ лошадь или корова, въ разгоряченіи напоенныя холодною водою, немедленно издыхаютъ или подвергаются неизлѣчимымъ болѣзнямъ, — такъ и люди, вспотѣвшіе и разгорячившіеся отъ сильнаго тѣлодвиженія и напившіеся въ сіе время холодной воды или другаго какого холоднаго напитка, тотчасъ получали жабу, воспаленіе въ груди и въ желудкѣ, либо скоропостижно умирали или страдали чахоткою. Разгоряченныя и вспотѣвшія части горла и желудка, вдругъ холодомъ объятыя, воспаля-

ются и поражаются параличемъ. Для отвращенія таковыхъ опасныхъ послѣдствій не должно холодной воды пить: 1) тотчасъ послѣ сна, не прохладивъ себя прежде полчаса времени; 2) вскорѣ послѣ горячей пищи; 3) тотчасъ послѣ танцованья или послѣ большой ходьбы пѣшкомъ и другаго сильнаго тѣлодвиженія (*); 4) по выходѣ изъ ванны или изъ бани, равнымъ образомъ и изъ жарконатопленной комнаты; 5) во всякое другое время, выпивъ стаканъ чистой ключевой или рѣчной холодной воды, должно не медля пройтиться или сдѣлать другой какой либо моціонъ. Есть конечно примѣры, что питіе холодной воды тотчасъ по разгоряченіи тѣла не сопровождалось какими либо важными слѣдствіями, когда только тотчасъ послѣ питія воды человѣкъ дѣлалъ моціонъ, на примѣръ: пускался опять въ походъ, начиналъ танцовать или ходить пѣшкомъ и т. п.; но при всемъ томъ надлежитъ здѣсь быть крайне осторожнымъ.

2) *Горькіе мыльные разрѣшающіе экстракты,* напр: *экстрактъ* изъ травы и корня *львинаго зуба,* экстр. *мыльной травы,* экстр. *корня пырейнаго* (Extractum radic. graminis), экстр. *чистотѣла большаго* (Extr. chelidonii ma-

(*) Въ арміи, во время похода, благоразумные Начальники остерегаютъ своихъ солдатъ отъ питья холодной воды; даже и на привалѣ не прежде позволяютъ пить, какъ давъ имъ прежде съ полчаса времени или болѣе отдохнуть и прохладиться.

joris), экстр. кудряваго волчца (Extr. cent. Bened.) и *дымянки* (Extr. fumariae). Экстракты сіи употребляются въ видѣ пилюль либо въ микстурѣ, растворенные съ ароматическою водою, на пр: *мятною*, *тысячелистника*, *померанцовою*, *меллиссною*, *коричневою* и т. п.

3) *Соль винощелочная* (Tartras potassae), *соль винокупоросная* (Sulphas potassae или tartarus vitriolatus) и *сѣрнокислая сода* (Sulphas sodae или Sal mirabile glauberi) суть превосходныя средства отъ разслабленія мышечныхъ волоконъ желудка и кишекъ, отъ накопленія слизи и нечистотъ и при запорѣ на низъ. Сіи соли даются съ пользою въ смѣси съ киселемъ изъ *можжевеловыхъ ягодъ* или *бузины* (Roob. bac. juniperi vel roob sambuci) и съ горькими мыльными экстрактами.

4) *Желчь бычачья* есть превосходное средство для гемороидалистовъ, страждущихъ отъ чревныхъ заваловъ, отъ кислотъ, слизей и вѣтровъ въ кишечномъ каналѣ. *Желчь* слабитъ на низъ и непрестанно побуждаетъ движеніе кишекъ; по сей причинѣ великій *Сиденгамъ* почиталъ оную для человѣка ежедневнымъ клистиромъ. *Бычачья желчь* употребляется снаружи въ видѣ мази или пластыря, прикладываемаго на весь животъ, либо въ клистирѣ. Внутрь берется она либо свѣжая на пріемъ по дессертной или столовой ложкѣ въ растворѣ съ ароматическою водою, либо свѣжесгущенной (Bilis taurina recenter

spissata) одинъ скрупулъ или и болѣе на пріемъ, въ видѣ пилюль, нѣсколько разъ въ день.

5) *Нашатырь очищенный* почитается лучшею изъ солей, растворяющихъ сгущенные соки и разрѣшающихъ отвердѣнія въ желѣзахъ брыжейки. *Нашатырь* возбуждаетъ разслабленныя конечности боевыхъ жилъ, полезенъ въ чрезмѣрномъ накопленіи слизи и вѣтровъ при слабомъ пищевареніи и при пученьѣ брюха. Дается по пяти и десяти гранъ на пріемъ съ мыльными горькими экстрактами или съ сгущеннымъ сокомъ сабура.

6) *Очищенная сѣра*, см. § 50.

7) *Солекислая услащенная ртуть* (Submurias hydrargyri, calomelanos) въ малыхъ пріемахъ, на примѣръ: поутру и на ночь по полуграну и наконецъ отъ одного до двухъ гранъ, употребляема будучи съ должною осторожностію, дѣйствуетъ съ великою пользою на пасочные сосуды, на желѣза и на брюшныя вены; она, отвращая венозныя воспаленія, препятствуетъ онымъ переходить въ нагноеніе. Средство сіе есть одно изъ наиполезнѣйшихъ противу заваловъ въ брыжейкѣ, въ печени и селезенкѣ и противу зависящихъ отъ сего хроническихъ сыпей и лишаевъ, особливо когда подозрѣвается венерическая зараза или золотуха и проч. Оно полезно также и для послабленія низомъ въ геморoидальныхъ запорахъ, особенно когда имѣется приномъ въ виду отвращеніе венознаго пол-

покровія въ брюшныхъ органахъ и воротной системѣ. Въ семъ послѣднемъ случаѣ дается на пріемъ отъ 4 до 6 гранъ въ видѣ пилюль или порошкѣ съ примѣсью другихъ средствъ, приличныхъ сложностямъ болѣзни.

8) *Камедисто-смоляныя разрѣшающія средства*, какъ то: *вонючая камедь* (asa foetida), *очищенный аммоніакъ, галбанъ, бальсамъ листвяницы, баккаутная камедь*. Онѣ съ пользою даются въ видѣ капель или пилюль съ горькими экстрактами, съ *винощелочною солью* и сгущеннымъ сокомъ *сабура*.

9) *Уксусокислый поташъ* (Acetas potassae liquidus или liquor terrae foliatae tartari) есть самое легкое и превосходное средство изъ растворяющихъ среднихъ солей при разслабленіи (torpor) и отвердѣніи желѣзъ брыжейки и другихъ брюшныхъ органовъ, въ закрытомъ почечуѣ съ затруднительнымъ испражненіемъ мочи и наклонностію къ водяной болѣзни. Дается въ микстурахъ отъ одной до двухъ драхмъ съ горькими экстрактами, ароматною водою и Гофмановыми каплями.

10) *Наркотическія ядовитыя разрѣшающія средства*, какъ то: *болиголовъ* (conium maculatum), *лютикъ* или *прострѣльная трава* (aconitum napellus), *сонная одурь* (A. Belladonna), *наперстная трава* (Digitalis purpurea), *лавровишневая вода* (Aqua Lauro-cerasi) и проч. съ пользою употребляются въ закрытомъ почечуѣ и

въ завалахъ: для побужденія вратожильной системы и всасывающихъ сосудовъ, для исправленія измѣненной дѣятельности чревныхъ нервовъ, для разрѣшенія заваловъ и затвердѣній въ желудкѣ, въ брыжеечныхъ желѣзахъ и въ другихъ брюшныхъ органахъ. Сіи весьма дѣйствительныя средства даются попеременно, и всегда съ осторожностію, недолгое время. Они полезны въ смѣшеніи съ прочими вышеупомянутыми разрѣшающими средствами, особливо съ *солекислою услащенною ртутью.*

11) *Сюрмяные препараты,* на пр: *сюрмяное мыло* (Lapo stibiatus), *окись сѣрно-сюрмяная златоцвѣтная* (Suboxydum stibii hydrosulphuratum или Sulphur aurat antimonii), *соль рвотная виносюрмяная* (Tartras stibii et potassae), *фосфорносюрьмяная известь* (Subphosphas calcariae stibiatus) и т. п. Всѣ сіи средства съ особеннымъ успѣхомъ можно употреблять въ закрытомъ почечуѣ съ чревными завалами, смѣшивая съ мыломъ (Sapo oleosus, venetus), *съ солекислою услащенною ртутью, со жженою морскою губкою* и съ прочими вышеупомянутыми разрѣшающими средствами.

12) Вещества, *газъ угольной кислоты* отдѣляющія и онымъ изобилующія, какъ то: *щелочныя соли* съ кислотами, *углекислая вода* и въ особенности *минеральныя цѣлительныя воды* служатъ превосходнѣйшимъ средствомъ

для разрѣшенія заваловъ въ брюшныхъ органахъ при закрытомъ почечуѣ.

§ 62.

Углекислая вода (aqua acidi carbonici, aqua aeris fixi) одобряется особенно для разрѣшенія заваловъ. Будучи внутрь употребляема, она усиливаетъ жизненную дѣятельность боевыхъ жилъ, прекращаетъ болѣзненно возвышенную раздражительность кишечнаго канала — и потому считается полезною отъ рвоты, судорогъ и колики въ животѣ, также отъ чрезмѣрнаго накопленія слизи; усиливая кругообращеніе крови, она вспомоществуетъ разрѣшенію кровяныхъ и мокротныхъ застоевъ; возбуждая тонъ въ кишкахъ, поправляетъ разстроенное пищевареніе, и ослабляя дѣйствіе печени, полезна въ многожелчіи и желтяницѣ.

Углекислая вода специфически дѣйствуетъ на мочевые пути, на матку и на яичники; почему и можетъ употребляема быть съ великою пользою въ разслабленіи, застояхъ, завалахъ, опухоляхъ и даже въ самыхъ скиррозныхъ затвердѣніяхъ, въ сихъ частяхъ случающихся.

Примѣчаніе. Въ 1811 году въ Ревелѣ имѣлъ я случай единственно *углекислою водою* излѣчить совершенно и въ самое короткое время важную скиррозную опухоль (закрытый ракъ) на лѣвой сторонѣ брюха, вскорѣ послѣ трудныхъ родовъ и жестокой простуды у одной дамы оказавшуюся. Сей *скирръ*, въ большую ла-

донь величиною, распространился и на поверхности живота, былъ холоденъ и твердъ какъ камень и пресѣкаемъ темнокрасными полосами. Тихая нервная лихорадка съ чрезвычайнымъ изнеможеніемъ силъ сопровождала сію затвердѣлость, больная не могла разогнуться прямо и въ лѣвомъ боку чувствовала сильную колючую боль. Я не рѣшился приложить къ готовому уже вскрыться раку никакой припарки, ниже мази; да и какую пользу могутъ принесть всѣ извѣстныя доселѣ средства въ сей слишкомъ опасной болѣзни, однимъ только ножемъ, да и то весьма рѣдко, уничтожаемой? Но больная, сверхъ всякаго чаянія, спасена. Я давалъ ей внутрь *углекислой воды*, ежедневно свѣжеприготовленной, по одной чайной чашкѣ четыре раза въ день; сверхъ того, для подкрѣпленія силъ, принимала она четыре же раза въ день по рюмкѣ слѣдующую микстуру:

Возьми: *Виттовыхъ крѣпительныхъ капель* (Tinct. cinchonae Roberti Whyttii) двѣ унціи,
воды перегнанной коричневой и *мятной*, каждой по двѣ унціи,
нафты купоросной (Aether sulphuricus) двѣ драхмы,
сиропа померанцоваго одну унцію,
смѣшай.

Скиррозная затвердѣлость покрываема была снаружи свѣжимъ сливочнымъ масломъ, гу-

сто на тряпку намазаннымъ. Тряпка каждый почти часъ крѣпко засыхала и потому намазываніе ее масломъ возобновляемо было чаще, смотря по надобности. При семъ лѣченіи больная одинъ разъ посажена была въ весьма теплую ванну, приготовленную съ ароматическими травами. Лѣченіе *углекислою водою* продолжалось только девять дней. Больная совершенно выздоровѣла, и понынѣ находится въ совершенномъ здравіи. Таково дѣйствіе углекислой воды! — Не льзя поистинѣ не сожалѣть, что сіе средство, не смотря на чрезвычайную отъ него пользу въ господствующихъ особенно нынѣ болѣзняхъ, столь мало употребляется.

§ 63.

Минеральныя воды для разрѣшенія чревныхъ заваловъ предлагаются:

Соляныя холодныя: *Зельцерская*, *Пирмонтская* соляная, горячая *Висбаденская*. Щелочныя: горячая *Карлсбадская*, холодная *Фахингская* (*).

(*) *Гуфеландъ* въ особенности одобряетъ сію воду. Вотъ что онъ говоритъ: она есть весьма пріятная, полезная, сильная минеральная вода; она разрѣшаетъ, не разслабляя и укрѣпляетъ, не сжимая и не производя запоровъ. Сіе средство весьма важно для гипохондриковъ, страждущихъ завалами брюшныхъ внутренностей, неваренiемъ пищи и кислотою въ желудкѣ. При затвердѣніяхъ брюшныхъ внутренностей, смежныхъ съ желудкомъ и сопровождаемыхъ чрезвычайною чувствительностію, для коихъ и самая

Сѣрныя: горячая *Кавказская, Ахенская.* Желѣзныя: *Эгерская* или *Францова* колодезъ, *Швалбахская* (*) и *Дрибургская.*

Соляныя и щелочныя углекислыя минеральныя воды, сверхъ другихъ полезныхъ дѣйствій, въ особенности также очищаютъ желудокъ, кишки и мочевые пути отъ слизи и другихъ нечистотъ. Сѣрныя особливо дѣйствуютъ на кровоносную систему брюха, на пасочные сосуды и желѣзы и на кожу. Съ особенною пользою употребляются онѣ гемороидалистами съ застарѣлыми послѣдствіями венерической болѣзни, гдѣ ртутныя средства не помогаютъ или гдѣ онѣ были уже слишкомъ много употреблены; также и въ послѣдствіяхъ отъ чесотки и подагры, исключая цынги, расположенія къ чахоткѣ и къ апоплексіи, гдѣ сѣрныя воды бываютъ вредны. *Желѣзныя* воды въ особенности укрѣпляютъ волокна, возвышая жизненную ихъ силу; умножаютъ теплоту въ крови и красную бальзамическую часть оной. Онѣ очевидно дѣйствуютъ на истощенныя и разслабленныя системы кровоносныхъ и пасочныхъ сосудовъ и нервную; также весьма полезны истощеннымъ отъ излишняго любострастія и гнуснаго руко-

---

Зельцерская вода была тяжелою, Фахингская употреблялась съ великою пользою, и проч.

(*) Знаменитый *Фр. Гофманъ* совѣтовалъ употреблять воду сію людямъ, одержимымъ ипохондріею и меланхоліею.

блудія. Чѣмъ въ водахъ сихъ желѣзо состоитъ болѣе въ тѣснѣйшемъ соединеніи со *щелочью* и *солями*, тѣмъ приличнѣе онѣ въ чревныхъ завалахъ, имѣя притомъ крѣпительно разрѣшающее свойство.

Надлежитъ однакожъ замѣтить, что крѣпкія *желѣзныя воды* бываютъ вредны, или по крайней мѣрѣ съ особенною осторожностію должны употреблять оныя гемороидалисты тѣлосложенія крѣпкаго, полнокровные, съ упругими волокнами и у коихъ система боевыхъ жилъ чрезмѣрно раздражительна.

Всего лучше употреблять воды въ теплое время года и въ хорошую погоду, на тощій желудокъ, раза три въ день, на пр: поутру рано, за два часа передъ обѣдомъ и чрезъ три часа послѣ обѣда, сначала по малому стакану, а потомъ и по большому (въ одинъ фунтъ).

За обѣдомъ минеральной воды пить не должно, ибо она въ сіе время вредитъ пищеваренію и пучитъ брюхо. Посему не льзя одобрить тѣхъ людей, которые, желая угостить любимаго гостя, за самымъ обѣдомъ подносятъ пребольшій стаканъ минеральной воды — что гораздо полезнѣе было бы дѣлать, спустя часа два или три послѣ обѣда вмѣсто кофе. Сіе относится и до кисловатыхъ минеральныхъ водъ, о коихъ говорено въ § 60.

Извѣстно, что люди изнѣженные, разслабленные, привыкшіе вставать и обѣдать поздо, минеральной воды поутру рано и на тощакъ пить не могутъ; а потому таковымъ слѣдуетъ прежде употребленія воды немного позавтракать, на прим: выпить чашку больону или похлебки изъ пива съ молокомъ (Bier-Suppe), или чаю съ бѣлымъ хлѣбомъ. Послѣ каждаго стакана воды должно сдѣлать легкое тѣлодвиженіе.

Каждая минеральная вода должна по крайней мѣрѣ разъ въ сутки послабить, а потому при наклонности къ запорамъ нужно бываетъ употреблять на ночь приличное побуждающее на низъ средство, либо по утрамъ въ первой стаканъ минеральной воды примѣшивать двѣ чайныя ложки соли *винощелочной* (Tartras potassae) и продолжать сіе каждый день до тѣхъ поръ, пока кишечный каналъ придетъ въ свое дѣйствіе. Иногда для вспомоществованія пищеваренію нужно бываетъ при минеральной водѣ употребленіе желудочныхъ капель, какъ то: *Гофмановъ эликсиръ, Виттовы крѣпительныя капли* и т. п.

При употребленіи минеральныхъ водъ какъ сихъ, такъ и описанныхъ въ § 60, гдѣ и когда бы то ни было, строгое наблюденіе *діеты* необходимо. Должно беречься пищи и питья худаго качества и отнюдь не обременять излишне желудка. Вредны: копченое и соленое мясо и рыба, жиръ, кислое молоко, творогъ, сыръ,

фрукты, стручковые плоды, пироги на дрожжахъ, салатъ, ботвинья и т. п.; — полезна же всякая удобоваримая пища, на прим: Французской бульонъ, супъ изъ курицы или изъ телятины или говядины съ крупою, морковью или петрушкою или съ картофелемъ; жаркое изъ дичи, цыплятъ, телятины или изъ молодой говядины; яица въ смятку; уха изъ хорошей чешуйчатой рыбы съ вышеупомянутыми кореньями, щи изъ свѣжей зелени, на пр: изъ молодой крапивы, изъ листьевъ тысячелистника, медуницы аптечной (pulmonaria officinalis) и т. п. Пріятное развлеченіе, при совершенномъ спокойствіи духа, и тѣлодвиженіе на свѣжемъ открытомъ воздухѣ весьма благопріятствуютъ дѣйствію водъ.

Желающіе имѣть полное понятіе о цѣлительныхъ источникахъ, о составныхъ началахъ ихъ водъ и отъ какихъ именно болѣзней оныя полезны, могутъ читать на Россійскомъ языкѣ:

1) Знаменитаго Доктора *Гуфеланда* описаніе главныхъ цѣлительныхъ водъ въ Германіи, основанное на собственныхъ его опытахъ. Переводъ съ Нѣмецкаго Г. Профессора *Велланскаго*. С. Петербургъ, 1816.

2) О Кавказскихъ водахъ, соч. Доктора *Цеэ*. С. Петербургъ, 1817.

3) Описаніе Липецкихъ минеральныхъ водъ, соч: Г. Докторомъ *Пфеллеромъ*. М. 1804.

4) Описаніе вновь открытыхъ Андреяпольскихъ водъ, соч. Г. *Фридебургомъ*. С. П. Б. 1811.

5) Способъ составлять минеральныя цѣлительныя воды (съ 4 гравированными чертежами, изображающими 8 простѣйшихъ машинъ или приборовъ, служащихъ для составленія разнородныхъ минеральныхъ водъ, и съ подробнымъ описаніемъ способа насыщенія воды *углекислымъ гасомъ*), соч. Доктора И. *Кашинскаго*. С. П. Б. 1808. Сіе полезное сочиненіе заохочиваетъ насъ къ составленію искусственной минеральной воды по произволу у себя на дому. Извѣстно изъ опытовъ, что искусственныя минеральныя свѣжеприготовленныя воды гораздо дѣйствительнѣе многихъ, въ кувшинахъ къ намъ изъ-за границы привозимыхъ и отъ времени или отъ небреженія въ составныхъ своихъ началахъ большею частію уже измѣнившихся, въ особенности когда онѣ углекислымъ гасомъ недостаточествуютъ. Великая польза отъ искусственныхъ водъ и отъ *углекислой воды* состоитъ еще и въ томъ, что мы оными во всякое время года можемъ пользовать больныхъ, одержимыхъ закрытымъ почечуемъ, чревными завалами и многоразличными послѣдствіями оныхъ.

6) Способъ испытывать минеральныя воды, заключающій въ себѣ: 1) физическое испытаніе оныхъ, 2) химическое чрезъ противудѣйствующія средства, 3) испытаніе гасовъ и 4) химическое разложеніе водъ на составныя части, соч. почтеннымъ нашимъ Академикомъ *Севергинымъ*. С. П. Б. 1800.

7) Напослѣдокъ мы имѣемъ о составленіи и дѣйствіи искусственныхъ и натуральныхъ цѣлительныхъ водъ превосходное описаніе въ Военной *Фармаколеѣ*, вновь 1818 года на Латинскомъ языкѣ изданной Главнымъ по арміи Медицинскимъ Инспекторомъ Г. Лейбъ-Медикомъ Виллiе, мужемъ знаменитымъ, коему Врачебное въ Россіи просвѣщеніе обязано своими успѣхами, а Военно-Медицинская часть своимъ превосходствомъ.

§ 64.

Составы изъ вышепоказанныхъ средствъ, оказавшіеся полезными въ разрѣшеніи чревныхъ заваловъ.

1) *Пилюли разрѣшающія аммоніачныя.*

Возьми: *аммоніака* (Gummi-resinae heraclei Gummiferi),
азы вонючей (Asae foetidae), каждаго по драхмѣ,
экстракта сабурнаго (Extr. aloes) полдрахмы,
экстракта кудряваго волчца (Extr. card. bened.) полторы драхмы, смѣшай и прибавь нѣсколько капель *уксусу морскаго лука*, сдѣлай пилюли, каждую въ два грана и обсыпь порошкомъ *корицы* или *аниса*.

Пріемъ: поутру и на ночь отъ 6 до 8 пилюль, запивая всякой разъ стаканомъ отвара кореньевъ *мыльной травы* (Da. rad. saponariae).

Примѣчаніе. Пилюли сіи, равно какъ и тѣ, кои ниже предписаны будутъ, не должны производить сильнаго (водянистаго) слабленія низомъ.

2) *Растворъ сабура съ нашатыремъ и крѣпкою водкою.*

Возьми: *сгущеннаго сока сабура* (Gummires. aloes),
нашатырю, каждаго по три драхмы,
раствори въ четырехъ фунтахъ (штофъ) кипячей воды,
прибавь: *слабой селитряной кислоты* или такъ называемой *крѣпкой водки*, три драхмы.

Пріемъ: одна обыкновенная столовая рюмка за два часа передъ ужиномъ или послѣ ужина.

Сей лѣкарственный составъ по цѣлебности своей пріобрѣлъ себѣ въ публикѣ большую довѣренность; рецептъ онаго находится у весьма многихъ людей и въ разныхъ городахъ Россіи. Вотъ что говоритъ публика о семъ составѣ. Одинъ Англичанинъ излѣчилъ симъ средствомъ Рускаго Дворянина отъ чахотки; нѣкоторые излѣчены онымъ отъ хронической сыпи на тѣлѣ и отъ упорныхъ лихорадокъ съ чревными завалами; нѣкто чахнулъ шесть мѣсяцовъ послѣ ушиба позвонковъ и симъ только лѣкарствомъ былъ выпользованъ; нѣкто изъ Дворянъ вылѣчилъ онымъ болѣе 20 человѣкъ, одержи-

мыхъ жестокою горячкою, свирѣпствовавшею между крестьянами, и проч. Иные къ средству сему до того пристрастились, что почти отъ всѣхъ болѣзней его рекомендуютъ (обыкновенная погрѣшность невѣжества). Разсматривая отдѣльно всѣ части сего состава, я не нахожу въ немъ ничего, кромѣ полезнаго противъ многихъ болѣзней, въ нынѣшнія времена особенно свирѣпствующихъ, — и смѣшеніе всѣхъ трехъ веществъ вмѣстѣ, и именно: сгущеннаго сока *сабура* (Aloe), *нашатыря* и утонченной *селитряной кислоты* или такъ называемой *крѣпкой водки*, считаю я весьма приличнымъ и полезнымъ. Испытавъ его на себѣ и дававъ уже многимъ изъ моихъ паціентовъ, я полагаю, что средство сіе дѣйствительно помогаетъ: 1) въ закрытомъ почечуѣ, сопряженномъ съ упорнымъ запоромъ на низъ, съ ослизеніемъ и разслабленіемъ въ системѣ воротной жилы. Одна рюмка сего лѣкарства, вечеромъ принятая, производила на другое утро свободное и весьма обильное испражненіе густаго и засохшаго кала, слизи и вѣтровъ и тѣмъ освобождала многихъ отъ головной боли и отъ тягостной чревной тоски, и скучнаго и брюзгливаго дѣлала вдругъ здоровымъ и веселымъ. 2) Въ болѣзняхъ *репродуктивной* (вознаграждающей) системы съ испорченнымъ пищевареніемъ, съ разслабленіемъ чувствительности оболочки, слизь отдѣляющей, съ накопленіемъ вязкой, густой слизи и вѣтровъ

въ кишкахъ и съ раздутымъ брюхомъ. 3) Въ чахлости тѣла, зависящей отъ засоренія и опухлости брыжеечныхъ желѣзъ и печени и въ хроническомъ воспаленіи сей послѣдней. 4) Въ худосочіи (Cachexia), и именно: a) въ золотухѣ, b) въ цынгѣ, c) въ хроническихъ сыпяхъ; людямъ, имѣющимъ на тѣлѣ, особливо на лицѣ, застарѣлую сыпь и лишаи, средство сіе должно быть весьма полезно. d) Въ водяной и e) въ венерической; особенно помогаетъ оно тѣмъ, кои отъ венерической болѣзни чахнутъ и по сей причинѣ, а иногда и по причинѣ цынготной въ тѣлѣ остроты, не могутъ принимать ртутныхъ средствъ.

Строгой діеты при семъ лѣкарствѣ не требуется. Люди, охотно всякое лѣкарство принимающіе, употребляютъ сей растворъ сабура безъ всякой примѣси; другимъ же совѣтую принимать оный въ смѣшеніи съ водою, подслащенною сахаромъ и запивать клейкимъ какимъ либо питьемъ. Болѣе двухъ рюмокъ въ сутки, т. е., поутру и ввечеру принимать не должно. Какъ скоро лѣкарство сіе начнетъ сильно и водянисто слабить, какъ скоро испортитъ аппетитъ и самое пищевареніе, вмѣсто того чтобъ возбудить и исправить оное: то въ такомъ случаѣ принимать его вовсе не слѣдуетъ, равно и тогда, когда начнетъ производить рвоту и головную боль — ибо здѣсь лѣкарство сіе будетъ уже вредить.

3) *Эликсиръ разрѣшающій съ виноуксусною солью.*

Возьми: *виноуксусной соли* (Acetas potassae liquid. vel liquor terrae foliatae tartari),
эликсира желудочнаго Клейнова (Elixir Viscerale Klein), каждаго по одной унціи,
эфира сѣрноспиртнаго (Гофм. капли, Aether sulphuric. alcohol.) двѣ драхмы, смѣшай.

Пріемъ: черезъ два часа по полустоловой ложкѣ, въ чайной чашкѣ чаю изъ листьевъ *мяты, шалфею* или цвѣтовъ *ромашки.*

4) *Микстура разрѣшающая нашатырная.*

Возьми: *нашатырю* (Murias ammoniae) два скрупула,
экстракта чистотѣла большаго (Extr. chelidonii maj.) двѣ драхмы, раствори въ отварѣ корня *Аароновой брады* (Dec. Rad. Ari Macul.), либо въ отварѣ *можжевеловыхъ ягодъ*, либо *каперсоваго корня* (Capparis spinos) въ четырехъ унціяхъ, потомъ прибавь:
сиропу померанцовыхъ корокъ одну унцію, смѣшай.

Пріемъ: отъ четырехъ до пяти разъ въ день по двѣ столовыя ложки.

5) *Пилюли разрѣшающія колоцинтовыя.*

Возьми: *экстракта колоцинтнаго сложнаго* (Extr. colocynth. compos.) три драхмы,

аммоніаку (G. heraclei gummiferi),
камеди азы вонючей (asae foetidae),
солекислаго амміака желѣзистаго (Murias ammoniae ferrat.),
экстракта чистотѣла большаго (Extr. chelid. maj.), каждаго по драхмѣ,
соли рвотной виносюрмяной (Tartras stibii et potassae) четыре грана,
масла ромашковаго (Oleum chamomillae) тридцать капель, смѣшай и сдѣлавъ пилюли, каждую вѣсомъ въ два грана, обсыпь *плаунным*ъ порошкомъ.

Пріемъ: отъ четырехъ до шести пилюль на ночь.

6) *Капли галбано-желѣзныя.*

Возьми: *эссенціи галбанной* (Essentiae Galbani), *эссенціи мятной* (Essentia menthae piperit.), каждаго по полунціи,
желѣзныхъ капель Бестужевскихъ (Tinct. martis Bestushevi) двѣ драхмы, смѣшай.

Пріемъ: отъ 10 до 50 капель на сахарѣ въ рюмкѣ *коричневой воды* или въ чайной чашкѣ *отвара можжевеловыхъ ягодъ,* четыре раза въ день.

Мнѣ удалось симъ средствомъ излѣчить начало водяной болѣзни, зависѣвшей отъ чревныхъ заваловъ.

7) *Капли разрѣшающія изъ сонной одури.*

Возьми: *экстракта изъ листьевъ красавицы* (Succ. spissat. belladonnae), два грана,

воды лавровишневой (Aqua Laurocerasae) двѣ драхмы, смѣшай.

Пріемъ: отъ 40 до 50 капель три раза въ день.

Гуфеландъ съ пользою предписывалъ сіе средство въ завалахъ и даже въ самыхъ отвердѣніяхъ желудка. Оно употребляется съ мѣсяцъ времени и болѣе, съ надлежащею осторожностію.

8) *Пилюли разрѣшающія изъ болиголова.*

Возьми: *экстракта болиголова пестристаго* (Succus spissatus conii maculat.), *мыла бѣлаго* (Sapo oleos.), того и другаго по двѣ драхмы, смѣшай съ потребнымъ количествомъ *сиропа аммоніачнаго* и сдѣлай пилюли, каждую въ два грана вѣсомъ.

Пріемъ: отъ двухъ до пяти пилюль два раза въ день.

9) *Пилюли разрѣшающія меркуріальныя.*

Возьми: *смолы бакаутной* (Gummiresinae gvaiaci) двѣ драхмы, *мыла бѣлаго* (Sapo oleos.) одну драхму, *солекислой услащенной ртути* (Submurias hydrargyri) одинъ скрупулъ, *экстракта дымянки* (Extr. fumariae) полторы драхмы, смѣшай съ *сиропомъ аммоніачнымъ* либо *шафраннымъ*, сдѣлай пилюли, каждую въ два грана и обсыпь *магнезіею.*

Пріемъ: поутру и ввечеру по 6 пилюль, запивая отваромъ *корня кирказона* или *корки каперсоваго корня.*

10) *Пилюли разрѣшающія изъ бычачьей желчи.*

Возьми: *сгущенной желчи* (Bilis taurina spissat.) двѣ драхмы,
мыла бѣлаго (Sapo oleos.),
экстракта чистотѣла большаго (Extr. chelidonii maj.),
экстракта золототысячнаго (Extr. centaurii minoris), того и другаго по одной драхмѣ, смѣшай съ потребнымъ количествомъ *сиропа мятнаго* и сдѣлавъ пилюли, каждую въ два грана, обсыпь порошкомъ *солодковаго корня.*

Пріемъ: отъ четырехъ до осьми пилюль четыре раза въ день, запивая чайною чашкою отвара *мыльнаго корня.*

11) *Смѣсь поташная разрѣшающая.*

Возьми: *раствора углекислаго поташа* (Subcarbonas potassae liquid.) полунцію,
сиропу аммоніачнаго (Syrup. de Ammoniaci),
воды померанцовыхъ цвѣтовъ (Aquae flor. aurant.), того и другаго по унціи, смѣшай.

Пріемъ: четыре раза въ день по столовой ложкѣ.

Примѣчаніе. Очищенный поташъ и *сода* составляютъ превосходное средство для разрѣшенія заваловъ, особливо при кислотахъ и слизяхъ въ желудкѣ и кишкахъ.

12) *Капли разрѣшающія поташныя.*

Возьми: *настойки ѣдкопоташной* (Tinctura potassae fusae) (*) полунцію,
масла каяпутнаго (Olei cajaputi) либо *анисоваго* (Ol. anisi) одинъ скрупулъ, смѣшай.

Пріемъ: отъ двадцати до сорока капель въ чайной чашкѣ отвара корня *мыльной травы,* два раза въ день.

13) *Пилюли мыльно скипидарныя.*

Возьми: *мыла скипидарнаго* (Sapo pineo-oleos.) (**) одну драхму,
экстракта кудряваго волчца (Extr. centaur. benedicti) двѣ драхмы, смѣшай и сдѣлавъ пилюли, каждую въ два грана, обсыпь порошкомъ *анисоваго сѣмени.* Отъ шести до осьми пилюль на пріемъ.

14) *Капли разрѣшающія лавровишневыя.*

Возьми: *воды лавровишневой* (Aqua lauro-cerasi) одну унцію,
экстракта дикаго аврану (Extr. gratiolae) одну драхму, смѣшай.

(*) См. Военн. Фармакоп. Г. *Виллiе*, 1818.

(**) См. тамъ же.

Пріемъ: отъ 20 до 30 капель, два или три раза въ день. Докторъ *Винклеръ* весьма одобряетъ ихъ въ черножелчныхъ завалахъ брюшныхъ органовъ съ расположеніемъ къ упорнымъ запорамъ на низъ.

Наружное лѣченіе чревныхъ заваловъ.

§ 65.

Къ наружному лѣченію чревныхъ заваловъ принадлежатъ: 1) теплыя сѣрныя ванны искусственныя или, что еще лучше, натуральныя. *Сѣрныя ванны* въ особенности полезны для тѣхъ, у коихъ завалы и отвердѣнія внутренностей суть послѣдствія венерической, золотухи или скрывшейся какой либо сыпи. *Искусственныя ванны* въ семъ случаѣ приготовляются изъ ароматическихъ травъ съ пшеничными отрубями; сверхъ того на каждую ванну берется по двѣ или по три унціи *сѣрной печени* или *сюрьмосѣрной извести* (calx antimonii sulphurata). 2) Втираніе въ брюхо и прикладываніе къ оному на фланели или на тряпкѣ разрѣшающихъ мазей, на прим: изъ *мыла, бычачьей желчи, нашатырнаго спирта, камфоры, скипидарнаго масла, неаполитани, виносюрьмяной соли* и т. п. 3) Наставливаніе разрѣшающихъ клистировъ изъ отвара *бараньей травы, кудряваго волчца, мыльнаго корня*, или изъ отвара разрѣшающихъ травъ (Species resolven-

tes) (*) или клистиръ изъ *экстракта дымянки* (Extr. fumariae) и *чистотѣла большаго*, изъ вонючей камеди (asa foetida), *бычачьей желчи*, бѣлаго или Венеціанскаго *мыла*, изъ *терпентина* (Balsam. pineolaricinum) съ *очищеннымъ поташомъ или содою*, или изъ *известковой воды*. 4) Пластыри разрѣшающіе, какъ то: *омеговой* и *Галбанный* сложные (**), пластырь *Шифгаузенскій*, пластырь *меркуріальный* сложный и проч. Пластыри сіи должно носить на брюхѣ нѣсколько мѣсяцовъ при употребленіи внутреннихъ лѣкарствъ.

О лѣченіи почечуя внезапно скрывшагося.

§ 66.

При лѣченіи внезапно скрывшихся почечуйныхъ шишекъ и внезапнаго прекращенія пріобыкшаго къ теченію почечуя (Haemorrhoides supressae, obstructae) надлежитъ сообразоваться съ причинами и слѣдствіями зависящихъ отъ онаго поврежденій въ организмѣ и не выпускать изъ виду сказаннаго въ § 33 стат. 6.

Когда при внезапномъ прекращеніи гемороидальнаго истеченія крови у человѣка полнокровнаго раздражительность въ боевыхъ сосу-

(*) Превосходный для клистира рецептъ разрѣшающимъ спеціямъ имѣется въ Фармакопеѣ, соч. Г. *Вилліе* 1818. ч. 2, стр. 237.

(**) См. Военную Фармакопею.

дахъ и въ сердцѣ будетъ столь велика, что излишекъ крови отъ пріостановившагося гемороидальнаго истеченія произведетъ сильное волненіе, горячку, наклонность къ воспаленію и другія разныя послѣдствія: то въ такомъ случаѣ надлежитъ больному немедленно пустить кровь и поставить къ проходу піявицы и употреблять прохладительный методъ лѣченія (§ 44).

Когда причиною внезапнаго прекращенія почечуя и сопровождающихъ оное недуговъ есть сильная простуда: то стараться открыть немедлено испарину ставленіемъ ногъ въ теплую воду, сажаніемъ больнаго на теплые мягчительные пары и употребленіемъ легкихъ потовыхъ средствъ, показанныхъ въ § 45.

Судорожныя движенія и припадки, гемороидальную колику обнаруживающіе, отвращаются мягчительными клистирами, теплыми ароматическими ваннами и противусудорожными средствами.

Ежели чревные завалы и недѣятельность вратожильной системы будутъ причиною прекращенія почечуя, тогда употреблять средства, показанныя въ § 59. 61. (смот. о лѣченіи чревныхъ заваловъ и о средствахъ, побуждающихъ или гонящихъ почечуй).

Почечуй, внезапно прекратившійся отъ *ломоты*, лѣчится средствами, противу сей болѣзни предписанными, обращая въ особенности

вниманіе на кровоносную систему — въ ревматизмѣ на боевые, а въ подагрѣ (Arthritis) на крововозвратные сосуды.

Въ заключеніе нужно сказать, что лѣченіе внезапно скрывшагося почечуя возобновленіемъ теченія онаго есть почти всегда несовершенное; оно не должно препятствовать лѣченію главнѣйшихъ поврежденій въ организмѣ. Ежели почечуйное теченіе продолжалось долгое время и потомъ вдругъ прекратилось и больный при медленной лихорадкѣ (Febris lenta) началъ чахнуть, то непростительно въ такомъ случаѣ стараться открыть снова гемороидальное теченіе. Знаменитый *Рихтеръ* (Richter's specielle Therapie B. 11, pag. 768) говоритъ: „что больной чрезъ сіе возобновленное открытіе почечуя приводится еще въ большее разслабленіе; ибо прекращенный почечуй полагать уже здѣсь надобно слѣдствіемъ третьей причины, и въ особенности застоя соковъ въ брюхѣ или недостаточнаго кровотворенія.“ Въ семъ и подобныхъ случаяхъ надлежитъ, по мнѣнію моему, стараться возстановить ослабленныя гемороидалиста силы, поправить испорченное пищевареніе и недостаточное кровотвореніе и разрѣшить чревные завалы, буде оные суть причиной разстройства въ организмѣ.

Объ отвращеніи полнокровія и болѣзненно-возвышенной раздражительности кровоносныхъ сосудовъ.

§ 67.

Излишекъ крови, истинное многокровіе (Plethora ad massam), въ отношеніи къ лѣченію гемороидальной болѣзни, въ раздраженномъ и къ воспаленію наклонномъ состояніи кровоносныхъ сосудовъ и брюшныхъ внутренностей уменьшается посредствомъ кровопусканія, піявицъ и рожковъ (§ 44). Во всякомъ же другомъ случаѣ, особливо при мнимомъ многокровіи для гемороидалиста кровопусканіе не нужно и многокровіе отвращается: 1) уменьшеніемъ количества пищи; 2) вмѣсто крѣпкой, питательной мясной и горячащей пищи употреблять растительную, водянистую, прохлаждающую; 3) вмѣсто крѣпкихъ, сильно питательныхъ и горячащихъ напитковъ пить болѣе чистой холодной воды и различнаго квасу; 4) стараться отвращать всѣ причины, приводящія кровь въ волненіе, вспомоществующія къ стѣсненію сосудовъ брюшной полости и затрудняющія свободное въ нихъ обращеніе крови; 5) больный долженъ меньше спать; 6) дѣлать умѣренное тѣлодвиженіе; 7) находиться болѣе въ прохладномъ, нежели въ слишкомъ тепломъ воздухѣ; 8) мыться и купаться въ холодной водѣ и пещись о ежедневномъ испражненіи низомъ, не разстроивая при-

чемъ пищеваренія. Словомъ, каждому многокровному совѣтуется благоразумною воздержностію и прохлажденіемъ тѣла слѣдовать мудрому совѣту одного Китайскаго Врача, который, предостерегая отъ напрасныхъ кровопусканій, говорилъ, „что для предохраненія полнаго горшка съ похлебкою отъ перекипѣнія черезъ край гораздо лучше убавить изъ-подъ горшка огня, нежели дать перекипѣть черезъ край или убавлять изъ горшка самую похлебку.“

Въ раздраженномъ состояніи сосудовъ, сверхъ вышесказаннаго на счетъ воздержности отъ горячащей пищи и крѣпкихъ напитковъ, гемороидалистъ долженъ также избѣгать всего, что легко можетъ раздражить кровоносную систему и сердце, напирать слишкомъ кровь къ слабѣйшимъ частямъ и умножать въ оной излишнюю теплоту и кислотворъ. Равнымъ образомъ ему вредны чрезмѣрное тѣлодвиженіе, бѣганье и скачки. Здѣсь весьма приличны успокоивающія и противусудорожныя средства, каковы суть: *наперстная трава*, *белена*, *тысячелистникъ*, *балдріянъ*, *вонючая камедь* (asa-foetida), *померанцовые листья*, *льяная Сибирская трава* или *Сибирская подснѣжная роза* (Rhododendron chr.), *фосфорная кислота*, *кислыя Галлеровы* или *Минсихтовы капли*, *кислота виннаго камня* (acid. tartaric), *чилибуха* (Nux. vomica), *бобровая струя*, *сурьмяныя*, *цинковыя* и *бисмутовыя извести*,

растворЪ углекислаго поташа, масляноклейкія облекающія средства, тепловатыя ароматическія ванны поперемѣнно сЪ холодными. Впрочемъ вЪ раздраженномЪ состояніи сосудовЪ не должно употреблять тѣхЪ противусудорожныхЪ и успокоивающихЪ средствЪ, кои будутЪ горячить, какЪ то: *опіума, мускуса, камфоры* и т. п., особливо же крѣпкихЪ на спиртѣ настоенныхЪ капель.

КлиматЪ имѣетЪ большое вліяніе на раздраженное состояніе сосудовЪ. Высокія гористыя мѣста, особенно вЪ жаркомЪ климатѣ, усугубляютЪ оное еще болѣе, и потому каждый таковаго рода больный долженЪ для жительства избирать мѣста низменныя, атмосферу не слишкомЪ окислотворенную и нѣсколько влажную.

НадлежитЪ остерегаться отЪ напрасныхЪ, часто повторяемыхЪ кровопусканій, ибо оныя увеличиваютЪ болѣзненно-возвышенную раздражительность сосудовЪ (§ 29), которая причиняетЪ мнимое полнокровіе и мѣстныя стремленія и напоры крови (orgasmus, congestio). Хотя напрасныя кровопусканія при таковомЪ раздраженномЪ состояніи сосудовЪ и доставляютЪ иногда облегченіе отЪ разныхЪ неважныхЪ припадковЪ; но изЪ опытовЪ извѣстно, что таковые неосторожные люди, охотники до кровопусканія, большею частію вскорѣ становятся слабыми и чахлыми, либо слишкомЪ

тучнѣютъ и подвергаются сильной одышкѣ, разнымъ болѣзнямъ, отъ худосочія происходящимъ, ломотѣ, водяной и проч. Вредныя слѣдствія таковой привычки тѣмъ болѣе и скорѣе обнаруживаются, чѣмъ чаще повторяется кровопусканіе. При каждомъ изъ нихъ раздражительность сосудовъ отъ уменьшенія крови, какъ естественнаго ихъ побужденія, увеличивается, сосуды дѣлаются такъ чувствительны, что при малѣйшемъ умноженіи крови, а иногда и при обыкновенномъ количествѣ оной понуждаютъ уже къ новому кровопусканію, по причинѣ разныхъ тягостныхъ гемороидальныхъ и другихъ припадковъ, сопровождаемыхъ иногда кровотеченіемъ изъ носу либо изъ гортани.

Впрочемъ людямъ, сдѣлавшимъ уже привычку къ частому кровопусканію, не всегда можно отказывать въ ономъ; они не вдругъ должны оставлять вовсе кровопусканіе, ибо неоднократно оказывались печальныя слѣдствія съ таковыми людьми отъ упущенныхъ кровопусканій. Благовременное кровопусканіе таковымъ людямъ въ особенности необходимо, какъ скоро окажутся у нихъ явные признаки наклонности къ воспаленію и сильнаго напора крови къ важнымъ частямъ тѣла, какъ то: къ мозгу, къ легкимъ и сердцу и т. п. и когда случится головокруженіе, колотье, кровохарканіе и проч. Человѣкъ къ болѣзнямъ таковаго рода, къ болѣзнямъ воспалительнаго свойства въ особенности рас-

положенъ бываетъ весною, въ ясную погоду, когда воздухъ сухъ, плотенъ и холоденъ.

§ 68.

Вышесказанное на счетъ лѣченія раздраженнаго состоянія кровоносныхъ сосудовъ противусудорожными средствами относится и *до чрезмѣрно-возвышенной чувствительности* и наклонности организма къ судорогамъ. И здѣсь равнымъ образомъ горячительныя противусудорожныя средства бываютъ вредны. Ежели многіе чувствительные гемороидалисты, истерикѣ подверженныя женщины, ипохондрики и тому подобные больные лѣчимы бываютъ безъ успѣха: то сіе большею частію зависитъ отъ того, что всѣ противусудорожныя, то есть, умѣряющія чрезмѣрную чувствительность и нервы укрѣпляющія средства даются имъ въ смѣшеніи съ виннымъ *спиртомъ* и что больные сіи не берегутся притомъ отъ горячащихъ лѣкарствъ, пищи, вина и другихъ напитковъ. Посему гемороидалисты слишкомъ чувствительные и наклонные къ судорогамъ должны употреблять: 1) тепловатыя ароматическія ванны; 2) водянистыя настойки изъ листьевъ и цвѣтовъ *померанцовыхъ*, *тысячелистника*, *звѣробойника*, изъ корня *маунпаго*, изъ *майорана кошечьяго* (Teucrium marum), *калуфера*, *кошечьей мяты* (Nepeta cataria); 3) настойку изъ листьевъ и сѣмянъ *крапивы*, *лавровишневую воду* и прочія въ предъидущемъ § показанныя

противусудорожныя средства. Въ послѣдствіи прилично вышеупомянутыя средства давать 4) въ смѣшеніи съ ароматическими укрѣпляющими средствами, какъ то: съ корнемъ *гравилата аптекарскаго* (Rad. gei urbani), *квассіи*, *хины* и т. п., употребляя ихъ въ продолженіи двухъ или трехъ мѣсяцовъ непрерывно.

§ 69.

Въ *притупленной чувствительности* и *раздражительности* (Torpide Schwäche) кровоносныхъ сосудовъ, ихъ конечностей и сосудистыхъ нервовъ, также мышечныхъ волоконъ въ брюшныхъ внутренностяхъ и особенно во вратожильной системѣ, полезны средства, жизненную дѣятельность къ органическому противодѣйствію возбуждающія (incitantia), и именно: въ большихъ пріемахъ корень *дягильной, спиртъ дягильной сложный* (Spiritus angelicae comp.), *корень ирный* (Rad. acori calami), *корень аптекарскаго гравилата* (Rad. gei urbani), *эфирныя масла*, на пр: *масло коричневое* (Ol. cinnamomi veri), *масло померанцовое* (Oleum c. aurant.), *мушкатный цвѣтъ* (Macis), *масло мятное* (Ol. menthae p.), *масло мастичное* (Ol. Mastihinum), *масло скипидарное* (Ol. pini laricis). Сіе послѣднее съ особеннымъ успѣхомъ употребляю я въ слѣдующемъ смѣшеніи:

Возьми: *сахару* двѣ драхмы,

масла скипидарнаго (Oleum destill. pin-

colaricinum) капель 40, разотри въ стеклянной ступкѣ и смѣшай съ шестью унціями *углекислой воды* (Aqua acidi carbonici).

Пріемъ: три раза въ день по чайной чашкѣ.

Или

Возьми: *скипидарнаго масла* (Ol. dest. pineolaricinum) три драхмы,

масла гвоздичнаго (Oleum eug. caryophyllatae) одинъ скрупулъ,

сиропу простаго (Syrupi simplicis) одну унцію,

наливки дягильнаго корня (Intus. r. angelicae) шесть унцій, смѣшай.

Пріемъ: черезъ два часа по столовой ложкѣ.

Послѣ сихъ средствъ съ пользою можно давать *Гофмановы капли,* особливо съ желѣзомъ (Liquor. anod. martialis), отъ двадцати до тридцати капель на пріемъ, *спиртъ уксусоэфирный желѣзный* (Spiritus aceti aethereus martiatus), отъ десяти до сорока капель на пріемъ,—сіе послѣднее средство въ особенности прилично при судорожномъ истерическомъ состояніи; *минеральныя воды*, особливо Карлсбадскія, какъ внутрь, такъ и въ видѣ ванны и клистира; *вино* скородѣйствующее на прим: *Бургонское*, *Токайское, Шампанское* и *мадера.*

По употребленіи вышесказанныхъ такъ называемыхъ летучихъ возбуждающихъ средствъ прилично давать постоянныя крѣпительныя, какъ то: *горячавку* (Gentiana lut.), *квассію, хи-*

ну, вина, продолжительнѣе дѣйствующія, на пр: *старой рейнвеинъ, францвеинъ, медокъ* и проч. съ умѣренностію. Сверхъ того въ притупленномъ состояніи кровоносной системы и сосудистыхъ нервовъ полезны побуждающія геморой средства, описанныя въ § 59, и отвращающія чревные завалы, см. § 61. Сюда принадлежатъ также: камедь *бакаутная* (Gummi resina gvaiaci) *галбанъ, амміякъ, корень дикаго аврану* (Rad. gratiolae), *Жеофреево иголчатое растѣніе* (Geofraea) и проч. Наружныя средства: треніе брюха и всего тѣла, ванны ароматическія и ванны изъ вина. Во время притупленной чувствительности или недѣятельности кишечнаго канала (Torpor) случаются обыкновенно упорные запоры на низъ, и потому полезны бываютъ средства, побуждающія кишечный каналъ, какъ то: *ревень, бычачья желчь, пилюли сабурныя, очищенная сѣра съ винощелочною солью, минеральныя воды* и т. п.

Для человѣка съ притупленною чувствительностію приличенъ климатъ теплой, мѣста гористыя и воздухъ сухой, достаточно окислотворенный.

О лѣченіи геморoидальной колики.

§ 70.

Геморoидальная колика обнаруживается судорогами и жестокою жгучею болью, около пупка или по всему животу ощущаемою; при

чемъ больной имѣетъ позывъ на рвоту, подверженъ отрыжкамъ и икотѣ, кричитъ, мечется съ мѣста на мѣсто и ужасно безпокоится. Боли подступаютъ иногда подъ сердце и затрудняютъ дыханіе, пульсъ дѣлается судорожный и бываетъ иногда слабъ и скоръ, иногда же крѣпокъ и полонъ; руки и ноги больнаго холодѣютъ, брюхо надувается и сверхъ запора на низъ моча багроваго цвѣта съ трудомъ испущается.

Колика сего рода во всякомъ случаѣ составляетъ болѣзнь важную, ибо она легко можетъ перейти въ воспаленіе кишекъ. Жестокость ея доказывается уже и тѣмъ, что она нерѣдко оканчивается рвотою съ кровью, кровотеченіемъ изъ гемороидальныхъ сосудовъ или изъ дѣтородныхъ частей, а иногда и сильнымъ обморокомъ.

Успѣшное излѣченіе *гемороидальной колики* зависитъ отъ правильнаго изслѣдованія причинъ и немедленнаго уклоненія оныхъ. Въ особенности нужно сильное раздраженіе и наклонность къ воспаленію отвлечь отъ желудка и тонкихъ чувствительныхъ кишекъ къ толстымъ. Главнѣйшее здѣсь средство есть *клистиръ* изъ смягчительныхъ, боль утоляющихъ средствъ, который, производя свободное испражненіе жестокихъ и острыхъ экскрементовъ и вѣтровъ, немедленно доставляетъ больному облегченіе.

При весьма сильной боли въ животѣ, когда больный притомъ крѣпкаго тѣлосложенія и многокровенъ, — когда пульсъ у него полонъ и крѣпокъ и особливо когда не задолго предъ симъ употребилъ онъ много крѣпкихъ напитковъ и горячительной пищи, — скорое и достаточное кровопусканіе бываетъ необходимо, равно какъ и прохладительный методъ лѣченія.

Колика, причиняемая сильнымъ отдѣленіемъ и изліяніемъ желчи въ желудокъ и въ тонкія кишки (*), укрощается рвотнымъ, въ самомъ началѣ употребленнымъ — и именно, изъ двадцати гранъ *илекакуанны* и одного грана *рвотной соли*. Средство сіе кратчайшимъ путемъ освобождаетъ верхнюю часть кишечнаго канала отъ желчи, несварившейся пищи, отъ слизи и спершихся вѣтровъ. Впрочемъ буде колика будетъ сопровождаться жестокою рвотою, больнаго сильно изнуряющею, то мгновенно иногда помогаетъ *Риверовъ напитокъ* съ *опійными каплями* или и безъ оныхъ; причемъ давать больному пить отваръ *ячной* или перловой *крупы*, настоенной съ верьхушками *тысячелистника* и подслащенный *вишневымъ* или другимъ какимъ

(*) Сіе узнается изъ чувства полноты и тоскливой боли подъ ложечкою (praecordia), изъ горькаго вкуса во рту, изъ желтоватаго языка, изъ рвоты, изъ мочи шафраннаго цвѣта и изъ испражненій низомъ темножелтыхъ, черноватыхъ или какъ будто пережженныхъ.

сироломъ, либо отваръ крупъ съ примѣсью *сока померанцоваго* или *лимоннаго.* Послѣ *Риверова напитка* полезенъ чай изъ *ромашки* съ *мятою* или просто вода съ *уксусомъ* и *медомъ.* Нечистоты изъ кишечнаго канала легкими слабительными средствами испражняются уже обыкновенно по укрощеніи колики (въ продолженіе же оной слабительныя давать опасно). При нечистотахъ и кислотѣ въ кишечномъ каналѣ съ пользою предписать можно и слѣдующую микстуру изъ древеснаго угля:

Возьми: *древеснаго угля,* въ порошокъ стертаго, одну столовую ложку, вскипяти съ полуфунтомъ воды и простудивъ, процѣди и прибавь:
ревенной настойки одну столовую ложку,
эликсира болеутолительнаго (Elixir paregorie) двѣ чайныя ложки,
эссенціи мятной одну чайную ложку и
слизи изъ *Аравійской камеди* (mucil. g. acaciae verae) двѣ столовыя ложки.

Пріемъ: черезъ каждые полчаса по столовой ложкѣ. При лѣченіи колики, сопряженной съ внезапно прекращеннымъ привычнымъ гемороидальнымъ истеченіемъ крови надлежитъ руководствоваться сказаннымъ въ § 66.

Колика, усугубляемая недостаткомъ естественной слизи въ кишечномъ каналѣ и зависящею отъ сего чрезмѣрною раздражительно-

стію кишекъ (*), излѣчивается слизистыми и клейкими веществами въ соединеніи съ противусудорожными.

Напослѣдокъ для укрощенія судорогъ и боли и вмѣстѣ для открытія испарины (что въ простудной коликѣ необходимо нужно) полезны *спиртъ летучій оленьяго рога,* теплая съ ароматическими травами ванна; въ недостаткѣ же оной прикладываніе къ брюху теплыхъ суконочныхъ припарокъ изъ отвара мягчительныхъ ароматическихъ травъ или сухаго нагрѣтаго овса, отрубей, муки или золы; полезно также употребленіе тепловатаго чаю *изъ ромашки* съ верьхушками тысячелистника при потогонной микстурѣ изъ *Миндерероваго напитка* и изъ *киселя бузыннаго,* смот. § 45; втираніе въ брюхо болеутолительныхъ мазей, на прим: обыкновенной *летучей амміаковой камфорной мази* (Liniment. ammoniat. camphor) съ примѣсью *масла белены* или *опійныхъ капель.* Когда вѣтры, спершіеся въ кишкахъ, усугубляютъ колику, то вышеописанное лѣченіе бываетъ и здѣсь достаточно; сверхъ того смотри объ отвращеніи вѣтровъ въ кишечномъ каналѣ и о лѣченіи вѣтренной колики.

(*) Слѣдствіе продолжительныхъ поносовъ или употребленія гонящихъ и проносныхъ средствъ.

Объ отвращеніи жестокой геморoидальной головной боли и головокруженія.

§ 71.

Жестокая головная боль и головокруженіе, коимъ геморoидалисты иногда подвергаются, суть одни изъ важнѣйшихъ сочувственныхъ припадковъ геморoидальной болѣзни и слѣдствія венознаго страданія въ брюшной полости, особливо воспященнаго кругообращенія крови въ системѣ воротной жилы, слѣдствія полнокровія, сильнаго напора крови къ головѣ, излишняго накопленія крови въ мозговыхъ пазухахъ и варикознаго расширенія венъ въ корковомъ существѣ мозга и въ можжечкѣ (*). Разслабленіе желудка и накопленіе въ ономъ недоваренной пищи и множества слизи и вѣтровъ, простуда, предшествующая иногда сему разстройству въ желудкѣ, геморoидальный приступъ послѣ объяденія и упійства крѣпкими напитками, продолжительное сидѣніе и сильное напряженіе мозга, — вотъ большею частію случайныя причины, кои при вышеупомянутомъ состояніи кровоносныхъ сосудовъ производятъ жестокую головную боль и головокруженіе. Болѣзнь сія случается по большой части весною и осенью и въ особенности, по наблюденію моему, бываетъ весьма опасною отъ половины Февраля до исхода Апрѣля; масленица, великій постъ и роз-

(*) Puchelt das Wenen System, pag. 182.

говѣнье много сему содѣйствуютъ. Въ сіе время много людей умираетъ отъ апоплексическаго удара. Многоопытный Академикъ нашъ Г. *Уденъ* замѣтилъ, что головная боль и головокруженіе повально свирѣпствовали въ С. Петербургѣ въ Генварѣ мѣсяцѣ 1817 года. Онъ предполагаетъ, что болѣзнь сія произошла отъ уменьшеннаго электричества воздуха (смотри Академическихъ Чтеній часть III, стр. 409).

Лѣченіе. 1) Когда при жестокой головной боли и головокруженіи желудокъ и кишки будутъ засорены, на пр: когда у больнаго горечь во рту, языкъ бѣлъ и когда онъ чувствуетъ тяжесть въ верхней части брюха или позывъ на рвоту: тогда дать ему рвотное; сверхъ того для очищенія кишечнаго канала отъ недоваренной пищи, слизи и вѣтровъ поставить промывательное и дать слабительное изъ одной унціи горькой слабительной соли (Sulphas magnesiae), изъ шести драхмъ водянистой *ревенной настойки* (Tinct. rhei aquosa), изъ полунціи *сахару* и трехъ унцій *наливки Александрійскаго листа* (Infus. fol. sennae s. s.). Для большаго успѣха нужно предписать больному, сверхъ вышепоказанныхъ слабительнаго и клистира, еще на ночь (въ слѣдующій день) порошокъ изъ 10 гранъ *ревеню* и отъ 3 до 10 гранъ услащенной ртути. 2) Когда простуда содѣйствовала къ произведенію сей болѣзни, тогда надлежитъ употребить средства, испарину открывающія, см. §. 45; особенно по-

лезно въ семъ случаѣ ставить ноги въ теплую воду, настоенную съ горчицею. 3) Когда жестокая головная боль и головокруженіе суть слѣдствія многокровія, сильнаго напора крови къ головѣ и варикознаго расширенія венъ въ мозгу: въ такомъ случаѣ надлежитъ больному немедленно пустить кровь, а къ вискамъ и затылку припустить отъ 10 до 12 піявицъ, и для послабленія низомъ предписать слабительное и клистиръ, какъ выше сказано; сверхъ того больному должно пить болѣе холоднаго *лимонада*, приготовленнаго изъ воды, *сахара* и *кремор-тартара*. Голову смачивать холодною водою съ уксусомъ и тереть льдомъ; полезно также нюхать крѣпкой уксусъ; больному, буде можетъ, должно непремѣнно выйти или выѣхать на открытый чистый воздухъ — сіе освѣжитъ и подкрѣпитъ его наилучшимъ образомъ. Таковые больные отнюдь не должны предаваться сильнымъ страстямъ; имъ надлежитъ избѣгать потрясеній мозга, остерегаться прогнанія крови отъ другихъ не столько важныхъ частей тѣла и избѣгать всего, что горячитъ и волнуетъ кровь. 4) Воспященное кругообращеніе крови въ системѣ воротной жилы, служащее сочувственною причиною жестокой головной боли и головокруженія, отвращается очищеніемъ кишечнаго канала слабительнымъ или клистиромъ изъ солей, изобильнымъ питьемъ *Зельцерской минеральной воды*, также употребленіемъ *сыворотки*,

съ *кремортартаромъ* приготовленной, раствора *винощелочной соли, сѣрныхъ цвѣтовъ* съ *винощелочною солью* или съ *кремортартаромъ*, и умѣренной кисловатой, прохлаждающей пищи и питья. 5) Впрочемъ каждому гемороидалисту, часто подвергающемуся жестокой головной боли или головокруженію, и особенно при расположеніи тѣла къ апоплексіи и сыпяхъ воспалительнаго свойства на головѣ и на лицѣ, надлежитъ вообще: a) воздерживаться отъ спиртуозныхъ напитковъ; портеръ и всякое другое крѣпкое пиво вредны по усыпительному (наркотическому) своему свойству; равнымъ образомъ вредитъ и неумѣренное употребленіе мясной пищи съ горячащими приправами, а полезна напротивъ пища изъ растѣній, молочная, водянистая; b) не спать слишкомъ долго, а послѣ обѣда и вовсе не спать; c) употреблять питье прохлаждающее, о коемъ сказано въ §. 45; d) какъ можно чаще пользоваться чистымъ, открытымъ воздухомъ и умѣреннымъ тѣлодвиженіемъ, остерегаясь отъ бѣганья, сильныхъ скачковъ и отъ сильнаго потрясенія мозга; e) голову не кутать слишкомъ тепло, и потому кто сдѣлалъ привычку къ теплымъ шапкамъ, долженъ исподоволь оставлять оную; f) испражненія низомъ и мочи, равно и испаренія кожи, должны производиться безпрепятственно; наконецъ g) во время описанной здѣсь головной боли больный до совершеннаго выздоровленія своего крайне долженъ остере-

гаться отъ многаго писанія и чтенія, требующихъ продолжительнаго умственнаго напряженія. Lieutaud (lib. III, obs. 164 etc.) нашелъ у одного молодаго человѣка, послѣ продолжительной работы головою умершаго, вены такъ называемыхъ сосудистыхъ сплетеній (Plexus choroid.) внутренней мозговой оболочки чрезмѣру расширенными кровію.

Сказанное здѣсь на счетъ предостереженія страждущихъ отъ жестокой головной боли, головокруженія и сыпей воспалительнаго свойства на головѣ и на лицѣ, въ особенности относится къ весеннему времени; ибо весною большею частію головные припадки бываютъ опасны, и въ сіе время, какъ извѣстно, многіе умираютъ отъ апоплексическаго удара.

Весьма многое сказанное здѣсь о головной боли и головокруженіи заимствовалъ я изъ собственнаго опыта; ибо я самъ принадлежу также къ числу гемороидалистовъ и часто страдаю отъ головной боли и головокруженія; о чемъ и упомяну здѣсь вкратцѣ. Четыре весны сряду страдалъ я по нѣскольку дней отъ періодической головной боли съ сыпью на лицѣ, особенно на вѣкахъ глазъ и на ушахъ; крупная сыпь при свербежѣ пораженныхъ ею частей наливалась тонкою прозрачною влагою и по прошествіи четырехъ дней обыкновенно исчезала; при чемъ жаръ и боль въ головѣ въ первыя три весны были еще сносны, такъ что я могъ съ сею

сыпью выходить со двора. Лѣченіе состояло изъ строгой прохладительной *діеты* и питія *лимонада* съ *кремортартаромъ*. Въ послѣднюю весну, т. е., прошлаго 1819 года, на страстной недѣлѣ великаго поста, сыпь не показалась, но вмѣсто того сдѣлалось ужаснѣйшее головокруженіе. Съ симъ припадкомъ просыпался я періодически въ 4 часа по полуночи трое сутокъ сряду; три ночи не могъ я лечь въ постелю, а долженъ былъ сидѣть въ креслахъ. Припадки, сопровождавшіе сіе ужасное головокруженіе, были: великая блѣдность лица, рвота, языкъ, обложенный густою бѣлою слизью, пульсъ слабый, судорожный, при чемъ ни сильной боли въ головѣ, ни признаковъ многокровія не было. Причиною сего головокруженія полагаю я: a) наклонность головы къ сильному приливу соковъ, b) употребленіе портера, c) сидѣніе ночью за чтеніемъ и писаніемъ, d) разслабленіе желудка и накопленіе въ ономъ и во всемъ кишечномъ каналѣ множества слизи и вѣтровъ, e) страданіе брюшныхъ нервовъ и крововозвратныхъ сосудовъ. Весьма много содѣйствовало сему также и то, что, употребляя постную умѣренную пищу, имѣлъ я неосторожность наѣсться *устрицъ* съ *лимонною кислотою*, которая всегда была вредна слабому моему желудку (*).

(*) Отнынѣ отказываюсь я навсегда отъ сихъ жителей моря; не худо бы также подражать мнѣ въ семъ случаѣ и всѣмъ тѣмъ, кои не одарены отъ природы

Лѣченіе сего опаснаго головокруженія состояло: 1) въ пріемѣ рвотнаго изъ 20 гранъ *илекакуанны* и одного грана соли рвотной виносюрьмяной, 2) въ пріемѣ слабительнаго изъ горькой *соли* и *ревеню*, см. выше, 3) въ употребленіи угольнаго порошка, 4) въ частомъ треніи головы льдомъ, 5) въ частомъ нюханіи крѣпкаго *Безоарднаго уксуса* и намачиваніи онымъ темя головы; 6) коль скоро головокруженіе меня оставляло, выходилъ я тотчасъ на свѣжій, открытый воздухъ и каждый разъ прохаживался съ версту. Сіе освѣжало меня чрезвычайно. Въ послѣдствіи долгое время наблюдалъ я строгую діету и укрѣплялъ желудокъ мятною водою съ *желудочнымъ Гофмановымъ эликсиромъ*.

Замѣчаніе на счетъ чудеснаго дѣйствія хрѣна въ излѣченіи жесточайшей головной боли.

Осенью 1815 года въ Ревелѣ страдалъ я трое сутокъ безпрерывно отъ жесточайшей головной боли, которая ежечасно усиливалась отъ случившагося притомъ безпрестаннаго сухаго кашля. Употребленныя мною рвотное, слабитель-

---

крѣпкимъ желудкомъ. Кромѣ устрицъ *лимонная кислота*, поглощаемая вмѣстѣ съ ними, вредитъ почти каждому слабому желудку. *Мадера*, *крѣпкой портвейнъ* и *портеръ*, коими обыкновенно запиваютъ устрицы, причиняютъ также немалый вредъ.

ное, клистиръ, піявицы къ вискамъ, шпанская муха на затылокъ, потогонныя питья и теплая ванна не доставили мнѣ ни малѣйшаго облегченія; напослѣдокъ, когда уже совершенно терялъ я силы къ перенесенію сей ужаснѣйшей головной боли и даже близокъ былъ къ лишенію ума, благодѣтельный инстинктъ внушилъ мнѣ употребить самое простое домашнее средство — *хрѣнъ*. Истертый на теркѣ хрѣнъ, смоченный ренскимъ уксусомъ, приложилъ я на темя головы, крѣпко обвязавъ ее платкомъ, и по прошествіи пяти минутъ, когда боль отъ *хрѣна* сдѣлалась нестерпима, снялъ оный. Тотчасъ послѣ сего съѣлъ я тарелку тюри, съ *хрѣномъ* же приготовленной. Тюря состояла изъ полной столовой ложки свѣжаго истертаго *хрѣну*, изъ нѣсколькихъ щепотокъ *соли*, изъ двухъ столовыхъ ложекъ мѣлко искрошеннаго мякиша *ржанаго хлѣба* и изъ большаго стакана *квасу*. Послѣ сего не болѣе какъ черезъ полчаса избавился я совершенно отъ нестерпимой моей головной боли. Всего удивительнѣе, что вмѣстѣ съ симъ прекратился и несносный сухой кашель, непрестанно меня мучившій.

Весьма желательно, чтобы приведенный мною примѣръ цѣлительной силы *хрѣна* послужилъ и другимъ въ пользу, а равно и поводомъ къ дальнѣйшимъ наблюденіямъ на счетъ употребленія его въ подобныхъ ревматическихъ нервнососудистыхъ боляхъ въ головѣ. — Къ удо-

вольствію моему испыталъ я здѣсь вторично въ 1817 году полезное дѣйствіе *хрѣна* отъ головной боли. Одна молодая дѣвица, дочь Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника И. И. Р., страдала долгое время отъ головной боли; средства, знакомыми сему дому Врачами употребленныя, оставались безуспѣшными. Но *тюря съ хрѣномъ*, на ночь, по совѣту моему, употребленная и *хрѣнъ* же *съ уксусомъ*, на темя головы приложенный, совершенно вылѣчили сію дѣвицу въ нѣсколько минутъ отъ жестокой головной боли, которая каждый вечеръ періодически ее мучила и приводила уже въ безпокойство ея родителей.

О лѣченіи геморроидальнаго кровохарканія или легочнаго геморроя.

§ 72.

Легочнымъ геморроемъ (Haemorrhois pulmonum) называется хроническое *кровохарканіе* или *кровотеченіе* изъ *легкихъ*, зависящее отъ тѣхъ же самыхъ причинъ, кои произраждаютъ почечуй, и которое, какъ нѣкоторые полагаютъ, заступаетъ яко бы мѣсто пріостановленныхъ другихъ кровотеченій (vicarians). Думаютъ иные (Pohl de varice intern. morb. quor. causa), что таковое кровотеченіе бываетъ иногда безвредно; но я полагаю, что оно во всякое время составляетъ важную болѣзнь, которая, если скоро прекращена не будетъ, оканчивается обыкно-

венно разрушеніемъ самыхъ легкихъ, т. е., чахоткою.

Сіе хроническое венозное кровотеченіе изъ легкихъ бываетъ почти всегда безъ лихорадочныхъ припадковъ, зависитъ отъ сильнаго прилива крови къ легкимъ, отъ болѣзненно-возвышенной венозной системы и отъ сильнаго расширенія легочныхъ венъ. Замѣчено, что легочныя *вены*, подобно гемороидальнымъ, иногда вздуваются и накопляютъ въ себѣ слишкомъ много крови. Сіе въ особенности подтверждаетъ *Pohl*; онъ находилъ у одержимыхъ симъ кровотеченіемъ послѣ ихъ смерти всѣ почти легочныя *вены* варикозными, кровь же запекшеюся и свернувшеюся. Таковыя кровоистеченія изъ легкихъ случаются: a) у людей нѣжнаго, венознаго тѣлосложенія съ слабыми и слишкомъ раздражительными кровоносными сосудами; b) у имѣющихъ иногда расположеніе къ золотухѣ и ломотѣ; c) иногда у женщинъ, у коихъ мѣсячное очищеніе, и у мущинъ, у коихъ почечуйное истеченіе по какой либо причинѣ пріостановилось; d) у людей, живущихъ въ жаркомъ климатѣ и въ слишкомъ тонкомъ воздухѣ; e) у людей, предающихся сильнымъ страстямъ и неостерегающихся отъ чрезмѣрнаго тѣлодвиженія, на пр: у танцующихъ неумѣренно, у тѣхъ, кои много ходятъ пѣшкомъ или ѣздятъ на тряскихъ экипажахъ, особливо въ жаркое время, и наипаче у тѣхъ, кои носятъ слишкомъ узкую

одежду и весьма крѣпко стягиваются; f) у людей, безпрерывно ведущихъ сидячую жизнь съ согбенною на передъ грудью, и наконецъ g) у людей, кои часто простуживаются и у коихъ засорены брюшныя внутренности.

Лѣченіе. Устранить немедленно всѣ вышесказанныя причины, умѣрить тѣлодвиженіе, остерегаясь особливо отъ сильнаго крику, скачковъ и тому подобнаго, грудь сильнымъ образомъ потрясающаго. Пищу употреблять не слишкомъ питательную и негорячащую, напитки спиртуозные вовсе оставить, одежду носить свободную, особливо не завязывать слишкомъ крѣпко галстука и не подтягивать излишне подтяжки. Нужно также поддерживать слабительными средними солями свободное испражненіе низомъ. При сильной одышкѣ, сопровождающей таковое кровохарканіе, особливо въ стеническомъ состояніи, полезно кровопусканіе изъ руки, либо рожечное изъ груди (*) и приложеніе между крыльцовъ шпанской мушки; надлежитъ давать слизистыя питья, на прим: отваръ травы *мать-мачихи*, *проскурнячнаго корня* и тому подобныя съ *Галлеровою кислотою*, употреблять *наперстную траву* и *илекакуанный корень* въ видѣ порошка, отъ каждаго по $\frac{1}{4}$ до $\frac{1}{2}$ грана на пріемъ съ сахаромъ

(*) См. о кровопусканіи людямъ, сдѣлавшимъ къ оному привычку.

либо съ *розовою консервою* черезъ каждые два часа. *Крамерія Американская* (Rathanhia) въ остановленіи кровохарканія, равно какъ и всякаго другаго кровотеченія, занимаетъ первое мѣсто. Изъ корня ея приготовляется крѣпкій отваръ (Decoctura rad. rathanhiae) и дается больному по двѣ столовыя ложки черезъ часъ либо черезъ два часа. Къ каждому пріему съ пользою можно прибавлять капель по 6 кислаго *Галлероваго эликсира* и немного сахару. Либо взять сгущеннаго сока *крамеріи Американской* (Extr. ratanhiae) двѣ драхмы, растворить въ 4 унціяхъ *розовой воды* и потомъ прибавить двѣ чайныя ложки *ренсковаго уксуса* и одну драхму *сахара*. *Пріемъ:* выпить въ два или въ три раза въ теченіи двухъ или трехъ часовъ времени. Весьма полезенъ также *экстрактъ лазореваго дерева*, на прим:

Возьми: *экстракта лазореваго дерева* (Extr. ligni campech.) полунціи,
крѣпкаго чаю изъ травы будры четыре унціи,
сиропа будры (Syrup. Hederae terrestris) одну унцію, смѣшай.

Пріемъ: каждый часъ по столовой ложкѣ.

Съ недавняго времени начинаю я съ пользою употреблять въ хроническомъ кровохарканіи *масло мастичное* (Oleum mastichinum), см. ниже.

Въ легочномъ катаррѣ съ кровохарканіемъ, особливо у стариковъ, весьма одобряется трава будра (Herba hederae terrestris) въ видѣ чая съ молокомъ и въ видѣ сиропа.

Когда кровохарканіе сопровождается сильнымъ кашлемъ, тогда полезны успокоивающія средства, на пр: *масло блекоты* (Oleum hyosciami nigri).

Возьми: *масла блекотнаго* полунціи,
масла мастичнаго (Ol. mastich.) полдрахмы,
Аравійской камеди (G. acaciae verae) одну унцію,
зруднаго чаю (Infus. specier. alth. compos.) четыре унціи,
сиропа проскурнячнаго (Syrup. de alth.) одну унцію, смѣшай.

Пріемъ: каждый часъ по столовой ложкѣ. Либо

Возьми: *масла блекотнаго* три драхмы,
сиропа изъ травы будры (Syrup. hederae terrestris) одну унцію, смѣшай.

Пріемъ: каждый часъ по чайной ложкѣ.

Соль поваренная (Murias sodae), мѣлко истолченная, многими употреблена была съ пользою для остановленія кровохарканія; ее поглощаютъ безъ всякой примѣси отъ 2 до 4 чайныхъ ложекъ.

Сиропъ Лафектеровъ употребляю я также съ великимъ успѣхомъ въ остановленіи кровохарканія.

Почечуйнаго теченія, случившагося при кровохарканіи, останавливать не слѣдуетъ. Когда же при легочномъ кровотеченіи случится гемороидальный приступъ, или когда почечуй внезапно прекратится, въ такомъ случаѣ съ пользою можно припустить къ проходу дюжину піявицъ и садиться на теплые пары; впрочемъ для успѣшнѣйшаго остановленія кровотеченія изъ легкихъ надлежитъ всегда изыскать случайную причину, произведшую и поддерживающую кровотеченіе.

Не льзя здѣсь не замѣтить, что какъ содержаніе больнаго въ прохладѣ и употребленіе внутрь всего холоднаго полезно для остановленія кровотеченія, случившагося отъ сильнаго жара, отъ полнокровія и сильнаго волненія въ крови, такъ необходимо нужно напротивъ больнаго согрѣть и открыть у него испарину легкими потогонными средствами, когда кровотеченіе произведено и поддерживается простудою. Зимою 1816 года имѣлъ я случай сильное кровохарканіе, десять сутокъ продолжавшееся, прекратить совершенно слѣдующимъ способомъ: холодная комната, въ которой больной лежалъ, нагрѣта, больному дано легкое потогонное средство изъ двухъ унцій *Миндереровaго россола* (Acetas ammoniae liquidus) и изъ 4 унцій *груднаго чаю;* сверхъ того больный пилъ много чаю изъ *грудной травы* (Species alth. comp.); къ ногамъ приложены были кувшины съ теплою водою;

послѣ сего больный сильно вспотѣлъ и чрезъ 24 часа избавился отъ кровохарканія, которое приводило жизнь его въ крайнюю опасность. Здѣсь кровохарканіе *больнаго* произведено было и поддерживалось сильною простудою, слѣдственно содержаніе больнаго въ прохладѣ и всѣ кислоты и другія, впрочемъ полезныя, средства остались бы недѣйствительны.

Послѣ пріостановленія кровохарканія, какого бы рода оно ни было, надлежитъ, въ отвращеніе возврата онаго и особливо для предупрежденія чахотки, укрѣпить легкія продолжительнымъ употребленіемъ: 1) *Исландскаго моха* въ видѣ желе, либо 2) отвара сего же моха съ сиропомъ *сенеги* (Syrup. pol. senegae), либо съ сиропомъ будры (Syr. herb. hederae terrestr.); 3) крѣпкаго чаю изъ цвѣтовъ съ листьями *матьматихи* (Tussilago farfarae) — *Иппократово* средство къ излѣченію чахотки (Phthisis exulcerata); 4) отвара или крѣпкаго чаю изъ *будры*, 5) отвара изъ травы *золотой розги* (Herba virgae aureae); 6) *кофе* изъ поджаренныхъ и крупно истолченныхъ каштановъ (Fructus aesc. hippocastani), — изъ одной унціи варить 6 чашекъ таковаго кофе — и наконецъ 7) *сирона Лафектерова*.

О распознаваніи и лѣченіи пузырнаго геморроя.

§ 73.

Припадки пузырнаго геморроя (смот. § 14) суть троякаго рода: 1) судорожныя, 2) происходящіе отъ варикозной опухоли венъ около шейки мочеваго пузыря, и 3) состоящіе въ истеченіи изъ мочеваго пузыря крови и слизи. Судорожная боль, сопровождаемая ежеминутнымъ позывомъ къ испущенію мочи, начинается съ мочеваго пузыря и распространяется на сопредѣльныя съ онымъ части, какъ то: на почки, мочеиспускательный каналъ, на заднепроходную промежность, на мошонку; при чемъ мужескій стволъ сжимается и какъ бы входитъ внутрь. Боль, при семъ ощущаемая, бываетъ тупая, какъ бы отъ давленія и ущемленія; когда же случается у женщинъ, то походитъ на родовыя потуги. Отъ судорогъ и отъ опуханія венъ около шейки мочеваго пузыря, которое предшествуетъ кровоистеченію, моча испущается съ болью, а иногда и совершенно задерживается; въ семъ случаѣ ощущается боль и надутіе въ брюхѣ надъ пузыремъ и больный объемлется страхомъ и тоскою, сильно потѣетъ и чувствуетъ лихорадочные припадки. Кровь истекаетъ большею частію одна безъ мочи, темнаго цвѣта, ссѣвшаяся; когда же выходитъ съ мочею, то весьма мало съ оною смѣ-

шивается. Моча бываетъ тогда похожа на темнокрасноватое полпиво, на днѣ урыльника дѣлается осадка, подобная бѣлой либо красной глинѣ. Слизь въ пузырномъ гемороѣ, въ большомъ иногда количествѣ вмѣстѣ съ мочею истекающая, находима была прозрачною, на подобіе нитей или клочковъ, иногда тягуча какъ патока; мною замѣчена была однажды весьма мутною, сѣраго цвѣта и какъ бы совершенно смѣшанною съ множествомъ песка и пѣнистой матеріи, хотя видимая примѣсь сія, по процѣженіи мочи, скоро исчезала и на высушенномъ полотнѣ оставалось только нѣсколько ранжевыхъ зеренъ мочевой соли. Осадка мочи въ пузырномъ гемороѣ составляетъ иногда гнойное вещество. Г. Академикъ *Уденъ* предполагаетъ, что оное происходитъ отъ малыхъ пузырьковъ, пришедшихъ въ нагноеніе и образовавшихся въ мочевомъ пузырѣ, подобно какъ и въ катарральной жабѣ; сіе однакожъ относится уже болѣе къ хроническому пузырному катарру.

Надлежитъ остерегаться, чтобы не принять за пузырной геморой другія въ мочевомъ пузырѣ случающіяся болѣзни, на прим: полипы или мясистые и губчатые наросты, воспаленіе, нагноеніе, язвы, отвердѣніе, параличь и бѣли, у женщинъ бывающія. Припадки, зависящіе отъ каменной болѣзни въ почкахъ и пузырѣ также весьма похожи на припадки пузырнаго гемороя. Но камень скоро обнаруживается чрезъ впуще-

ніе въ мочевой пузырь катетера, и моча въ каменной болѣзни въ самомъ уже началѣ бываетъ вонюча и на высушенномъ полотенцѣ дѣлаетъ осадку, подобную известкѣ, чего при гемороѣ пузырномъ не бываетъ. При камнѣ въ почкахъ несносная боль начинается обыкновенно отъ почки, простираясь по той же сторонѣ брюха и ляшки въ ногу и оканчивается обыкновенно истеченіемъ матеріи, смѣшанной съ уриною. Сильный нудъ и боль въ пузырѣ, ощущаемыя при испущеніи мочи, особливо при вытѣсненіи послѣднихъ капель оной, бываютъ и сочувственнымъ припадкомъ съуженія и скиррознаго затвердѣнія заднепроходной кишки (Strictura intestini recti) По сей причинѣ при такъ называемомъ пузырномъ гемороѣ не должно выпускать изъ виду и изслѣдованія проходной кишки и матки съ ея рукавомъ.

Пузырному геморою подвергаются большею частію люди престарѣлые, полносочные, съ краснымъ, огненнымъ лицемъ, имѣющіе острую соленую мочу, ведущіе сидячую жизнь, много употребляющіе худо выбродившаго пива, портеру и винъ, и вообще люди, много жертвовавшіе Вакху и Венерѣ или занимавшіеся рукоблудіемъ (онанія), и кои для укрѣпленія расточенныхъ силъ употребляли въ излишествѣ крѣпкіе ликеры, горячащія и мочегонительныя яства и напитки, ваниль, шпанскія мухи и т. п.; также люди обоего пола, къ судорогамъ, истерикѣ и

гипохондріи наклонные, запальчивые и пугливые, у коихъ мочевый пузырь слишкомъ раздраженъ и разслабленъ и кои часто подвергаются простудѣ ногъ и брюха, и наконецъ люди, страдающіе ломотою и каменною болѣзнію.

§ 74.

При *лѣченіи пузырнаго геморроя* со стороны больнаго требуется содержаніе строгой *діеты*. Ему полезна пища легкая, умягчающая, клейкая, маслянистая, молочная, болѣе теплая, нежели холодная; полезны зрѣлой виноградъ и винныя ягоды. Онъ долженъ остерегаться отъ соленой и кислой пищи, копченой и соленой рыбы и таковаго же мяса; не употреблять вина и пива невыбродившаго и избѣгать всего, что причиняетъ раздраженіе и судороги въ мочевомъ пузырѣ и усиливаетъ приливъ соковъ къ оному. Ему надлежитъ также беречься, сколько возможно, отъ любострастныхъ напряженій и отъ сильныхъ потрясеній мочеваго пузыря; не поднимать ничего слишкомъ тяжелаго; остерегаться отъ простуды и особенно держать теплѣе ноги и нижнюю часть брюха; не предаваться гнѣву и избѣгать испугу; имѣть умѣренное тѣлодвиженіе и отнюдь не задерживать мочи.

Со стороны Врача главное дѣло состоитъ въ томъ, чтобъ удостовѣриться о настоящемъ состояніи мочеваго пузыря, стараться отвратить угрожающее воспаленіе, укротить судо-

рожныя движенія и вмѣстѣ съ оными мучительное для больнаго испущеніе мочи, сопровождаемое ломомъ и нудомъ; доставить больному свободное оной испражненіе, очистить мочевый пузырь отъ накопленія и застоя въ ономъ слизи и крови, и наконецъ укрѣпить пузырь въ разслабленномъ состояніи его волоконъ и сосудовъ.

Когда припадки пузырнаго геморроя будутъ воспалительнаго свойства, то въ отвращеніе опасныхъ послѣдствій воспаленія, какъ то: нагноенія или антонова огня, нужно припустить немедленно піявицъ къ заднепроходной промежности, къ пахамъ или надъ самымъ дѣтороднымъ удомъ (волосы на сихъ частяхъ тогда выбривать); когда же больной будетъ крѣпкаго тѣлосложенія и полнокровенъ, то сверхъ того пустить кровь изъ ноги либо изъ руки. Даже и при сильномъ истеченіи крови изъ пузыря кровопусканіе имѣетъ мѣсто, какъ скоро въ мочевомъ пузырѣ подозрѣвается воспаленіе, которое гораздо опаснѣе потери крови. Заднепроходную кишку отъ накопившихся вѣтровъ и сухихъ, острыхъ экскрементовъ очистить посредствомъ легкаго промывательнаго, къ коему въ жестокомъ судорожномъ состояніи и боляхъ въ пузырѣ полезно прибавлять двѣ или три чайныя ложки *масла блекотнаго* (Ol. hyosciami). Когда нужны будутъ слабительныя, то отнюдь не употреблять горячительныхъ, но брать *черносливную воду* и слабительную кашку, *манну*

и масло изъ *сѣмени клещевиннаго* (Oleum ricini) и т. п. Въ пузырномъ геморое съ рѣзью и съ кровью при испущеніи мочи нашелъ я весьма полезнымъ слѣдующее слабительное:

Электуара

Возьми: ~~экстракта~~ *слабительнаго* (Electuarium lenitivum),

сахару, того и другаго по шести драхмъ,

кислоты виннаго камня (Acidum tartaricum) два скрупула,

воды рутной или *тысячелистника* (Aquae rutae grav. vel millefol.) три унціи, смѣшай.

Пріемъ: каждый часъ по столовой ложкѣ.

Больной долженъ пить прохладительный *оржадъ* или сокъ (молоко) изъ сѣмянъ конопляныхъ, огуречныхъ, тыквянныхъ, арбузныхъ, дынныхъ, морковныхъ или маковыхъ, подслащенный сахаромъ или маковымъ сиропомъ, либо сиропомъ изъ желтыхъ кувшинчиковъ (Syrup. nympheae lut.); на бутылку таковаго *оржада* полезно прибавлять одну или двѣ унціи свѣжевыжатаго соку изъ травы *большаго молодила* (Sedi maj.). Весьма полезно также пить слизистые отвары, на пр: изъ *оленьяго рога*, изъ *Аравійской камеди*, изъ корня *желтыхъ кувшинчиковъ* и т. п.

Коль скоро воспаленіе предупредится, но безпрерывный позывъ на мочу съ сильнымъ нудомъ и болью еще остается и будетъ означать судорожное состояніе мочеваго пузыря: то

въ семъ случаѣ полезны: 1) *камфора* — оной примѣшивается отъ 2 до 4 гранъ на одну бутылку *оржада* или соку изъ вышесказанныхъ сѣмянъ (камфора растирается прежде въ двухъ ложкахъ слизи изъ *Аравійской камеди*). Сію смѣсь, подсластивъ сиропомъ, употреблять по чайной чашкѣ черезъ два часа. 2) *Болеутолительный эликсиръ* (Elixir paregoricum) на прим: двѣ чайныя ложки онаго примѣшиваются на одну бутылку вышеозначенной смѣси или даются особо съ *оржадомъ*, капель по шестидесяти на пріемъ, раза четыре въ день. 3) Сѣмя *чародѣйской муки* (Semen lycopodii clavati) дается по одному скрупулу или и болѣе на пріемъ, съ *оржадомъ*, либо въ видѣ кашки съ сиропомъ изъ незрѣлыхъ *маковыхъ головокъ*; многими съ пользою употребляется и выжатый изъ *свѣжей крапивы сокъ*, раза три въ день по одной унціи. 4) Въ замѣнъ прохладительнаго оржада, вмѣсто питья, съ пользою предписать можно крѣпкой чай изъ *тысячелистника* или отваръ изъ листьевъ и сѣмянъ старой *крапивы* съ сиропомъ проскурнячнаго корня. 5) Больной долженъ садиться въ тепловатую обыкновенную ванну или, что еще лучше, на теплые пары изъ отвара мягчительныхъ травъ съ молокомъ. 6) Чаще прикладывать теплыя мягчительныя суконочныя припарки на нижнюю часть брюха и къ заднепроходной промежности. 7) Въ нижнюю часть брюха, въ заднепроходную промежность и въ пояс-

ницу втирать противусудорожную мазь съ *камфорою* и *масломъ* блекотнымъ. 8) Впрыскивать въ пузырь посредствомъ сприца свѣжее непрогорьклое *маковое*, либо свѣжевыжатое *льняное*, чрезъ уголь очищенное, *масло;* къ двумъ столовымъ ложкамъ таковаго масла для впрыскиванія съ великою пользою прибавлять можно полложки *масла блекотнаго*. Масляное впрыскиваніе въ семъ случаѣ укрощаетъ раздраженіе въ мочевомъ пузырѣ и стволѣ, и сверхъ того мочѣ, обыкновенно по каплямъ съ жаромъ и болью истекающей, доставляетъ свободный ходъ. Оно же ощутительно облегчаетъ и наставливаніе катетера при запорѣ мочи.

Кровотеченія изъ мочеваго пузыря рѣдко бываютъ опасны и часто перестаютъ сами собою; для прекращенія оныхъ, сверхъ вышеписаннаго лѣченія, весьма одобряется: 1) *наперстная трава*, 2) *сыворотка*, 3) отваръ изъ *краливы* либо *гулявицы чихотной* или крѣпкой чай изъ *тысячелистника*, *шалфея* и *звѣробойника* (Hypericum perfor), либо изъ *цвѣтовъ змѣевика* (Gnaphalium dioicum) и прочія клейкія питья съ примѣсью *кислыхъ Галлеровыхъ капель;* 4) *скипидарное масло*, въ небольшихъ пріемахъ даваемое, останавливаетъ также кровотеченіе изъ мочевыхъ путей (Pemberton); 5) холодныя примочки изъ воды и уксуса на пузырную часть и на заднепроходную промежность; 6) больной не долженъ употреблять мясной и

горячащей пищи и спиртуозныхъ напитковъ; 7) кровотеченіе изъ мочевыхъ путей, случающееся у стариковъ отъ большой слабости (*атонія*) въ сосудахъ почекъ и мочеваго пузыря и оказавшееся вскорѣ за ослабляющими причинами отъ сильнаго потрясенія тѣла при скорой верьховой или тряской въ экипажѣ ѣздѣ или отъ неумѣреннаго напряженія при совокупленіи съ женщиною и т. п., пріостанавливается обыкновенно умѣренно вяжущими и крѣпительными средствами — настоемъ *шалфея*, *тысячелистника*, *ползучей будры* (Herba glecoma hederacea, herba hederae terrestr.), *толокнянки* (Arb. uvae ursi), *сывороткою съ квасцами*, *хиною съ краснымъ виномъ*. *Гофманъ* совѣтуетъ употреблять отваръ изъ травы *рѣлика* (Decoctum herbae agrimoniae) и *лошакова уха* (Consolidae majoris). 8) Полезна также *крамерія Американская* (§ 72).

§ 75.

Слизь или *мокроты*, накопившіяся въ мочевомъ пузырѣ, изгоняются и причина оныхъ уничтожается нижеслѣдующими средствами, кои, смотря по степени болѣзни и ея сложности, употребляются вмѣстѣ съ поименованными въ вышеприведенныхъ параграфахъ. 1) *Минеральныя воды*, на пр: *Гейлнаерская* (Geilnauer), *Зелцерская*, *Кавказская* и проч. и *желѣзистыя* (Aquae ferratae), на пр: *Липецкія*, *Андреяпольскія* и проч. 2) Средства, угольную кислоту

отдѣляющія, какъ то: *Риверовъ напитокъ*, на пр: возьми двадцать гранъ *очищеннаго поташа* (Subcarbonas potassae), распусти въ половинѣ чайной чашки холодной воды и прибавь одну столовую ложку *лимоннаго соку* или, въ недостаткѣ онаго, ренскаго уксуса; сію смѣсь тотчасъ выпить, прежде нежели кончится шипѣніе, что и повторить раза три или четыре въ день. 3) *Фоглеровъ порошокъ* (Pulvis aërophorus vogleri), на примѣръ:

Возьми: *высушенной соды* (Carbonas sodae) [illegible] драхмы,
чистаго кремортартару шесть драхмъ и *сахару* четыре драхмы, смѣшавъ и истеревъ все въ порошокъ, хранить въ сухомъ мѣстѣ въ склянкѣ крѣпко закупоренной.

Пріемъ: по одной чайной ложкѣ съ двумя столовыми ложками холодной воды, раза два или три въ день или и чаще, смотря по надобности. Порошокъ сей отъ долгаго лежанія сырѣетъ и портится, и потому полезно составлять чаще свѣжій.

Примѣчаніе. Сей порошокъ, сверхъ превосходнаго дѣйствія въ слизистомъ гемороѣ, сильно также гонитъ изъ мочеваго пузыря и изъ почекъ *песокъ* (Gries) и оживляя волокны сихъ органовъ, отвращаетъ зарожденіе въ оныхъ камня. Когда слизистый пузырный геморой зависитъ отъ *уменьшенной раздражительности*

(атонія) волоконъ мочеваго пузыря, то въ такомъ случаѣ и въ другихъ припадкахъ, отъ сего зависящихъ, съ пользою употребляются также 4) листья *толокнянки* (Herba arbatus uvae ursi), 5) корень *плугодержки* (Radix ononidis spinosae vel arvensis), 6) *хвощь* (Herba equiseti arvens.), 7) листья *будры* (Herba hederae terrestr.), на пр: возьми: *листьевъ толокнянки* (Herba uvae ursi) унцію, свари съ десятью унціями воды, давъ укипѣть до 8 унцій, потомъ процѣди; *пріемъ:* каждые два часа по чайной чашкѣ. Точно такимъ же образомъ приготовлять и употреблять и корень *плугодержку*, *хвощь* и листья *будры;* изъ свѣжихъ листьевъ *будры* и *толокнянки* можно выжимать сокъ и съ пользою употреблять по рюмкѣ два раза въ день или и болѣе. 8) *Гарлемскія капли,* 9) *Диппеліево очищенное масло,* 10) горная *нефть* и т. п. также съ великою пользою въ слизистомъ пузырномъ геморроѣ употреблена быть можетъ, и 11) *экстрактъ дымянки* (Extr. fumariae off.) отъ половины до двухъ драхмъ въ видѣ пилюль или микстуры.

§ 76.

Запоръ мочи (Ischuria) случается нерѣдко у людей, подверженныхъ пузырному геморою и составляетъ весьма важный припадокъ. Здѣсь запоръ мочи бываетъ отъ воспалительнаго либо отъ судорожнаго свойства болѣзни, отъ сильнаго прилива крови къ пузырю и варикоз-

наго опуханія венъ около шейки мочеваго пузыря и отъ накопившейся въ пузырѣ слизи и спекшейся крови, засоряющихъ отверстіе пузыря.

Для выпущенія остановившейся мочи имѣемъ мы надежное средство въ наставливаніи *катетера;* случается однакожъ, что не всегда можно произвесть оное въ дѣйство. Нужно остерегаться, чтобы симъ инструментомъ не причинить напраснаго раздраженія и опаснаго разрыва частей въ отверстіи мочеваго пузыря. Я всегда употребляю прежде средства, отвращающія воспаленіе и судороги въ пузырѣ и потомъ уже, когда средства сіи не доставятъ скорой помощи, прибѣгаю къ сему механическому пособію.

О способѣ отвращенія воспалительнаго состоянія болѣзни говорено уже выше (§ 74); въ запорѣ мочи отъ *судорожнаго состоянія* мочеваго пузыря полезны: 1) *клистиръ* изъ *ромашковаго чаю* съ *масломъ блекотнымъ*, а въ недостаткѣ онаго, съ масломъ *деревяннымъ* либо *льнянымъ;* 2) *припарки* на пузырную часть брюха теплыя суконочныя изъ отвара *ромашки*, либо *хмѣлю, божьяго дерева, мяты, колуфера* и т. п. 3) *мазь* для втиранія въ пузырную часть брюха и въ поясницу; она составляется изъ столовой ложки *масла блекотнаго* (либо деревяннаго), изъ двадцати гранъ *камфоры*, изъ двухъ чайныхъ ложекъ *летуча-*

го нашатырнаго спирта и изъ двухъ же чайныхъ ложекъ *горной нефти;* 4) микстура для внутренняго употребленія, признанная полезною въ семъ случаѣ, составляется изъ *горной нефти* и *олійныхъ капель*, того и другаго по полудрахмѣ, изъ *камфоры* отъ трехъ до шести и болѣе гранъ, изъ двухъ столовыхъ ложекъ раствора *Аравійской камеди*, изъ одной столовой ложки *сирола* незрѣлыхъ маковыхъ головокъ и изъ шести унцій отвара проскурнячнаго корня либо *оржада*. *Пріемъ:* по одной столовой ложкѣ черезъ каждые полчаса, пока больной въ состояніи будетъ испускать мочу.

Примѣчаніе. Горная нефть (Oleum petrae, petroleum) извѣстна мнѣ уже болѣе 16 лѣтъ, какъ единственное вѣрное средство отъ запора мочи. Гдѣ никакія внутреннія и наружныя средства въ сей опасной болѣзни не дѣйствовали, гдѣ хотѣли уже приступить къ операціи (прободеніе пузыря), тамъ горная нефть, употребленная внутрь и снаружи, всегда почти навѣрное помогала.

Въ частыхъ возвратахъ запора мочи при варикозномъ опуханіи венъ около шейки мочеваго пузыря полезны средства побуждающія и облегчающія венозное кругообращеніе крови въ брюшной полости и въ особенности въ вратожильной системѣ. Сюда принадлежатъ: *цвѣты сѣрные*, *молоко сѣрное* (Lac sulphuris), *минеральныя воды: Андреяпольская, Зельцерская,*

Гейльнауерская, Карлсбадская и т. п. Къ заднепроходной промежности надлежитъ припускать нѣсколько разъ піявицы.

Въ разслабленіи мочеваго пузыря и недостаточной онаго сжимательности весьма одобряется наливка листьевъ *морошки* (Infusum herbae rubi chamemori); для сего на 10 унцій кипячей воды взять двѣ драхмы сушеныхъ листьевъ *морошки* и дать въ продолженіи четверти часа настояться. Сіе количество выпивается въ два раза поутру и ввечеру.

Затруднительное мочеиспущеніе или *запоръ мочи*, зависящій отъ чрезмѣрнаго накопленія въ пузырѣ запекшейся крови съ слизью, отвращается сильными впрыскиваніями въ пузырь теплой воды посредствомъ катетера. Если сіе не помогаетъ и противусудорожныя и слизь изгоняющія вышеупомянутыя средства остаются безъ дѣйствія, то въ семъ крайнемъ случаѣ, для спасенія жизни больнаго, употребляемо было неоднократное *высасываніе* крови и слизи ртомъ изъ мужескаго дѣтороднаго уда нарочно для сего нанятымъ человѣкомъ (см. Richter's specielle Therapie, Tom. III. pag. 476).

О лѣченіи геморроидальной болѣзни дѣтородныхъ частей.

§ 77.

Геморроидальное *истеченіе крови* изъ *мочеиспускательнаго канала*, сопровождаемое иногда сильнымъ напряженіемъ дѣтороднаго уда и любострастными побужденіями, лѣчится обыкновенно: 1) изобильнымъ питіемъ прохладительнаго *оржада* или соку изъ сѣмянъ *крапивныхъ* и *конопляныхъ*, подслащеннаго маковымъ сиропомъ либо сахаромъ; 2) употребленіемъ слѣдующей микстуры:

Возьми: *камфоры* десять гранъ,
скипидарнаго масла полдрахмы,
оржада или
эмулсіи изъ прохладительныхъ сѣмянъ
или
отвара изъ корня *желтыхъ кувшинчиковъ* (Decoctura rad. nymphae l.) шесть унцій,
сиропу маковаго или
сахару полунціи, смѣшай.

Пріемъ: каждый часъ по столовой ложкѣ. Сей способъ, при надлежащей прохладительной діетѣ и при свободномъ испражненіи низомъ помощію клистира, бываетъ почти всегда достаточенъ. Впрочемъ для прекращенія чрезмѣрно сильнаго кровотеченія изъ мочеиспускательнаго канала (Urethrorrhagia) полезно 3) слѣдующее впрыскиваніе:

Возьми: *скипидарнаго масла* и
Аравійской камеди по одной драхмѣ, теплой воды или лучше отвара изъ корня *Американской крамеріи* шесть унцій, смѣшай.

4) *Рихтеръ* совѣтуетъ дѣтородный удъ и шуляпа больнаго опустить въ холодную воду со льдомъ или вложить въ мочеиспускательный каналъ врачебную свѣчку (бужи) либо эластическій *катетеръ* и снаружи обвить дѣтородный удъ узкимъ бинтомъ для прижатія кровоточащаго сосуда. 5) Во всякомъ случаѣ стараться отвлекать кровь болѣе къ заднему проходу; о семъ сказано будетъ въ слѣдующемъ §.

§ 78.

Варикозное опуханіе или узловатое расширеніе *венъ* предстательной желѣзы и мужескаго мочеиспускательнаго канала (см. § 15), стѣсняющее сей каналъ и задерживающее мочеиспущеніе, отвращается отвлеченіемъ крови и раздраженія отъ предстательной желѣзы къ заднему проходу и къ внѣшнему отверстію мочеиспускательнаго канала: 1) окуриваніемъ задняго прохода теплыми смягчительными парами и частымъ опущеніемъ дѣтороднаго уда въ сосудъ, наполненный теплымъ отваромъ ромашковыхъ цвѣтовъ съ молокомъ; 2) припущеніемъ къ самому проходу и заднепроходной промежности піявицъ и рожечнымъ кровопусканіемъ изъ

внутренней сторны ляшекъ; 3) частымъ втираніемъ въ заднепроходную промежность мази изъ опія, нашатырнаго спирта и камфоры; 4) употребленіемъ внутрь *сѣрныхъ цвѣтовъ* и другихъ средствъ, для лѣченія закрытаго почечуя предписанныхъ; 5) впущеніемъ въ мочеиспускательный каналъ врачебныхъ свѣчекъ, увеличивая оныя отъ времени до времени либо наставливаніемъ катетера, который иногда на долгое время въ мочеиспускательнымъ каналѣ оставляется; сей способъ нужно продолжать по крайней мѣрѣ два мѣсяца. Мнѣ извѣстны впрочемъ случаи, гдѣ врачебныя свѣчки употребляемы были нѣсколько мѣсяцовъ сряду либо вовсе безъ успѣха, либо стѣсненіе мочеиспускательнаго канала отвращали онѣ только на самое короткое время. Въ семъ случаѣ нашелъ я весьма полезнымъ 6) впрыскиваніе въ мочеиспускательный каналъ раствора *сѣрнокислаго цинка* (бѣлаго купороса, sulphas zinci), коего шесть гранъ растворялъ я въ осьми унціяхъ простой перегнанной воды, увеличивая по прошествіи каждыхъ осьми дней количество онаго двумя гранами (свыше 12 гранъ я не употреблялъ). Запущенное опуханіе предстательной желѣзы и стѣсненіе мочеиспускательнаго канала составляетъ всегда важную болѣзнь, отъ коей, какъ изъ опыта извѣстно, нѣсколько людей уже померло. По сей причинѣ одержимые сею болѣзнію, кромѣ надлежащаго лѣченія, должны вести весьма

строгую жизнь, отказаться отъ спиртуозныхъ напитковъ и отъ крѣпкаго пива, содержать себя въ покоѣ, стараться имѣть ежедневное свободное испражненіе низомъ и беречься отъ простуженія ногъ.

§ 79.

Кровотеченія изъ расширенныхъ *варикозныхъ* венъ маточнаго рукава останавливаются: 1) впрыскиваніемъ стягивающихъ средствъ или корпейными свертками намоченными сими же стягивающими средствами — для сего берется *ренсковой уксусъ* съ холодною водою, либо растворъ *сырыхъ квасцовъ* съ чаемъ изъ цвѣтовъ *дикой розы* съ отваромъ *завязнаго корня;* 2) корпейные свертки, симъ растворомъ намоченные, можно обсыпать порошкомъ изъ *сырыхъ квасцовъ* и *Аравійской камеди* по равной части; 3) впрыскиваніе, равно какъ и внутреннія лѣкарства, о коихъ сказано въ § 77, могутъ и здѣсь употреблены быть съ пользою.

Мѣшетчатые и *губчатые наросты* отъ варикознаго расширенія венъ въ маточномъ рукавѣ, бывающіе часто причиною таковыхъ кровотеченій, вырѣзываются также какъ и мѣшетчатыя почечуйныя опухоли.

§ 80.

Варикозное опуханіе венъ въ рукавѣ маточномъ отвращается: 1) внутренними средствами, отъ закрытаго почечуя предписанными; 2) впрыскиваніемъ въ рукавъ матки раствора

сырыхъ квасцовъ и *сѣрнокислаго цинка* (Sulphas zinci) въ водѣ либо въ отварѣ *завязнаго корня* или *дубовой коры;* 3) вложеніемъ въ маточный рукавъ корпейныхъ свертковъ, намоченныхъ въ упомянутомъ растворѣ *квасцовъ* и *сѣрнокислаго цинка* и обсыпанныхъ порошкомъ *Аравійской камеди* и *сырыхъ квасцовъ.* По увѣренію знаменитаго *Рихтера* средства сіи, по немаловременномъ употребленіи, излѣчиваютъ таковыя расширенія венъ совершенно.

Сосудистая опухоль вокругъ отверстія женскаго мочеиспускательнаго канала, описанная въ § 15, лѣчится: 1) перевязываніемъ шелковинкою, 2) вырѣзываніемъ ножницами и 3) прижиганіемъ (D. Clarke); по мнѣнію моему, полезно здѣсь 4) прикладывать свертки корпейные, намоченные въ растворѣ *квасцовъ* и въ послѣдствіи въ растворѣ *сѣрнокислаго цинка*, и 5) употреблять впрыскиваніе изъ сего же раствора.

Лѣченіе *отолстѣнія* и *отвердѣнія клетчатой плевы* во всю длину женскаго мочеиспускательнаго канала, происходящаго отъ расширенія *венъ*, смот. § 15, состоитъ: 1) въ испражненіи крови изъ расширенныхъ венъ посредствомъ ланцета, — отъ сего сосуды и опухоль уменьшаются и теряютъ свой темнокрасный цвѣтъ; 2) въ холодныхъ свинцовыхъ примочкахъ, 3) въ промываніи (проспринцованіи) слабымъ растворомъ *нашатыря* либо *сѣрнокисла-*

го *цинка*, 4) въ припущеніи къ заднему проходу піявицъ, и 5) въ употребленіи внутрь *сѣрнаго млека* или *сѣрныхъ цвѣтовъ* съ *винощелочною солью*, минеральныхъ цѣлительныхъ водъ и въ поддерживаніи оными же свободнаго испражненія низомъ. *Діета* больнаго должна быть таже самая, какая предписана при лѣченіи закрытаго почечуя.

Геморроидальный вередъ въ рукавѣ матки лѣчится: 1) частыми тепловатыми впрыскиваніями въ рукавъ матки молока, вскипяченнаго съ мягчительными травами, съ льнянымъ сѣменемъ и съ винными ягодами, 2) окуриваніемъ женскаго дѣтороднаго уда теплыми парами изъ вышеупомянутыхъ же средствъ, и 3) вскрытіемъ совершенно созрѣвшаго нарыва. Смотри о почечуйномъ вередѣ.

О лѣченіи геморроидальнаго перелоя или триппера (*Blennorrhagia urethralis*).

§ 81.

Геморроидальный перелой или *триппер*ъ состоитъ въ раздраженномъ, судорожномъ и воспаленномъ состояніи слизистой плевы мочеиспускательнаго канала съ истеченіемъ изъ онаго слизи, похожей на матерію, а иногда и крови. Геморроидальнаго свойства болѣзнь сія бываетъ тогда, когда почечуй (въ собственномъ смыслѣ) сопровождаетъ оную и когда *вены* мочеиспус-

кательнаго канала, сверхъестественно расширенныя, образуютъ варикозныя опухоли и испускаютъ изъ себя кровь.

Припадки *геморoидальнаго перелоя* или триппера суть слѣдующіе: моча испускается большею частію по каплямъ, больной чувствуетъ жаръ и рѣзь въ мочеиспускательномъ каналѣ, изъ коего истекаетъ слизь, похожая на матерію, а иногда и кровь, и тупую боль или ломъ, простирающійся по всему мочеиспускательному каналу, т. е., начиная отъ конца дѣтороднаго уда до самаго корня или до задняго прохода; сія боль и ломъ ощущаются иногда и въ ляшкахъ, въ поясницѣ и въ шулятахъ. *Кровь*, истекающая изъ мочеиспускательнаго канала, бываетъ иногда чистая, а иногда смѣшанная съ слизью, подобною матеріи. Сія *слизь* бываетъ весьма похожа на истекающую при *перелоѣ* или *трипперѣ* отъ венерической заразы, т. е., бываетъ цвѣта бѣлаго, желтаго и зеленаго.

Женщины наравнѣ съ мущинами подвержены также *геморoидальному перелою* или *триппер*у. Слизистая плева мочеиспускательнаго женскаго канала и рукава матки бываетъ также въ раздражительномъ, судорожномъ и воспалительномъ состояніи; равнымъ образомъ и въ маточномъ рукавѣ случаются варикозныя опухоли венъ, дѣлающія брачное соитіе затруд-

нительнымъ и даже кровавымъ (*); женщина въ семъ случаѣ страждетъ отъ безпрестаннаго позыва къ испущенію мочи, которая обыкновенно течетъ по каплямъ съ жаромъ и рѣзью; изъ рукава матки истекаетъ слизь, похожая на бѣли и на истеченіе *триппера*, какъ выше о семъ сказано, а иногда и съ кровью (Blennorrhagia vaginalis), при чемъ больная чувствуетъ тупую боль и ломъ въ дѣтородномъ удѣ, а иногда ощущаетъ столь жестокій судорожный нудъ, какъ будто матка ея низдавливается (отъ судорогъ въ маточныхъ связкахъ); боли похожи бываютъ на родовыя потуги. Сей припадокъ называется катарромъ матки и рукава маточнаго.

Впрочемъ *геморoидальнаго перелоя* или *катарра геморoидальнаго* свойства не должно смѣшивать съ слизистыми истеченіями изъ мочеиспускательнаго канала и изъ рукава маточнаго, случающимися отъ другихъ причинъ, на прим: при истеченіи, похожемъ на гной, отъ ломоты, золотухи, каменной болѣзни, отъ употребленія молодаго въ броженіи еще находящагося пива или вина. Произведенныя сими напитками рѣзь, затруднительное испущеніе мочи и истеченіе матеріи узнаются изъ того, когда сей припадокъ скоро проходитъ отъ одного изобильнаго употребленія холодной воды. Исте-

(*) Frank Epit. de cur. hom. morb. Lib. V.

ченіе матеріи *золотушнаго* свойства узнается изъ затвердѣлыхъ желѣзъ, изъ золотушныхъ ранъ и рубцовъ, послѣ таковыхъ ранъ остающихся. Подобное бѣлямъ истеченіе отъ золотухи замѣчено даже у 3 и 4 лѣтнихъ дѣвочекъ. Истеченіе матеріи, зависящее отъ *ломоты*, узнается по особенному сей болѣзни свойству и по опухолямъ и боли въ членосоединеніяхъ ручныхъ и ножныхъ. Истеченіе матеріи отъ *каменной болѣзни* узнается изъ вышесказаннаго же (см. о пузырномъ геморѣ), также изъ предшествовавшей сему истеченію несносной боли въ почкахъ или въ пузырѣ, и изъ того, что матерія истекаетъ здѣсь не такъ какъ въ *трипперѣ*, но въ смѣшеніи съ мочею.

Въ особенности нужно остерегаться, чтобы истеченіе похожей на гной слизи гемороидальнаго свойства изъ мочеиспускательнаго канала и изъ маточнаго рукава не смѣшивать съ *перелоемъ* (*триппероемъ, гонореею*), происшедшимъ отъ *венерическаго* зараженія; ибо гемороидальный *перелой* (*триппер*ъ) припадками своими весьма походитъ на *венерическій*. Гемороидальный узнается изъ присутствія почечуя и изъ періодическаго появленія припадковъ, а венерическій по своему произрожденію, т. е., буде оный окажется вскорѣ послѣ сообщенія съ подозрительною женщиною. Здѣсь можно ошибиться (и сіе дѣйствительно нерѣдко случается) двоякимъ образомъ: либо *гемо-*

роидальный триппер принять за *венерическій*, либо сей послѣдній за припадокъ *почечуя*; прозорливость Врача и строгое изслѣдованіе въ семъ случаѣ необходимы. Извѣстно изъ опытовъ, что многіе волокиты, получившіе *триппер* или *шанкер* отъ венерическаго зараженія, сваливаютъ всю вину на безвинный *геморой*, дабы скрыть отъ Врача свое зараженіе, либо оправдываются мнимою непорочностію и чистотою предмета, ихъ соблазнившаго. А какъ сіе нерѣдко случается, къ несчастію, и у женатыхъ, то можно себѣ представить, какое отъ сего происходитъ зло! Вотъ отъ чего находимъ мы цѣлыя семейства, т. е., мужа, жену и дѣтей, носящихъ въ себѣ гибельную сію отраву! Нещастныя матери семействъ, зараженныя легкомысленными мужьями, почитаютъ *триппер* или *шанкер* по невѣденію за обыкновенныя бѣли и за послѣдствія оныхъ и пагубную сію заразу передаютъ и невиннымъ своимъ дѣтямъ. Ежели вѣрить извѣстному писателю (Sanchez), что венерическая наслѣдственная болѣзнь продолжается до 5го и даже до 6го колѣна и что оная слѣдовательно можетъ открыться даже у правнуковъ, то врядъ ли сіи преступные отцы семействъ избѣгнутъ проклятія невинно страждущихъ жертвъ и за предѣлами гроба!

Лѣченіе *гемороидальнаго триппера* у мущинъ и судорожнаго *нуда* въ маточномъ рукавѣ у женщинъ состоитъ въ слѣдующемъ: 1) ост-

рыя нечистоты, сильно раздражающія заднепроходную кишку, надлежитъ немедленно испразднить посредствомъ легкаго слабительнаго и смягчительнаго (ординарнаго) клистира съ прибавленіемъ къ сему послѣднему половины столовой ложки масла блекотнаго. 2) Больному запретить вовсе спиртуозные напитки и горячащую пищу, особливо съ перцомъ и лукомъ приготовляемую; ему полезны только клейкая, овсяная или ячная кашица съ масломъ, кушанья молочныя и миндальный оржадъ или молоко (эмульсія) изъ *конопляннаго сѣмени*, подслащенныя *сахаромъ* или *сиропомъ* изъ *маковыхъ незрѣлыхъ головокъ*. 3) Больной долженъ употребить теплую ванну, съ ароматическими травами приготовленную, а въ недостаткѣ оной можетъ минутъ на 10 дѣтородный удъ опустить въ большой стаканъ, наполненный теплымъ отваромъ изъ мягчительныхъ средствъ, на прим: цвѣтовъ *ромашки*, листьевъ *просвирокъ* и *льнянаго сѣмени* съ молокомъ; женщины же могутъ окуривать дѣтородныя свои части теплыми парами изъ того же смягчительнаго отвара и чаще покрывать оныя тряпками обмоченными въ *теплое деревянное камфорное масло* или просто нагрѣтыми салфетками. 4) Для прекращенія безпрестаннаго позыва на мочу, рѣзи въ мочеиспускательномъ каналѣ и жестокаго судорожнаго нуда въ рукавѣ маточномъ сверхъ вышесказаннаго весьма полезны: а) *болеутолительный*

эликсиръ (Elixir paregoricum sec. Pharm. Dubl.), коего принимать капель по 60 раза три или четыре въ день въ чайной чашкѣ отвара изъ *рѣпейнаго корня* (Decoct. rad. a. lappae), либо отвара изъ *корня желтыхъ кувшинчиковъ* (Decoct. rad. nympheae lut.), или изъ *корня пырейнаго* (Graminis), либо *миндальнаго оржада*, и b) *камфора* — употребляя оную раза четыре въ день отъ одного до двухъ гранъ на пріемъ въ растворѣ *Аравійской камеди* съ сиропомъ изъ незрѣлыхъ *маковыхъ головокъ*. Для запиванія можно брать крѣпкой чай изъ *маковыхъ же головокъ* или молока изъ *коноплянаго сѣмени*.

Когда гемороидальное слизетеченіе изъ дѣтородныхъ частей сдѣлается продолжительнымъ (хроническимъ), то нужно употреблять внутрь: 5) *сѣрные порошки*, 6) *минеральныя воды*, 7) *сиропъ Лафектеровъ*; 8) снаружи впрыскиваніе *известковой воды* и раствора *сѣрнокислаго цинка* (см. выше) и 9) средства, слизь изъ мочеваго пузыря изгоняющія, см. § 75.

§ 82.

Ранки гемороидальнаго свойства на дѣтородныхъ удахъ обоего пола, похожія иногда на *шанкры* и *ссадины* (Excoriationes), излѣчиваются: 1) содержаніемъ дѣтородныхъ частей во всегдашней чистотѣ; 2) примачиваніемъ *известковою водою*, либо бѣлою свинцовою водою, либо растворомъ *сѣрнокислаго цинка*; 3) при-

кладываніемъ *церата съ каламинарнымъ камнемъ*, либо мази стирачной (Ungv. de styrace); 4) обсыпаніемъ ссадинъ или мѣлкихъ ранокъ *угольнымъ порошкомъ*, буде оныя будутъ вонючи и злокачественны. Сверхъ того при упорности болѣзни полезны 5) для внутренняго употребленія *сѣрные цвѣты, минеральныя воды* и другія средства, жизненную дѣятельность вратожильной системы и сосудовъ дѣтородныхъ частей побуждающія и поправляющія худосочіе, происходящее отъ золотухи, цынги, ломоты и венерической и т. п.

§ 83.

Отъ *вонючаго геморроидальнаго пота* (Sudor haemorrhoidalis) полезны: содержаніе въ чистотѣ и частое обмовеніе дѣтородныхъ частей водою съ мыломъ; частыя обмовенія около прохода и дѣтородныхъ частей отваромъ изъ листьевъ *большаго молодила* (Sempervivum tectorum), также растворомъ очищеннаго *поташа* или *соды* или просто *известковою водою*. Весьма полезно купаться въ морской соленой водѣ и дѣтородныя части чаще держать на открытомъ воздухѣ. Для укрѣпленія ослабшей и отъ того сильно потѣющей кожи дѣтородныхъ частей полезно мыть оныя *отваромъ* изъ *дубовой коры* или изъ *завязнаго корня*, къ коему можно прибавлять немного *уксусу* либо *лавандного спирту* (eau de Lavande).

Когда вонючій гемороидальный потъ и сыпь на дѣтородныхъ частяхъ и около прохода будутъ слѣдствіемъ отложенія остроты изнутри тѣла и сопровождаются лишаемъ, въ такомъ случаѣ полезны: a) теплыя ванны, b) употребленіе внутрь *болиголова* (Conium m.) и *череды* (Bidens tripartita), c) ртутныя и сурьмяныя средства, d) произведеніе гнойнаго источника (*фонтанели*) на одномъ либо на обоихъ бедрахъ.

Объ отвращеніи ночныхъ напряженій мужескаго уда и ночныхъ грезъ (поллюцій) гемороидальнаго свойства.

§ 84.

Ночныя напряженія уда и *поллюціи*, случающіяся большею частію у людей молодыхъ и служащія признакомъ полносочія и крѣпости тѣлесной (Signum salutis), составляютъ также и болѣзненный припадокъ гемороидалистовъ. Дѣтородный удъ у сихъ послѣднихъ бываетъ иногда во всю ночь, пока они спятъ, въ сильномъ напряженіи, а когда проснутся, то оный опять опадаетъ, что случается обыкновенно либо безъ изверженія либо съ изверженіемъ сѣмени, болью сопровождаемымъ; иногда сѣмя истекаетъ по прошествіи нѣкотораго времени послѣ бывшаго напряженія уда, либо само по себѣ либо съ мочею вмѣстѣ. *Поллюціи* случаются большею частію 1) у тѣхъ гемороидалистовъ, кои

частымъ соитіемъ или рукоблудіемъ (онанія) чрезмѣрно раздражили и разслабили дѣтородныя свои части, особенно сѣменохранилища; 2) кои расположили разслабленныя и расширенныя *вены* сѣменныхъ пузырьковъ, предстательной желѣзы, заднепроходной кишки и крестца къ сильному приливу крови и къ воспященному обратному стеченію оной; 3) у коихъ къ ночи въ мочевомъ пузырѣ слишкомъ много накопляется острой мочи, особливо когда притеченіе оной побуждаемо будетъ сильными мочегонными и конфортативными средствами; и 4) когда въ заднепроходной кишкѣ накопится много острыхъ вѣтровъ.

Лѣченіе. 1) Больной долженъ весть порядочную жизнь, избѣгать всего, что горячитъ и что умножаетъ приливъ соковъ къ брюху и къ дѣтороднымъ частямъ, также не употреблять ничего, причиняющаго вѣтры и запоръ низомъ. 2) Не ужинать или по крайней мѣрѣ употреблять въ ужинѣ что нибудь легкое, и то ранѣе обыкновеннаго, дабы не скоро послѣ ужина ложиться въ постель. 3) Не задерживать мочи; особенно, ложась спать, должно заднепроходную кишку и мочевый пузырь очистить испражненіемъ; для промывательнаго въ семъ случаѣ одобряется отваръ изъ корня *бѣлыхъ или желтыхъ кувшинчиковъ* (Dec. r. nympheae). 4) Спать не на перинѣ, но на тюфякѣ, довольно жесткомъ и не слишкомъ тепло кутаться

5) Дѣтородный удъ, задній проходъ и заднепроходную промежность чаще промывать холодною водою съ примѣсью уксуса или и безъ онаго, либо простуженнымъ отваромъ листьевъ *толокнянки* или *брусницы;* многимъ помогало въ семъ случаѣ ежедневное мытіе затылка и всей спины холодною водою со льдомъ. 6) Воздерживаться отъ любострастныхъ вожделѣній. 7) *Камфора* для отвращенія чрезмѣрной чувствительности дѣтородныхъ частей одобряется здѣсь для наружнаго употребленія, на прим: губку, намоченную *камфарнымъ уксусомъ,* прикладывать на ночь къ заднепроходной промежности. 8) Иногда полезно принять на ночь капель 60 *болеутолительнаго эликсира* (Elixir paregoricum) *съ камфорою* въ чайной чашкѣ отвара изъ *желтыхъ кувшинчиковъ.*

Для отвращенія усилившейся чрезмѣру чувствительности и раздражительности дѣтородныхъ частей у людей, занимавшихся рукоблудіемъ и для укрѣпленія сихъ ослабшихъ частей полезны средства, укрѣпляющія мочевой пузырь, какъ то: *листья толокнянки, хвощь, будра, корень плугодержки,* см. § 75. Для наружнаго мытія оныхъ же частей одобряется смѣсь изъ *лавровишневой воды* (Aqua lauro cerasi), изъ *свинцовой Гулардовой воды* и изъ *уксуса,* каждаго по равной части (*Гуфеландъ*); а для внутренняго употребленія *кислыя Галлеровы капли* отъ 10 до 30 капель въ отварѣ

изъ корня и цвѣтовъ *желтыхъ кувшинчиковъ* (Dec. r. nymph) или просто въ водѣ, подслащенной сахаромъ.

Когда варикозныя расширенія *венъ* сѣменныхъ пузырьковъ будутъ причиною ночныхъ *пріапизмовъ* и *поллюцій*, тогда сверхъ вышесказаннаго надлежитъ употреблять и средства, означенныя въ § 78. Благовременное отвращеніе рукоблудія (онаніи или оскверненія), какъ главной причины поллюцій и пагубныхъ отъ оныхъ на всю жизнь послѣдствій, есть одна изъ важнѣйшихъ обязанностей Педагоговъ и надзирателей за благонравіемъ молодыхъ людей. Впрочемъ человѣколюбіе и польза отечества нашего требуютъ, чтобы во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ обращаемо было на предметъ сей гораздо бо́льшее и строжайшее вниманіе, нежели каковое, къ сожалѣнію, доселѣ видимъ. На счетъ укрѣпленія тѣла, разслабленнаго слишкомъ частыми поллюціями, должно здѣсь въ предосторожность сказать, что не прежде надлежитъ давать крѣпительныя лѣкарства и позволять сильно питательную пищу какъ по притупленіи излишней чувствительности и раздражительности дѣтородныхъ частей; безъ сей предосторожности и самыя дѣйствительнѣйшія крѣпительныя средства будутъ болѣе вредны, нежели полезны.

О лѣченіи разрыва губчатыхъ клеточекъ мужескаго дѣтороднаго уда.

§ 85.

Лѣтъ 13 тому назадъ имѣлъ я случай пользовать опухоль и отвердѣніе клетчатой плевы мужескаго дѣтороднаго уда отъ изліянія въ оную венозной крови. Сей припадокъ произошелъ отъ наружнаго насилія, и потому къ почечую вовсе не принадлежитъ; при всемъ томъ помѣщаю я здѣсь описаніе онаго, какъ случай самый рѣдкій и, сколько мнѣ извѣстно, никѣмъ еще доселѣ неописанный. Одинъ молодой человѣкъ, полнокровный и весьма крѣпкаго тѣлосложенія, однимъ утромъ употребилъ насиліе положить въ панталоны сильно напряженный свой удъ; послѣ чего тотчасъ почувствовалъ какъ будто у него что-то хруснуло, безъ малѣйшей однакожъ боли; вскорѣ ощутилъ онъ, что удъ его сдѣлался холоденъ какъ ледъ, безчувственъ, цвѣта темнокрасноватаго и синяго и притомъ распухъ сильно. Я нашелъ сего молодаго человѣка, какъ всякой представить себѣ можетъ, въ крайнемъ безпокойствѣ; ибо онъ воображалъ, что дѣтородный удъ его пораженъ антоновымъ огнемъ (думаю, что здѣсь легко могъ бы ошибиться и Врачь и принять сіе явленіе за настоящую омертвѣлость).

Употребленныя мною въ семъ случаѣ врачебныя средства оказались весьма полезными

и состояли въ слѣдующемъ: къ распухшему, почернѣвшему и холодному какъ ледъ и совершенно безчувственному члену прикладываема была безпрерывно на тряпкахъ подогрѣтая примочка, составленная изъ двухъ фунтовъ крѣпкаго отвара *ароматическихъ травъ* (Decoctura specierum aromaticar.), изъ двухъ унцій *камфарнаго спирту* и осьми унцій примочки для ранъ: (Aqua vulneraria thedeni). На другой день, по употребленіи сего средства, начали показываться на больномъ членѣ красныя полосы, на третій день блѣдножелтыя, а на пятой больной совершенно выздоровѣлъ; въ послѣдствіи жаловался онъ только нѣсколько времени на ночныя поллюціи; теперь онъ женатъ и имѣетъ дѣтей. Сей припадокъ (который въ обыкновенномъ смыслѣ назвать можно переломомъ мужескаго дѣтороднаго уда) состоялъ, вѣроятно, въ разрывѣ губчатыхъ клеточекъ пещеристыхъ тѣлъ дѣтороднаго уда и въ изліяніи венозной крови внѣ ея кругообращенія. Успѣшное же излѣченіе зависѣло отъ немедленнаго употребленія средствъ возбудившихъ всасываніе сосудами крови обратно въ общее кругообращеніе.

О лѣченіи геморoидальной чревной тоски.

§ 86.

Геморoидальная тоска (Anxietas haemorrhoidalis, haemorrhoidalische üble Laune) отъ моральныхъ причинъ нимало не зависитъ, но произ-

раждается въ брюхѣ и есть слѣдствіе непріятнаго впечатлѣнія и сильнаго раздраженія, дѣйствующаго на кровоносные чревные сосуды и на солнечное сплетеніе чревныхъ нервовъ.

Признаки гемороидальной чревной тоски: на лицѣ гемороидалиста, во время пароксизма, замѣтна мрачность и безпокойство; онъ недоволенъ всѣмъ, что для него ни дѣлаютъ; сердится на всѣхъ, особливо на тѣхъ, кои не соглашаются съ его мнѣніемъ и не одобряютъ его причудъ; холоденъ и равнодушенъ ко всему, что въ другихъ возбуждаетъ чувствительность и состраданіе, а иногда напротивъ слишкомъ чувствителенъ, вспыльчивъ, вздоренъ, даже золъ до изступленія безъ всякой почти причины. Въ таковомъ пароксизмѣ находимъ мы нерѣдко людей, вовсе измѣнившихся въ своемъ характерѣ: веселое, кроткое ихъ лице вдругъ дѣлается мрачнымъ и сердитымъ; человѣкъ учтивый, обходительный превращается въ невѣжу и грубіяна, трусъ становится дерзкимъ, отчаяннымъ; умнѣйшій человѣкъ похожъ тогда на глупца; наилучшій Начальникъ дѣлается противу своихъ подчиненныхъ грубъ и несправедливъ, даже и тогда, когда самъ чувствуетъ свою погрѣшность; добрѣйшій и разсудительнѣйшій отецъ семейства становится суровъ и даже жестокъ къ своей женѣ и къ своимъ дѣтямъ и сердится за самую бездѣлицу, а иногда и безъ всякой причины. Сверхъ того гемороидалистъ чув-

ствуетъ въ сіе время великую въ тѣлѣ своемъ лѣность и разслабленіе во всѣхъ членахъ, въ животѣ ощущаетъ нѣкоторое непріятное чувство и сжатіе, либо пученье; въ поясницѣ боль, либо сжатіе; тошнота и отрыжка безъ примѣтнаго засоренія желудка; боль и непріятное чувство изъ живота и поясницы переходитъ напослѣдокъ въ голову; руки какъ будто нѣмѣютъ; больный страдаетъ отъ безсонницы, не смотря на безпрестанную наклонность ко сну и т. д.

Причины гемороидальной тоски суть нижеслѣдующія: 1) гемороидальные запоры низомъ; 2) худое пищевареніе и недѣятельность кишекъ и зависящее отъ того чрезмѣрное отдѣленіе острыхъ и гнилыхъ гасовъ или вѣтровъ, въ кишечномъ каналѣ накопляющихся и задерживаемыхъ; 3) кислоты и слизи въ желудкѣ; 4) излишнее накопленіе венозной или черножелчной крови въ системѣ воротной жилы и пріостановленное кругообращеніе оной, а иногда 5) и задержанное вдругъ почечуйное истеченіе крови; 6) *чрезмѣрно усиленная раздражительность и чувствительность въ кровоносныхъ брюшныхъ сосудахъ* и въ *солнцеобразномъ сплетеніи чревныхъ нервовъ* (Plexus solaris). Сія послѣдняя причина способствуетъ иногда всего болѣе приливу крови и непомѣрному накопленію оной въ чревной полости.

Гемороидальная чревная тоска есть временное болѣзненное состояніе, которое, къ сча-

стію, скоро проходитъ, то есть, какъ скоро выпущены будутъ изъ кишечнаго канала острые гасы или вѣтры и послѣдуетъ свободное и изобильное испражненіе низомъ и мочи; также когда суровая, мрачная и дождливая погода перемѣнится на тихую и ясную. Но когда причины сего припадка продолжаются долго и часто возобновляются, когда тѣлосложеніе больнаго сдѣлается венознымъ, меланхолико-холерическимъ и когда сильныя страсти и печаль будутъ угнетать душу: тогда геморoидальная чревная тоска можетъ перейти въ *ипохондрію.* Женщины подвержены также *геморoидальной тоскѣ*, особенно предъ появленіемъ мѣсячнаго очищенія.

Припадокъ сей мало примѣтенъ и почти безвреденъ у людей благоразумныхъ, умѣющихъ обуздывать свои страсти; но онъ тягостенъ и даже опасенъ, когда случается у людей малодушныхъ, упрямыхъ, у фанатиковъ, невѣждъ, коихъ нерѣдко по ошибкѣ называютъ ипохондриками. Таковые люди въ пароксизмѣ чревной тоски дѣлаютъ много зла.

Изъ вышесказаннаго явствуетъ, что chaise percée (стульчакъ) дѣйствительно бываетъ немалымъ поводомъ къ добру и злу. Анатомистъ *Сидракъ* (см. Romans de Voltaire T. III. 1816) говоритъ: не приближайся къ человѣку, подверженному запору низомъ въ его мрачности (чревной тоскѣ); не безпокой его; ежели онъ вельмо-

жа — берегись обременить прозьбою; освѣдомься прежде у приближеннаго къ нему, былъ ли Его Превосх. нынѣшнее утро на суднѣ (т. е. имѣлъ ли достаточное и легкое испражненіе)? и проч. Совѣтую читателю прочесть о семъ предметѣ сказанное *Волтеромъ*.

Лѣченіе *геморoидальной тоски* состоитъ: 1) въ ежедневномъ свободномъ испражненіи низомъ и мочи и въ устраненіи накопленія вѣтровъ въ кишечномъ каналѣ. Извѣстно, что когда гемороидалиста въ которой либо день не послабитъ низомъ, то онъ измѣняется въ лицѣ, впадаетъ въ тоску и подвергается различнымъ припадкамъ, истерическимъ женщинамъ и ипохондрикамъ свойственнымъ. 2) Въ поддержаніи свободнаго кругообращенія крови въ брюхѣ и въ избѣжаніи всего, что сильно раздражаетъ чревные нервы. 3) Въ утонченіи соковъ и въ уменьшеніи жару въ брюхѣ. Здѣсь полезно обмовеніе брюха холодною водою просто либо съ примѣсью *Кельнской воды* (Eau de Cologne), купанье въ рѣкѣ или сидѣніе минуты съ двѣ въ холодной ваннѣ, буде время года и обстоятельства сіе позволяютъ, и изобильное употребленіе внутрь чистой холодной воды. Извѣстно, что стаканъ свѣжей холодной воды, выпитой съ сахаромъ либо съ вареньемъ (на пр: изъ рябины, клюквы, вишенъ, барбариса и т. п.) немедленно прекращаетъ тоскливое чувство въ брюхѣ и головную боль, которыя часто случаются

у геморoидалистовъ вскорѣ послѣ сытнаго обѣда, послѣ портера, ликеровъ, кофе и т. п. (смот. о пользѣ холодной воды). 4) Полезно употребленіе *винощелочной соли, кремортартара, кислоты виннаго камня* (Acidum tartaricum), растворенныхъ въ большомъ количествѣ воды либо въ легкой настойкѣ *Александрійскаго листа.* 5) Полезна также *сыворотка*, съ *щавелемъ* либо съ *кремортартаромъ* приготовленная. 6) Геморoидалистъ, подверженный сему припадку, не долженъ ужинать; пища его должна быть болѣе растительная, съ умѣренностію употребляемая. Ему нужно оставить сидячую жизнь и не просиживать ночей за картами и болѣе пользоваться прогулкою на открытомъ, свѣжемъ воздухѣ. 7) Ему вредны всѣ горячительныя лѣкарства, какъ на пр: капли и настойки, въ кои входятъ: *сабуръ, теріакъ* и т. п. и всѣ почти средства, на спиртѣ настоенныя. Хотя изъ винъ полезнѣе таковымъ людямъ кислыя, на пр: сотернъ, францвеинъ, веиндеграфъ, барсакъ и т. п., нежели крѣпкія, каковы суть: портвеинъ и мадера, но всего лучше во время сего припадка не пить вовсе винъ; въ особенности вредны имъ ликеры, крѣпкія наливки, кофе и т. п. Наконецъ 8) одержимый чревною тоскою въ пароксизмѣ долженъ самъ избѣгать всѣхъ случаевъ, гдѣ онъ можетъ вредить другимъ и всячески стараться удерживать себя отъ драки, гнѣва, брани, крику, вор-

чанья, ударенія кулакомъ объ столъ и т. п. Все сіе увеличиваетъ болѣзнь, а не облегчаетъ оную.

О распознаваніи и лѣченіи ипохондрико-геморроидалистовъ.

§ 87.

Ипохондрія сопровождается нерѣдко почечуемъ и состоитъ съ нимъ въ тѣсной связи. Ипохондрія во многихъ отношеніяхъ обще съ почечуемъ происходитъ отъ разслабленной дѣятельности нервной системы и особенно отъ чрезмѣрно возвышенной чувствительности солнцеобразнаго сплетенія чревныхъ нервовъ, отъ черножелчнаго или венознаго тѣлосложенія, отъ неумѣренности въ горячащей пищѣ и крѣпкихъ напиткахъ при недостаточномъ употребленіи свѣжей холодной воды, особливо въ жаркое время; отъ сидячей, недѣятельной жизни, сопряженной съ продолжительными размышленіями или умственными напряженіями; отъ разслабленной дѣятельности и отъ заваловъ въ органахъ брюшной полости и пріостановленныхъ въ оныхъ отдѣленій и испражненій соковъ; отъ образующейся въ желудкѣ и кишкахъ кислоты и слизи; отъ медленнаго, непостояннаго обращенія крови въ брюшныхъ внутренностяхъ (а иногда, по мнѣнію моему, и отъ задержаннаго теченія оной изъ воротной жилы къ сердцу), въ особенности же отъ излишняго

накопленія во вратожильной системѣ крови при неумѣренно сильномъ ея обескисленіи (дезоксидаціи). *Боергавъ* находилъ у умершихъ отъ ипохондріи чрезмѣрное расширеніе брюшныхъ венъ.

Признаки ипохондрика - гемороидалиста, сверхъ припадковъ почечуя, суть: примѣтное измѣненіе въ характерѣ, памяти и воображеніи; ипохондрикъ бываетъ то суровъ и печаленъ, то напротивъ чувствителенъ и нѣженъ до малодушія; иногда бездѣлица или самый обыкновенный случай доставляетъ ему несказанное удовольствіе; у него нѣтъ охоты дышать чистымъ, свѣжимъ воздухомъ и любоваться красотами природы; всѣ свѣтскія удовольствія ему противны; малѣйшая перемѣна въ его положеніи для него тягостна; онъ недовѣрчивъ даже къ любимѣйшему своему другу; мрачныя, печальныя размышленія преслѣдуютъ его повсюду и тоскливая заботливость о самомъ себѣ не оставляетъ его ни на минуту; нерѣдко страждетъ онъ отъ тупой головной боли и отъ ужасной тоски, которая всегда начинается отъ брюха (Anxietas abdominalis); нерѣдко при слабыхъ органахъ пищеваренія чувствуетъ колику послѣ объядѣнія; иногда много харкаетъ и извергаетъ рвотою зеленой желчи; боится или лишиться ума или умереть скоропостижно; мучитъ себя мыслію, что его хотятъ околдовать или отравить ядомъ; сонъ его бываетъ почти

всегда безпокойный и прерывается страшными сновидѣніями; онъ бродитъ иногда ночью подобно лунатику, изнемогая подъ тяжестію сихъ мученій, и чувствуя отвращеніе къ жизни, несчастный ищетъ послѣдняго утѣшенія и конца своимъ страданіямъ — въ смерти, которой иногда и предаетъ себя хладнокровно и рѣшительно.

Я пользую теперь одного ипохондрико-гемороидалиста, который въ пароксизмѣ своего припадка чувствуетъ, якобы голова его пуста и такъ легка, какъ будто у него ее вовсе нѣтъ. Онъ смотритъ и ничего не видитъ; задумывается, ни о чемъ не думая; руки и ноги его холодѣютъ и дѣлаются (по словамъ его) такъ легки какъ пухъ, или какъ будто у него ихъ вовсе нѣтъ. Надлежитъ замѣтить, что во время ощущенія таковой неестественной легкости тѣла ипохондрикъ мой всегда чувствуетъ ужасную тоску и страхъ; въ стѣсненной груди его какъ будто что прыгаетъ, сердце его трепещетъ, и онъ утверждаетъ, что иногда изъ внутренности брюха кровь такъ сильно приливаетъ къ сердцу, что сталкиваетъ его почти на половину съ постели. Въ семъ ужасномъ положеніи всякой разъ встревоживаетъ онъ свое семейство, посылаетъ за мною и за другими Врачами и за Священникомъ, исповѣдывается и пріобщается Св. Таинъ. Сіе случается иногда нѣсколько разъ въ мѣсяцъ. Къ счастію,

пароксизмы сіи продолжаются у него только нѣсколько часовъ. Ему становится легче, когда начнетъ онъ чувствовать, что руки и ноги его наливаются кровію и дѣлаются тяжелѣе и когда ощутитъ снова полноту и тяжесть въ поясницѣ. Въ сіе время грудь его облегчается и онъ становится покоенъ, веселъ, чувствуетъ себя укрѣпленнымъ въ силахъ, ходитъ по комнатѣ, а въ хорошую погоду выходитъ на свѣжій воздухъ и прогуливается.

Лѣченіе ипохондрико-геморроидалистовъ.

§ 88.

Все, что служитъ къ отвращенію почечуя у ипохондриковъ, достаточно въ сочиненіи семъ уже изложено. Въ особенности же надлежитъ обратить вниманіе: 1) на перемѣну діеты, а гдѣ можно, и на перемѣну образа жизни вообще; сказанное въ § 86 о геморроидальной чревной тоскѣ относится и сюда. 2) На тѣлодвиженіе, соединенное съ пріятнымъ развлеченіемъ; здѣсь всего полезнѣе путешествіе. 3) На укрощеніе страстей и печали; проникнувъ скрываемую ипохондрикомъ страсть, угнетающую его душу и сдѣлавъ ее гласною стараться довесть больнаго до того, чтобы онъ не только не предавался оной, но старался бы побѣдить ее; словомъ сказать, больнаго нужно привести въ состояніе управлять самимъ собою. 4) На разрѣшеніе чревныхъ заваловъ (§ 61). 5) На разрѣшеніе накопившихся гу-

стыхъ и острыхъ соковъ въ брюшной полости, въ особенности же на поправленіе уклонившихся отъ естественнаго состоянія отправленій печени и воротной жилы. 6) На отвращеніе упорныхъ запоровъ низомъ и накопленій въ кишкахъ кислотъ и острыхъ гасовъ или вѣтровъ, и 7) на исправленіе измѣненной жизненной дѣятельности нервовъ и кровоносныхъ сосудовъ въ брюшной полости. Во всѣхъ вышеописанныхъ случаяхъ (4, 5, 6 и 7) нахожу я въ особенности весьма полезнымъ экстрактъ черной чемерицы (Extr. helleboris nigri) въ соединеніи съ *экстрактомъ колоцинтнымъ сложнымъ* въ видѣ пилюль и капель, см. § 59. Впрочемъ врачебныя средства и психологическія пособія отъ ипохондріи описаны превосходнымъ образомъ на Россійскомъ языкѣ въ сочиненіяхъ Гг. *Энегольма*, *Удена* и *Пекена*.

Особенная польза холодной воды отъ ипохондріи.

Прусскій Хирургъ *Теденъ* въ молодыхъ своихъ лѣтахъ при разныхъ припадкахъ разстроеннаго пищеваренія сильно страдалъ отъ ипохондріи. Сія ужасная болѣзнь на сороковомъ году усилилась въ немъ до того, что онъ нѣсколько разъ покушался на жизнь свою. Наконецъ счастливымъ образомъ вылѣчился онъ чистою ключевою холодною водою, которую пилъ въ большомъ количествѣ, и именно, отъ 24 до 30 фун-

товъ въ сутки съ примѣсью вина. Помощію сего простаго средства прожилъ онъ еще сорокъ лѣтъ, будучи всегда совершенно здоровъ и веселъ.

Сей примѣръ убѣждаетъ и меня предложить сіе средство ипохондрико - гемороидалистамъ, особенно тѣмъ, кои горячащею пищею, кофеемъ, портеромъ и другими крѣпкими напитками испортили свой желудокъ и кишки, утратили душевную ясность и спокойствіе и сдѣлались скучны, брюзгливы и подверглись чревной тоскѣ. Сюда относится частое обмываніе холодною водою головы, хребта, брюха; купанье въ рѣкѣ и употребленіе холодной воды внутрь.

Опытомъ дознано, что несчастные, удрученные ипохондріею и меланхоліею, имѣютъ сильное влеченіе къ водѣ; нѣкоторое внутреннее чувство говоритъ имъ, что они найдутъ въ сей стихіи облегченіе и помощь, которую иногда и дѣйствительно обрѣтаютъ. Многіе изъ сихъ несчастныхъ утопляютъ себя въ водѣ — безъ сомнѣнія, нестолько съ намѣреніемъ прекратить жизнь свою, сколько по влеченію нѣкоего внутренняго чувства, побуждающаго ихъ искать въ водѣ единственнаго спасенія отъ ужасной тоски, помрачающей ихъ разумъ. Извѣстно, что одинъ изъ таковыхъ несчастныхъ ипохондриковъ признавался *Гуфеланду*, что яко бы непреоборимое внутреннее влеченіе заставляло его нѣсколько разъ въ ночное время бѣжать къ рѣ-

кѣ и въ ней искать спасенія отъ ужаснѣйшей тоски, которое онъ дѣйствительно всякой разъ, погрузившись въ воду, и находилъ, т. е., тотчасъ приходилъ въ себя, дружился опять съ жизнію и успокоенный возвращался въ свой домъ.

Холодная вода весьма полезна и отъ сильнаго *біенія* или *трепетанія сердца*, которое случается иногда у ипохондриковъ слабаго, слишкомъ раздражительнаго тѣлосложенія. Припадокъ сей усиливается при послѣобѣденномъ отдохновеніи и въ ночи предъ засыпаніемъ; проходитъ же, когда больной уснетъ, и по пробужденіи уже вовсе его не бываетъ. Въ началѣ припадка сего рода, органическаго поврежденія въ самомъ сердцѣ не бываетъ и потому дыханіе свободно и пульсъ не перемѣжается, но когда припадокъ сей, сильной страхъ и безпокойствіе больному причиняющій, слишкомъ долго продолжится, тогда становится опаснымъ и кончится обыкновенно аневризмою или другими органическими поврежденіями въ сердцѣ. *Конради* почитаетъ холодную воду къ совершенному излѣченію сего нервическаго припадка за надежнѣйшее и почти за единственное средство; предъ тѣмъ, какъ ложиться спать, больной наклоняется грудью надъ большою чашею съ холодною свѣжею водою, и тряпку (компрессъ), намоченную въ оной, безпрестанно прикладываетъ къ лѣвой груди; сіе повторяется до 30 или 40 разъ въ теченіи 3 или 4 минутъ или пока

холодъ воды сдѣлается неощутителенъ, потомъ грудь обтираетъ досуха. Таковое примачиваніе надлежитъ продолжать долгое время; разумѣется, что примачиваніе не дѣлается, когда тѣло въ поту; для сего совѣтуется брюхо и грудь прохладить прежде обтираніемъ холодными полотенцами. Впрочемъ сухой жаръ въ тѣлѣ и волненіе крови таковому примачиванію не препятствуютъ.

Объ отвращеніи накопленія вѣтровъ въ кишечномъ каналѣ.

§ 89.

Для отвращенія чрезмѣрнаго накопленія вѣтровъ и зависящихъ отъ сего припадковъ, описанныхъ въ § 25, нужно: 1) пользоваться тѣлодвиженіемъ; 2) не употреблять пищи и питья, вѣтры причиняющихъ; 3) укрѣплять желудокъ и возбуждать *тонъ* въ кишечномъ каналѣ, ибо главною причиною чрезмѣрнаго накопленія вѣтровъ есть разслабленіе и недостатокъ *тона* въ желудкѣ и кишкахъ; 4) укрощать судорожное движеніе въ кишкахъ; 5) поддерживать ежедневное свободное испражненіе низомъ, и 6) оставлять привычку безпрестанно рыгать и испущать вѣтры.

Къ пищѣ, вѣтры причиняющей, принадлежитъ: горохъ, бобы, стручки, капуста, рѣпа, брюква и разные плоды, особливо недозрѣвшіе; мучная и жирная пища, молодое невыбродив-

шее пиво, кислыя щи, сыръ, копченое мясо и рыба и т. п. Не льзя однакожъ не замѣтить, что вредъ отъ упомянутыхъ и другихъ разныхъ вещей зависитъ болѣе отъ степени испорченности желудка, ослабленія тона въ кишечномъ каналѣ и отъ измѣненія желчи и соковъ желудочнаго и кишечнаго. Здѣсь должно искать причины, отъ чего иногда одна и та же самая пища у одного человѣка пучитъ брюхо, то есть, производитъ вѣтры, кислоты и слизь, причиняющія разные припадки, а для другаго маловредна, либо и совсѣмъ безвредна. И потому въ семъ случаѣ надлежитъ совѣтоваться болѣе всего съ самимъ желудкомъ и съ привычкою; у кого какая пища скорѣе производитъ вѣтры и кислоты, таковой и избѣгать слѣдуетъ.

Что касается до возбужденія *тона* въ кишечномъ каналѣ врачебными средствами, то здѣсь всегда должно сообразоваться съ тѣлосложеніемъ и степенью разстройства пищеварительныхъ органовъ, ибо у однихъ желудокъ бываетъ разслабленъ при недостаточной чувствительности и раздражительности (Torp de Schwäche), а у другихъ разслабленіе желудка сопровождается напротивъ болѣзненно-возвышенною раздражительностію и чувствительностію (Irritable Schwäche). Какъ въ первомъ случаѣ крѣпительныя средства, горячащая пища и хорошее вино и водка совершенно безвредны, такъ въ послѣднемъ приличны только легкія и по-

степенно усиливаемыя побужденія, средства негорячащія, противусудорожныя умягчающія, успокоивающія и не слишкомъ питательныя. Впрочемъ въ обоихъ случаяхъ при употребленіи средствъ, возбуждающихъ *тонъ* въ кишкахъ, надлежитъ остерегаться, чтобъ оныя не причиняли запора на низъ. Многіе избавились отъ вѣтровъ и укрѣпили разслабленный свой желудокъ тѣмъ, что вмѣсто обыкновеннаго ослабляющаго теплаго чаю по утрамъ и вечерамъ пили холодную наливку или чай изъ ароматическихъ травъ, какъ то: *мяты, шалфея, Римской ромашки, руты, померанцовыхъ листьевъ, водянаго трилистника, иссопа, тысячелистника* и т. п., прибавляя на стаканъ таковой настойки по 20 капель *Гофманскихъ* или по 8 *эссенціи перечной мяты* или двѣ столовыя ложки хорошаго вина. Иные пили просто чистую холодную воду, либо прибавляли на каждый стаканъ капли четыре *мятнаго* или *сассафраснаго* или *ромашковаго* или *рутнаго* масла съ кускомъ сахара. *Пріятны* и *полезны* капли, извѣстныя подъ названіемъ: *Гофмановъ жизненный бальсамъ* (Balsamus vitae Hoffmanni), коихъ принимать можно на сахарѣ отъ 15 до 20 капель раза три или четыре въ день.

Для возбужденія *тона* въ желудкѣ и кишкахъ весьма также полезны: *экстракты ромашковый* и *квассіи*, растворенные въ холодной настойкѣ *ромашковыхъ цвѣтовъ* или свѣжихъ

зеленыхъ *померанцовыхъ листьевъ съ эфиромъ селитрянымъ* (Aether nitricus), на примѣръ:

Возьми: *экстракта ромашковаго,*
экстракта квассіи, каждаго по одной драхмѣ, раствори въ одномъ фунтѣ крѣпкаго чаю или настойки изъ *Римской ромашки* или изъ свѣжихъ *померанцовыхъ листьевъ;* къ сему прибавь
эфира селитрянаго (Aether nitricus) одну драхму, смѣшай.

Пріемъ: все сіе количество употребить въ теченіи дня въ четыре пріема.

Полезны *померанцовыя, калганныя, полынныя* и *ирныя капли*, горькіе желудочные *эликсиры,* какъ то: *Гофмановъ* и *Клейна; квассія* въ видѣ настойки съ виномъ либо съ водою; чай изъ *ромашковаго сложнаго сбора*, смотри новую Фармакопею Г. *Вилліе* часть 2, стр. 236; *имбирная вода; эссенція галбанная съ мятною эссенціею* капель по 20 на пріемъ; *мятныя лепешечки* (Rotulae) и мыльныя горькія ароматическія и камедистыя средства и *бычачья желчь,* выше сего для разрѣшенія чревныхъ заваловъ и побужденія геморроя предложенныя.

Англичанинъ *Робертъ Виттъ* долгое время страдалъ отъ вѣтровъ и совершенно избавился отъ сего несноснаго припадка единственно горькими каплями собственнаго изобрѣтенія, извѣст-

ными подъ именемъ (Elixir vel tinctura roborans Whytti). Онъ принималъ сихъ капель по столовой ложкѣ въ четырехъ таковыхъ же ложкахъ воды ежедневно два раза и продолжалъ сіе нѣсколько мѣсяцовъ сряду.

Капли отъ вѣтровъ.
(Essentia carminativa).

Возьми: *корня гравилатника* (Rad. gei urbani) мѣлко изрѣзаннаго одну унцію,
мушкатнаго цвѣта (macis),
мѣлкаго кардамона, каждаго по три драхмы,
желтой померанцовой корки, мѣлко изрѣзанной,
Римской ромашки, каждаго по 6 драхмъ,
сгущеннаго сока сабура истолченнаго, полдрахмы, смѣшай.

На половинное изъ сего количества налить пеннику или слабаго виннаго спирта одну бутылку и дать стоять на солнцѣ или на теплой печи недѣлю, потомъ процѣдить, выжавъ гущу. Принимать послѣ обѣда и послѣ ужина по половинѣ небольшой рюмки въ мятной водѣ либо въ винѣ.

Сборъ или специи для настойки вина, дающаго тонъ кишечному каналу.

Возьми: *травы мари Мексиканской благовонной* (Chenopodium ambrosioides),
полыни,
мяты,

душицы обыкновенной (Herba origani vulgaris),

ромашки, каждаго по горсти, изрѣжъ и смѣшай.

Брать полную горсть сихъ специй на графинъ пенника или простаго хлѣбнаго вина, дать постоять въ тепломъ мѣстѣ дня три, потомъ процѣдить и употреблять по рюмкѣ вмѣсто водки.

Когда кислоты въ желудкѣ умножаютъ отдѣленіе вѣтровъ и причиняютъ кислыя отрыжки, колику и другіе разные припадки, геморроидалистамъ и ипохондрикамъ свойственные, тогда полезны: *магнезія* сама по себѣ либо съ ревенемъ, каждаго по чайной ложкѣ, въ рюмкѣ мятной воды; *древесный уголь*, по дессертной ложкѣ поутру и на ночь; *растворъ углекислаго поташа, известковая вода*. Особенно полезны въ семъ случаѣ слѣдующія *пилюли:*

Возьми: *бычачьей желчи* свѣжесгущенной,

экстракта померанцовой корки,

экстракта квассіи, каждаго по полуторы драхмы,

вонючей камеди (Gummiresinae asae foetit.) одну драхму,

сгущеннаго сока сабура полдрахмы,

мыла Венеціанскаго двѣ драхмы, смѣшай, сдѣлай *пилюли* каждую въ два грана и обсыпь жженою магнезіею. *Пріемъ:* восемь пилюль поутру и столько же, буде нужно, ввечеру.

Для отвращенія возврата разныхъ припадковъ отъ кислотъ полезно, кромѣ сихъ *пилюль*, давать больному дней десять сряду слѣдующія *пилюли*:

Возьми: *углекислой очищенной соды* (Subcarbonas sodae),
древеснаго угля,
экстракта генціаны, каждаго по одной драхмѣ, смѣшай и прибавь, сколько нужно *экстракта ревеннаго*, сдѣлай *пилюли* каждую вѣсомъ въ два грана.

Пріемъ: поутру и ввечеру по 4 пилюли и болѣе.

Сверхъ вышеупомянутыхъ средствъ къ поправленію испорченнаго *тона* въ желудкѣ и кишкахъ потребна со стороны больнаго строгая воздержность въ пищѣ и питіи и правильный образъ жизни, сколько можно болѣе близкій къ природѣ. *Гуфеландъ* замѣчаетъ, что основаніе для испорченности желудка полагается большею частію при первоначальномъ воспитаніи дѣтей. Сей знаменитый Врачь вовсе не одобряетъ нынѣшняго воспитанія дѣтей на винѣ, портерѣ и на излишнесочной и горячащей пищѣ. Поелику у людей, пріученныхъ къ сему съ малолѣтства, чувствительность въ системахъ организма, особливо пищеваритель ныхъ органовъ, слишкомъ возбуждается, дѣтородныя части прежде времени развиваются, кровоносные сосуды сильно раздражаются, приводятъ кровь въ вол-

неніе и напираютъ ее къ головѣ и брюху. Слѣдствіемъ сего преждевременнаго и безпрерывнаго питанія и разгоряченія бываетъ, что жизненная сила въ органахъ скоро истощается, желудокъ слабѣетъ и кишечный каналъ теряетъ естественный свой *тонъ*. Отъ сего вода дѣлается тяжелою для желудка; молоко, шпинатъ, капуста и другая невинная зелень производятъ тошноту и колики — отъ неваренія пищи. Дѣятельность въ нервахъ измѣняется и *валеры*, вѣтры, почечуй, завалы, ипохондрія, меланхолія, истерика и чахлость скоро даютъ почувствовать, что при первоначальномъ воспитаніи отступлено было отъ законовъ природы.

Вотъ что на счетъ вина говорили мудрые наши предки: „вино да укрѣпляетъ мужа и да оживляетъ старца; пусть согрѣваетъ оно *ослабшаго въ жестокую зиму* и въ сырое время и пусть усиливаетъ естественную теплоту, какъ лѣкарство! — но благодѣтельный напитокъ сей да не превратится преждевременнымъ и неумѣреннымъ употребленіемъ въ ядъ!“

§ 90.

Сколько испущеніе вѣтровъ во время колики бываетъ полезно, столько напротивъ надлежитъ остерегаться сдѣлать привычку безпрестанно рыгать и испущать вѣтры. Къ сему пороку, крайне предосудительному и вредному для здоровья, человѣкъ дѣйствительно легко

можетъ привыкнуть и самопроизвольно сдѣлаться жертвою многоразличныхъ недуговъ. Одинъ Англинскій Докторъ сказалъ, что чѣмъ чаще кто рыгаетъ и испущаетъ вѣтры, тѣмъ болѣе въ желудкѣ у него дѣлается броженія, т. е., тѣмъ болѣе отдѣляется отъ принятой имъ пищи гасовъ, подобно какъ молодое вино въ бутылкѣ, часто откупориваемой, сильнѣе бродитъ. Пища, вѣтры производящая, въ желудкѣ, симъ образомъ испорченномъ, отдѣляетъ невѣроятное множество гасовъ. *Д. Галесъ* полагаетъ, что одно яблоко при броженіи своемъ въ желудкѣ даетъ упругаго гаса въ 600 кратъ болѣе, нежели сколько оно само занимаетъ мѣста. Послѣ сего можно себѣ представить, какому мученію подвергаетъ себя сдѣлавшій таковую привычку при первой невозможности испустить спершіеся въ кишечномъ каналѣ вѣтры.

О лѣченіи колики отъ вѣтровъ.

§ 91.

Колика есть обыкновенное слѣдствіе излишняго накопленія вѣтровъ въ желудкѣ и кишкахъ. Припадки ея суть слѣдующіе: сильная судорожная боль въ брюхѣ, съ одного мѣста на другое переходящая, таковая же боль въ груди, переходящая, также какъ и въ брюхѣ, съ одного мѣста на другое; надутость и напряженность брюха съ ощущеніемъ снаружи неровностей или желваковъ; сильное ворчаніе въ брюхѣ, безпре-

станный и большею частію напрасный позывъ къ испущенію вѣтровъ (когда же больному удастся хотя нѣсколько оныхъ выпустить, то чувствуетъ немедленно облегченіе), пульсъ малый и судорожный; больной бываетъ унылъ и тоскливъ, на лицѣ его примѣтны судорожныя движенія; икота и втягиваніе шулятъ подъ самый животъ подтверждаютъ также судорожное состояніе болѣзни.

Болѣзнь сія лѣчится: 1) средствами мягчительными, 2) противусудорожными, то есть, судорожныя сжатія ослабляющими, и 3) *тонъ* въ кишкахъ побуждающими. Для сего надлежитъ руководствоваться сказаннымъ въ § 70 и употреблять тамъ же предписанныя теплыя припарки на брюхо, втираніе болеутолительной мази и микстуру изъ древеснаго угля. Въ коликѣ при судорожномъ состояніи и разслабленіи (атоніи) въ кишечномъ каналѣ съ успѣхомъ употребляются противусудорожныя капли изъ *бобровой струи* и *вонючей камеди* (см. § 46) и капли отъ вѣтровъ (§ 89) съ чаемъ изъ *ромашки* или тысячелистника. Я испыталъ много разъ надъ собою и надъ другими больными, что *Кельнская вода* (eau de Cologne), капель по 60 и болѣе на сахарѣ съ холодною водою либо съ чаемъ изъ мяты или ромашки принятая, тотчасъ унимаетъ жестокую колику и отвращаетъ тошноту и круженіе головы, отъ неваренія пищи зависящія. Воду сію весьма полезно при ко-

ликѣ втирать въ брюхо. *Клистиръ* въ коликѣ есть главное средство; послѣ ординарнаго клистира (см. объ отвращеніи запора) съ пользою предписываю я въ семъ случаѣ *клистиръ* изъ осьми унцій *отвара древеснаго угля,* изъ трехъ чайныхъ ложекъ *болеутолительнаго эликсира* (Elix. paregoric.) и одной столовой ложки *деревяннаго масла.* Въ упорной и жестокой коликѣ весьма хорошо дѣйствуетъ клистиръ изъ вонючей камеди (Gummires. asae foet.). Нечистоты, умножающія отдѣленіе вѣтровъ, надлежитъ испразднить (по унятіи судорожной боли) легкимъ слабительнымъ, на пр: изъ *магнезіи, угля, кремортартару* и изъ водянистой настойки *колытчатаго ревеня.*

И. Д. *Брандисъ* опытомъ удостовѣрился, что въ сей болѣзни весьма полезно употребленіе внутрь большаго количества холодной воды, наставливаніе клистира изъ холодной же воды и треніе брюха льдомъ или прикладываніе холодныхъ къ брюху примочекъ. По увѣренію его, средство сіе въ сильной боли, вѣтрами причиненной, дѣйствовало скорѣе и вѣрнѣе, нежели *олій.* *Лефлеръ* съ большимъ успѣхомъ употреблялъ внутрь ледъ въ корчевыхъ припадкахъ отъ глистовъ и въ желудочныхъ судорогахъ; онъ давалъ по одной льдяной пилюлѣ (кусочки льда величиною съ горошину) черезъ каждыя пять минутъ, пока оказывали ожидаемое отъ

нихъ дѣйствіе. Пилюли сіи можно употреблять и въ коликѣ отъ вѣтровъ.

Впрочемъ бываютъ случаи, гдѣ спершіеся въ великомъ множествѣ вѣтры раздуваютъ брюхо неимовѣрнымъ образомъ и гдѣ никакое врачебное средство не можетъ отвратить смертельной опасности. Въ семъ необыкновенномъ случаѣ предлагается: гасы изъ толстыхъ кишекъ выпустить сквозь трубку, вставленную въ проходъ или выпомповать посредствомъ обыкновеннаго клистирнаго сприца. Для сего Докторъ *Тиловъ* (Thilow) изобрѣлъ особый насосецъ, коего рисунокъ вмѣстѣ съ описаніемъ помѣщенъ въ Гуфеландовомъ Журналѣ (*).

Къ отвращенію частыхъ возвратовъ колики нужно иногда бываетъ продолжительное употребленіе средствъ, побуждающихъ *тонъ* въ кишечномъ каналѣ (§ 89); впрочемъ въ отношеніи къ геморoидалистамъ нужно имѣть при употребленіи оныхъ осторожность, поелику при почечуѣ, при полносочіи въ брюхѣ и при наклонности геморoидальныхъ сосудовъ къ воспаленію средства сіи будутъ горячить и ожесточать почечуйные припадки.

(*) Hufeland's Journal der Prakt. Heilkunde 9 B. 2 St.

О распознаванiи и лѣченiи геморoидальной сухотки.

§ 92.

Геморoидальною сухоткою (Tabes, phthisis haemorrhoidalis) называется такое состоянiе геморoидалиста, въ которомъ тѣло его медленно истощевается какъ въ силахъ, такъ и въ своей объятности, то есть, когда жиръ въ тѣлѣ исчезаетъ, кожа становится блѣдною и морщиноватою; когда замѣчаются по временамъ признаки изнурительной лихорадки и ощущаются частыя боли въ кишкахъ и разные желудочные припадки. Всѣ вышесказанныя явленiя у человѣка сухотнаго сопровождаются измѣненною дѣятельностiю какъ въ сосудахъ пасочной системы (особливо млечныхъ, vasa lactea), такъ и въ нервахъ и кровоносныхъ жилахъ, особенно чрезмѣрною чувствительностiю въ сихъ двухъ послѣднихъ, и напослѣдокъ ненадлежащимъ приготовленiемъ крови изъ питательнаго сока (chylus) и недостаточнымъ вознагражденiемъ тѣла. У сухотнаго больнаго примѣтны также разстроенное отправленiе въ печени, боль, завалы и затвердѣлость въ печени, селезенкѣ, брыжейкѣ и грудные припадки, какъ то: одышка, сухой кашель, отвращающiй нѣкоторую полноту, ощущаемую въ груди, а иногда кашель съ сильнымъ изверженiемъ слизистыхъ мокротъ либо съ кровiю. Сонъ больнаго бываетъ безпокойный и онъ нерѣдко просыпается отъ поллюцiй.

Сухоткѣ подвергаются большею частію геморoидалисты нѣжнаго, слишкомъ раздражительнаго тѣлосложенія, кои слишкомъ истощились отъ чрезмѣрнаго почечуйнаго истеченія крови, отъ невоздержной жизни, отъ необыкновенныхъ изнурительныхъ напряженій душевныхъ и тѣлесныхъ силъ и отъ продолжительныхъ тѣлесныхъ или душевныхъ болѣзней, особливо же чрезъ рукоблудіе и распутную жизнь въ молодыхъ лѣтахъ. Многіе чахнутъ отъ неумѣреннаго употребленія *ртутныхъ* средствъ, отъ сильныхъ страстей и угнетающей нужды и бѣдности, отъ глистовъ, гнѣздящихся въ кишечномъ каналѣ, см. ниже § 95.

Лѣченіе геморoидальной сухотки. 1) Сильное почечуйное истеченіе крови, изнуряющее тѣло, надлежитъ остановить немедленно, дѣйствуя не на одну только заднепроходную кишку, но вмѣстѣ и на всю кровоносную систему; 2) организмъ, разслабленный чрезмѣрною потерею крови, укрѣпить способомъ, показаннымъ въ § 48; 3) завалы чревныхъ внутренностей (Infaretus, obstructiones viscer. abdom.) разрѣшить (§ 61); 4) чрезмѣрную раздражительность и чувствительность, равно и притупленіе въ организмѣ отвратить. Для сего сверхъ средствъ, показанныхъ въ семъ сочиненіи, нужно больному заблаговременно перемѣнить образъ жизни и самый климатъ, буде онъ вредное имѣетъ вліяніе, на примѣръ: высокія гористыя мѣста, чрезмѣрно уве-

личивающія возвышенную раздражительность и чувствительность организма и тѣмъ усугубляющія сухотку, слѣдуетъ перемѣнить на низменныя, гдѣ атмосфера не слишкомъ много содержитъ въ себѣ кислотвора и нѣсколько влажна. Противное сему совѣтуется, когда *чахлость* или *сухотка* сопровождается совершеннымъ разслабленіемъ и притупленіемъ чувствительности и раздражительности въ организмѣ отъ сырой, холодной и недостаточно окислотворенной атмосферы. Сухотному человѣку нуженъ покой какъ тѣлесный, такъ и душевный. Онъ отнюдь не долженъ сидѣть за полночь, на пр: за картами, либо слишкомъ долго заниматься чтеніемъ или другими дѣлами, какъ бы оныя пріятны ни были и хотя бы больный чувствовалъ въ себѣ довольно силъ. Ему не безполезно спать и послѣ обѣда, только не въ перинѣ, но на тюфякѣ. Ему вредно питать любострастныя вожделѣнія и долгъ его есть стараться какъ можно рѣже удовлетворять онымъ; ибо побужденіе раждается здѣсь не отъ избытка сѣмени и силъ (Signum salutis), но отъ болѣзненно-возвышенной чувствительности въ дѣтородныхъ частяхъ. Особенно долженъ онъ воздерживаться отъ гнуснаго и пагубнаго рукоблудія (onania). Тѣлодвиженіе изнуренному и сухотному человѣку полезно только самое умѣренное, безъ усталости и излишняго напряженія силъ, на открытомъ воздухѣ, въ одѣяніи,

приличномъ времени года и погодѣ. Послѣ обѣда и ужина надлежитъ ему держать себя въ покоѣ и не углубляться въ размышленіе, дабы пища долѣе оставалась въ желудкѣ и нервная сила онаго могла безпрепятственно производить пищевареніе.

Можно принять за правило, что сухотному человѣку, отъ какой бы причины болѣзнь сія не происходила, не льзя вылѣчиться безъ пищи, сильно питающей и силы тѣлеснаго вознагражденія побуждающей. Льзя ли безъ сожалѣнія смотрѣть на больныхъ, осужденныхъ при совершенномъ изнуреніи и истощеніи тѣла пить только козье молоко и употреблять самую скудную, малопитательную пищу, вовсе противную врачеванію сей важной болѣзни? Сухотному полезны: яйцо въ смятку, яичный желтокъ съ сахаромъ на коричневой, розовой, померанцовой или другой какой ароматной водѣ, овсяная или ячная слизь, манная и перловая крупа, саго, сарачинское пшено, крѣпкой мясной бульонъ съ салепомъ (*), крѣпкая питательная уха изъ чешуйчатой рыбы, особливо изъ ершей, приготов-

(*) *Салепъ* или порошокъ изъ корня *кокушкиныхъ слезъ* составляетъ наилучшую для изнуренныхъ людей питательную и пріятную пищу. Симъ порошкомъ можно приправлять и всякую похлебку вмѣсто муки и крупы; изъ него можно также варить шоколатъ, о чемъ сказано будетъ ниже.

ленная на крѣпкомъ мясномъ или салепномъ бульонѣ безъ кислоты; супъ изъ горькаго питательнаго некислаго пива съ яичнымъ желткомъ, сахаромъ и корицею; разныя желе на винѣ и безъ онаго, студень изъ телячьихъ или бычачьихъ ногъ; саламата изъ ржаной муки, кисель изъ ячной муки. Г. *Тиленій* въ особенности одобряетъ, даже въ сильнѣйшей степени сухотки, вываренный изъ самой мѣлкой ячной муки крахмалъ съ козьимъ или коровьимъ молокомъ въ видѣ саламаты или каши (Hordeum praeparatum tilenii). Съ пользою употребляется также *Имзена* шоколатный порошокъ отъ чахотки, сухотки и всякаго рода разслабленій (Pulvis prophylacticus Imseni contra phthisim, hecticam et atoniam universalem).

Подобный сему весьма питательный и вкусный порошокъ для сухотныхъ и изнуренныхъ людей составляю я слѣдующимъ образомъ:

Возьми: истертаго въ мѣлкой порошокъ
Исландскаго моху,
обыкновеннаго шоколата, того и другаго по двѣ столовыя ложки,
салепу мѣлко въ порошокъ истертаго, половину столовой ложки, смѣшай.

Пріемъ: три чайныя ложки сего порошка варить съ двумя чайными чашками молока либо воды, какъ обыкновенно варится шоколатъ, и

употреблять вмѣсто завтрака, а иногда и къ ночи вмѣсто ужина.

Для возбужденія желудка полезно горькое питательное *пиво* и хорошее *вино*. Извѣстно, что старой Англинскій портеръ сильно питаетъ и возбуждаетъ желудокъ и при пищѣ, состоящей изъ яицъ, *салепа*, бифстекса и при покойной и воздержной жизни составляетъ превосходнѣйшее средство, дающее тѣлу крѣпость и полноту. Портеръ можетъ замѣнить всякое вино. Впрочемъ сухотный и изнуренный геморoидалистъ долженъ употреблять оный, равно какъ и другіе крѣпкіе напитки, съ крайнею умѣренностію; иначе вмѣсто укрѣпленія себя легко можетъ онъ истощить и остальную жизненную силу желудка.

5) Геморoидалистамъ, кои имѣютъ крайне изнуренное и изсушенное тѣло и кои страдаютъ отъ изгаги, кислотъ и рвоты и потому не могутъ употреблять почти никакой пищи, весьма полезны слизистогорькія средства, замѣняющія недостающую естественную слизь и вмѣстѣ питательную пищу и крѣпительныя лѣкарства. Къ таковымъ средствамъ причисляю я въ особенности желе изъ Исландскаго моха и сиропъ Лафектеровъ.

6) Средства противу кислотъ и противъ судорожнаго состоянія. 7) Клистиры изъ питательныхъ бульоновъ, и ванны приготовляемыя

изъ питательныхъ жидкостей, на прим: изъ молока, изъ отвара пшеничныхъ отрубей и т. п.

Способъ приготовлять желе изъ Исландскаго моха для изнуренныхъ, сухотныхъ и чахотныхъ. (*Gelatina Lichenis Islandici*).

§ 93.

Возьми: *Исландскаго моха* двѣ съ половиною унціи, облей кипяткомъ и дай постоять съ полчаса времени, потомъ воду слей сквозь сито (*), на выжатой мохъ налей три бутылки холодной воды, вари, пока получится крѣпкой клейковатый отваръ, въ который, по процѣженіи и выжатіи мха, прибавь:

корицы или *имбирю*, мѣлко въ порошокъ столченнаго, двѣ чайныя ложки,

порошку салепа полную столовую ложку, (посыпая оный изъ горсти понемногу въ горячій отваръ при безпрестанномъ мѣшаніи ложкою),

мѣлкаго *сахару* и

лучшаго *бѣлаго меду* (mel virg.), каждаго по двѣ столовыя ложки.

Все сіе вари на небольшомъ огнѣ, мѣшая безпрерывно до тѣхъ поръ, пока весь отваръ сгустится.

(*) Симъ отвращается производящее тошноту свойство мха.

Пріемъ: отъ двухъ до четырехъ разъ въ сутки по одной столовой ложкѣ. Для лучшаго сваренія въ желудкѣ больной можетъ всякой разъ запивать рюмкою какой нибудь ароматной воды, на прим: *мятной, мелисной, укропной* или *померанцовой* съ примѣсью нѣсколькихъ капель Гофмановыхъ и, буде нужно, съ сиропомъ померанцовымъ, персиковымъ или другимъ какимъ. Буде у больнаго случится щекочущій кашель, то полезно желе запивать имбирнымъ пивомъ.

Желе, такимъ образомъ приготовленный, несравненно полезнѣе, нежели получаемый изъ аптекъ. Онъ сильно питаетъ изнуренное тѣло, поправляетъ пищевареніе, вознаграждаетъ недостатокъ натуральной въ желудкѣ и кишкахъ слизи, излѣчиваетъ въ самое короткое время кровохарканіе, отъ слабости и чрезмѣрной раздражительности легочныхъ сосудовъ зависящее (припадокъ, нерѣдко у гемороидалистовъ случающійся); отвращаетъ застарѣлое колотье въ груди и мускуламъ придаетъ силу и крѣпость. Благотворное дѣйствіе сего желе испыталъ я надъ собою за 17 лѣтъ передъ симъ (когда страдалъ кровохарканіемъ съ болью въ груди) и весьма часто послѣ того надъ своими паціентами.

О способѣ приготовленія Лафектерова сирола и его употребленіи.

§ 94.

Сиролъ, извѣстный подъ названіемъ Roob antisyphilitique de Laffecteur, безъ меркурія употребляю я съ наилучшимъ успѣхомъ для всѣхъ сухотныхъ, чахлыхъ и кровію харкающихъ больныхъ. Я дозналъ опытомъ, что онъ возбуждаетъ силы вознагражденія и тѣмъ много вспомоществуетъ питанію тѣла; сверхъ того цѣлебностію своихъ составныхъ частей уничтожаетъ разныя болѣзненныя причины, чахлость тѣла произведшія и усугубляющія. Сиропъ сей, возбуждая сплетенія брюшныхъ нервовъ, млечные и кровоносные сосуды, исправляетъ испорченное пищевареніе и кровотвореніе и способствуетъ разрѣшенію чревныхъ заваловъ, не причиняя запора, но побуждая напротивъ слабленіе низомъ; онъ обволакиваетъ острые и вредные соки, въ тѣлѣ чахлаго человѣка обыкновенно отдѣляющіеся; дѣйствуя сильно на органы дыханія, помогаетъ во всѣхъ слѣдствіяхъ катарра и воспаленія легкихъ, въ судорожной одышкѣ, въ сильномъ изверженіи харкотины съ кровью и безъ оной, въ сильной и застарѣлой боли въ груди; дѣйствуя также на мочевые пути и на матку, онъ полезенъ въ бѣляхъ, дѣвичьей безцвѣтности и другихъ женскихъ болѣзняхъ, съ изнуреніемъ тѣла и слизистыми истеченія-

ми сопряженныхъ; онъ дѣйствуетъ притомъ и на органы испаренія и потому съ пользою употребляется въ сухоткѣ, происшедшей отъ запущенной простуды, отъ скрывшейся внутрь сыпи, отъ золотухи и отъ застарѣлой ломоты. Наконецъ люди, имѣвшіе несчастіе подвергнуться венерической болѣзни и разслабленные продолжительнымъ употребленіемъ древесныхъ декоктовъ и *меркурія,* находятъ въ семъ средствѣ единственное спасеніе, даже и тогда, когда раны въ горлѣ и въ носу и сильная ломота въ костяхъ сопряжены съ чахлостію и разслабленіемъ.

По употребленіи сего сиропа въ продолженіи двухъ мѣсяцовъ попеременно съ желе изъ Исландскаго моха можно съ большею пользою приступить и къ употребленію другихъ по свойству и сложности сухотки необходимо нужныхъ средствъ, каковы суть: препараты *сюрьмяные, бисмутовые* и *желѣзные;* смѣлѣе можно тогда давать хину и другія горькія и нервы укрѣпляющія лѣкарства.

Если зараженному венерическою болѣзнію и притомъ чахлому, слабую грудь имѣющему человѣку нужно будетъ для скорѣйшаго и совершеннаго искорененія венерической заразы прописать *меркурій,* то всего лучше и безопаснѣе употреблять оный съ симъ сиропомъ. Въ семъ случаѣ на каждую бутылку онаго можно прибавлять отъ двухъ до четырехъ гранъ *солепре-*

сыщенно-кислой ртути (Oxymuriatis hydrargyri, Merc. subl corros.).

Изъ вышеобъясненнаго и опытомъ дознаннаго дѣйствія *Лафектерова сирола* явствуетъ, что онъ не въ одной только застарѣлой худолѣченной венерической болѣзни полезенъ, но будучи употребленъ безъ *меркурія*, составляетъ спасительное средство и въ другихъ разныхъ болѣзняхъ для каждаго возраста и пола безъ исключенія. По сей причинѣ считаю нужнымъ данное сему сиропу названіе (R. Antisyphilitique) перемѣнить какъ неприличное, ибо извѣстно, что дамы средство сіе принимать не согласятся по одному только его названію, сколько бы оное для нихъ полезно и даже необходимо ни было. Многіе изъ мущинъ также не рѣшаются употреблять оный, полагая, что сиропъ сей можетъ быть полезенъ только въ одной венерической болѣзни. — Какое заблужденіе!

Лафектеръ въ одномъ изъ своихъ сочиненій (*) сильно вооружается противъ *меркурія* и увѣряетъ, что онъ всякую венерическую болѣзнь вылѣчиваетъ безъ онаго однимъ своимъ сиропомъ, который есть произведеніе царства растительнаго. Но за всѣмъ тѣмъ Г. Лафектеру вѣрятъ одни только легковѣрные. У людей истинно просвѣщенныхъ по сіе время

(*) Observations sur l'histoire et les effets du roob antisyphilitique de Mr. Boyveau Laffecteur à Paris.

одинъ только меркурій считается единственнымъ средствомъ къ совершенному истребленію венерической заразы. Онъ, какъ изъ безчисленныхъ опытовъ извѣстно, будучи употребляемъ съ должною осторожностію и умѣренностію, никакихъ вредныхъ по себѣ слѣдствій не оставляетъ.

Лафектеръ въ Парижѣ въ 1777 и 1778 годахъ для испытанія своего сиропа избиралъ больныхъ въ сильномъ и запущенномъ, даже отчаянномъ положеніи отъ венерическаго зараженія, и дѣйствительно вылѣчивалъ ихъ сверхъ всякаго чаянія. При семъ должно однакожъ замѣтить, что всѣ сіи отчаянные больные были уже до него нѣсколько мѣсяцовъ, а можетъ быть и болѣе, лѣчимы. Весьма вѣроятно, что чахлость, сыпь повсемѣстная, язвы въ горлѣ и по всему тѣлу и вообще все отчаянное сихъ больныхъ положеніе были уже слѣдствія предшествовавшаго худаго лѣченія, слѣдствія во зло употребленныхъ: *меркурія, древесныхъ декоктовъ, сюрьмяныхъ* препаратовъ, изнуряющей тѣло пищи и т. п. Въ таковыхъ случаяхъ *Лафектеровъ сиропъ* безъ сомнѣнія есть спасительнѣйшее средство. Самыя наблюденія, приведенныя въ вышеупомянутомъ сочиненіи *Лафектера*, свидѣтельствуютъ о таковыхъ же запущенныхъ болѣзняхъ — и мы нынѣ, къ счастію, сами весьма часто испытываемъ, какъ сей *Лафектеровъ сиропъ*, у насъ приготовляемый, въ подобныхъ

случаяхъ дѣлаетъ чудеса и отчаянныхъ больныхъ, такъ сказать, воскрешаетъ; ибо и у насъ, какъ въ Парижѣ, многіе чахнутъ и умираютъ не столько отъ венерической заразы, сколько отъ худаго лѣченія, отъ употребленія во зло ртутныхъ средствъ, древесныхъ декоктовъ, грудь и пищевареніе портящихъ, и отъ невоздержной жизни.

Лафектеровъ сиропъ привозится къ намъ изъ Франціи въ бутылкахъ и продается по 50 рублей за каждую; а какъ не всѣ иногородные могутъ сиропъ сей выписывать изъ С. Петербурга, недостаточные же, и въ С. Петербургѣ живущіе, не въ состояніи пользоваться симъ дорогимъ средствомъ, и сверхъ того многіе больные не рѣшаются употреблять онаго, подозрѣвая въ немъ примѣсь *сулемы*, одного изъ крѣпчайшихъ меркуріальныхъ препаратовъ (хотя *Лафектеръ* сіе совершенно опровергаетъ), то и надѣюсь я немалую оказать услугу многимъ изъ моихъ соотечественниковъ помѣщеніемъ здѣсь вывезеннаго въ 1814 году изъ Франціи рецепта *Лафектерова* сиропа (*).

(*) Хотя Лафектеръ понынѣ не сдѣлалъ извѣстнымъ состава изобрѣтеннаго имъ сиропа, но во Франціи многіе имѣютъ рецептъ онаго, вѣроятно, отъ Французскихъ Коммисаровъ, бывшихъ по порученію Магистрата при составленіи сего сиропа и отъ Химико-Фармацевтиковъ, разлагавшихъ оный на со-

Составленіе Лафектерова сиропа.
(Syrupus vel roob de Laffecteur).

Возьми: *корня сассапарельнаго* мѣлко изрѣзаннаго,
корня мыльной травы (Rad. saponariae offic.) или
корня тростника простаго (Rad. arundo phragmit.) мѣлко изрѣзаннаго, каждаго по 16 унцій,
стружекъ баккаутнаго дерева 4 унціи, смѣшай и облей 16 фунтами кипячей воды, поставь на 24 часа въ теплое мѣсто, потомъ жидкость слей въ чистой сосудъ и на выжатую гущу налей 16 фунтовъ холодной воды и дай нѣсколько разъ вскипѣть, потомъ жидкость слей и смѣшай съ преждеслитою, выжатую же гущу въ другой разъ вари долго съ толикимъ же количествомъ воды, пока укипитъ до половины, послѣ сего процѣди и гущу выбрось, жидкость же смѣшай съ преждеслитыми двумя и поставь на умѣренный огонь и дай испариться на ономъ до 8 фунтовъ, потомъ въ горячую сію жидкость положи:
сѣмянъ укропныхъ (Semen foeniculi),
цвѣтовъ растѣнія, называемаго *огуречною травою* (Flores borraginis),

---

ставныя части. Подобный сему сиропъ описанъ также въ Фармакопеѣ *Сведіора* (1813).

цвѣтовъ розы мускатной, либо центифоліи, всѣхъ трехъ по двѣ унціи,
листу Александрійскаго мѣлко изрѣзаннаго шесть драхмъ, поставь на умѣренной огонь на 12 часовъ (не допуская до кипѣнія), потомъ процѣди, выжавъ гущу (которая выбрасывается), въ сей отваръ прибавь напослѣдокъ:
лучшаго *бѣлаго меду* (липецу),
мѣлкаго сахара, каждаго по 3 фунта, и дай стоять на легкомъ огнѣ въ закрытой кострюлѣ до тѣхъ поръ, пока получится довольно густаго сиропу 3 бутылки.

Пріемъ: отъ двухъ до трехъ разъ въ день по полной столовой ложкѣ, запивая всякой разъ стаканомъ крѣпкаго декокта изъ кореньевъ *сассапарели* и *мыльной травы* (Decoctura rad. s. sassaparillae et dec. r. saponariae).

Описавъ подробно составленіе и употребленіе Лафекторова сиропа, излишнимъ уже считаю помѣщать здѣсь о приготовленіи того сиропа отъ сухотки и чахотки, о коемъ говорено мною въ первомъ изданіи сего сочиненія, ибо сиропъ сей по испытаніи моемъ достаточно замѣняется *Лафектеровымъ*. Что принадлежитъ до стеблей и листьевъ черногрива (Folia et stipites rhododendri chrysanti), въ особенности весьма полезнаго для сухотныхъ подагриковъ, и до другихъ веществъ, въ составъ онаго сиропа входящихъ, то оные могутъ быть

употребляемы особо, въ видѣ декокта (см. о *Сибирской подснѣжной розѣ* или *черногривѣ* § 47).

Излѣченіе сухотки, отъ плоскаго глиста зависѣвшей.

§ 95.

Въ 1811 году имѣлъ я случай вылѣчить одного извѣстнаго человѣка отъ сухотки и чахлости тѣла въ сильнѣйшей степени. Многіе Медики, видя необыкновенное изсушеніе тѣла сего больнаго и чрезмѣрно сильное изверженіе имъ мокротъ, и не зная настоящаго болѣзни сей источника, полагали, что сей больный одержимъ неизлѣчимою чахоткою и считали его погибшимъ. Всѣ извѣстныя противъ чахотки средства, въ томъ числѣ и свинцовый сахаръ (Super acetas plumbi cristall. sacharum saturni) употреблены были безъ всякой пользы. Узнавъ отъ больнаго, что у него по временамъ показывался плоскій глистъ (солитеръ), далъ я ему противуглистное самое надежнѣйшее изъ всѣхъ доселѣ извѣстныхъ средствъ (*), отъ коего менѣе нежели черезъ четыре часа по пріемѣ вышло съ гнѣздомъ *солитера* болѣе 60 аршинъ. Вско-

(*) Средство сіе по Высочайшему повелѣнію обнародовано покойнымъ Лейб-Медикомъ *Бекомъ;* см. прибавленія къ С. Петербургскимъ вѣдомостямъ отъ 27 Марта 1803 года No 25.

рѣ послѣ сего больной не извергалъ уже болѣе мокротъ, а по прошествіи двухъ мѣсяцовъ совершенно выздоровѣлъ. Судя по свѣжему цвѣту лица и по тѣлу, довольно пополнѣвшему въ столь короткое время, никакъ нельзя было думать, чтобы онъ не задолго передъ тѣмъ одною, такъ сказать, ногою стоялъ уже во гробѣ. Выгнавъ *солитера*, давалъ я больному недѣли съ двѣ *горько-мыльные разрѣшающіе* экстракты съ примѣсью *винокупоросной соли* и столько же времени чистыя крѣпительныя средства. Сверхъ того при питательной пищѣ и горькомъ пивѣ больной пилъ ежедневно кофе изъ дубовыхъ желудей и изъ можжевеловыхъ ягодъ съ малою частію настоящаго *кофе*.

Изъ приведеннаго здѣсь примѣра видно, сколь важно и необходимо для успѣшнаго излѣченія сухотки безошибочное распознаваніе настоящей ея причины. Вообще сухотка или чахлость тѣла не есть болѣзнь вовсе неизлѣчимая, какъ многіе полагаютъ и, къ крайнему сожалѣнію, осуждаютъ преждевременно одержимыхъ ею на козье молоко, то есть, оставляютъ безъ всякой врачебной помощи на произволъ судьбы.

Объ отвращеніи чрезмѣрной тучности тѣла.

§ 96.

Отъ чрезмѣрнаго накопленія въ брюшной полости жира и бывающаго притомъ преизобилія слишкомъ клейкаго питательнаго сока, недостаточно въ красную кровь претворяющагося, случается нерѣдко, 1) что сосуды брыжеечные, воротная и гемороидальные стѣсняются и засоряются; по сей причинѣ тучные люди расположены бываютъ къ почечую и съ трудомъ отъ онаго излѣчиваются; извѣстно, что у таковыхъ людей почечуйныя опухоли легко переходятъ въ фистулы, а иногда антоновымъ огнемъ поражаются со всѣми близьлежащими мягкими частями. 2) Мускулы, дыханію вспомоществующіе, сухожильныя конечности ручныхъ и ножныхъ мускуловъ и костные составы излишне облагаются жиромъ и производятъ у тучнаго человѣка сильную одышку, ощущеніе великой тяжести въ рукахъ и ногахъ и дѣлаютъ его неспособнымъ къ тѣлодвиженію и работѣ. 3) Излишній въ тѣлѣ жиръ, угнетая нервы, причиняетъ иногда обмороки и параличь, а отъ преизобилія въ крови слишкомъ клейкаго питательнаго сока, недостаточно въ красную кровь претворяющагося, образуются иногда въ сердцѣ мясные и жирные полипы, отъ чего таковые чрезмѣру тучные люди подвергаются иногда

ужасной тоскѣ, а иногда отъ задушенія скоропостижно умираютъ апоплексическимъ ударомъ.

Изъ вышесказаннаго явствуетъ, что чрезмѣрное накопленіе въ тѣлѣ жира во всякомъ случаѣ нужно отвращать. Для растворенія и изгнанія изъ тѣла излишняго жира предлагаются различные способы; только ни въ какомъ случаѣ не должно употреблять острыхъ и крѣпкихъ лѣкарствъ и кислотъ; иначе легко можно разстроить совершенно пищевареніе и кровотвореніе, испортить всю массу крови и такимъ образомъ изъ тучнаго человѣка сдѣлать чахлаго и сухотнаго. Были примѣры, что иные, особливо изъ прекраснаго пола, для утонченія тучнаго своего тѣла и для уменьшенія излишняго, по мнѣнію ихъ, румянца въ лицѣ, долгое время пили уксусъ, отъ чего на всю жизнь дѣлались чахлыми и блѣдными. У людей чрезмѣру тучныхъ кишки бываютъ слишкомъ чувствительны и раздражительны и потому имъ не слѣдуетъ предписывать крѣпкихъ слабительныхъ; въ противномъ случаѣ кишки легко могутъ поразиться антоновымъ огнемъ.

При лѣченіи чрезмѣру тучнаго гемороидалиста въ особенности должно обращать вниманіе: 1) на поправленіе венознаго тѣлосложенія, въ коемъ преизобилуютъ угольное и водотворное вещества, служащія одною изъ главнѣйшихъ причинъ чрезмѣрнаго накопленія въ тѣлѣ жира;

2) на исправленіе печени; ибо люди, у коихъ отдѣленіе желчи бываетъ недостаточно, также тѣ, у коихъ слишкомъ большая печень или имѣются завалы въ печени, легко становятся тучны; впрочемъ 3) лѣченіе діетою и тѣлодвиженіемъ есть самое приличнѣйшее.

Чрезмѣру тучные люди имѣютъ большею частію и непомѣрный аппетитъ; они никакъ не довольствуются среднимъ количествомъ пищи и питья. А какъ отъ сей невоздержности всякое врачебное пособіе остается безуспѣшнымъ, то и надлежитъ постановить правиломъ уменьшить количество ихъ пищи и питья. Сіе дѣлать однакожъ исподоволь до тѣхъ поръ, пока приближатся къ среднему количеству. Исподоволь дѣлать сіе совѣтуется для того, дабы чрезъ постепенное уменьшеніе пищи и питья могли также и сосуды и волокны, дотого чрезмѣру растянутые и разслабленные, мало помалу сокращаться и съ должною силою на принятую въ среднемъ количествѣ пищу и пріуготовляемый изъ оной питательный сокъ и кровь противудѣйствовать. Равнымъ образомъ надлежитъ перемѣнить и качество пищи и питья, на примѣръ: вмѣсто портеру и крѣпкаго питательнаго пива пить квасъ или тонкое полпиво, березовый заквашенный сокъ (Succus betulae alb.), холодную воду съ примѣсью веиндеграфа, сотерна или другихъ кисловатыхъ винъ, либо соку клюквеннаго или брусничнаго, употреблять ми-

неральныя воды, особливо щелочныя и т. п.; вмѣсто яицъ, бифстекса, жирныхъ и прѣсныхъ яствъ довольствоваться пищею умѣренно кислою и изобилующею щелочными солями, которая сверхъ умѣренной питательности гнала бы мочу, возбуждала испарину и очищала низомъ, нимало не разслабляя желудка. Къ послѣднимъ въ особенности причисляются: петрушка, укропъ, постернакъ, хрѣнъ, спаржа, морковь, дикая горчица, имбирь, селдерея, борщъ, уксусомъ заквашенный, ботвинья (нежирная и не со льдомъ) и т. п. Шоколадъ симъ людямъ вреденъ.

Галенъ весьма одобряетъ для чрезмѣрно тучныхъ людей *соль*. Она, по мнѣнію моему, еще полезнѣе, когда возбуждаемая ею жажда не утоляется совершенно питьемъ. *Полынковую соль*, нѣсколько недѣль сряду употребляемую, почитаютъ здѣсь нѣкоторые (Hyppocrates) специфическимъ средствомъ. Полезными также признаются и прочія травяныя соли, какъ то: *соль бѣлой полыни* (Sal artemisiae), *соль кудряваго волчца* (Card. bened.), *соль золототысячника* (Centaur. minor.) и *соль майорана*, равно и *соль летучая*. *Соленые лимоны*, по увѣренію древнихъ писателей, весьма утончеваютъ тучное тѣло.

На сей же конецъ чрезмѣру тучные люди могутъ съ пользою пить нѣсколько мѣсяцовъ сряду стакана по 3 или болѣе въ день древесныхъ декоктовъ, такъ называемыхъ кровочисти-

тельныхъ, какъ то: отвара дерева *можжевеловаго*, корня *сассапарельнаго*, стружекъ дерева *баккаутнаго* и т. п. Таковое дѣйствіе декоктовъ видимъ мы весьма часто надъ людьми, кои лѣчатся отъ венерической болѣзни.

Тѣлодвиженіе составляетъ необходимое условіе для отвращенія чрезмѣрнаго накопленія въ тѣлѣ жиру; оно одно можетъ придать мышечнымъ волокнамъ силу и крѣпость и изгнать изъ тѣла излишекъ жиру и мокротъ. Отвыкшіе и сдѣлавшіеся неспособными къ тѣлодвиженію должны начинать небольшою прогулкою пѣшкомъ, увеличивая оную ежедневно, то есть, каждый день прибавляя по нѣскольку десятковъ шаговъ, каждый день болѣе ѣздить въ экипажѣ тряскомъ или верьхомъ, болѣе дѣйствовать руками и т. п., пока наконецъ безъ труда можно будетъ производить дѣятельнѣйшее движеніе, въ коемъ бы всѣ члены и брюшные мускулы брали участіе.

Треніе всего тѣла сухою рукою и особенно фланелью, ежедневно повторяемое, составляетъ здѣсь также лучшее вспомогательное тѣлодвиженіе. Фланель или полотенцы, для тренія употребляемыя, полезно спрыскивать летучими жидкостями, на прим: *водкою* или водою *Унгарскою* (Aqua hungarica), *спиртомъ розмаринным*ъ, *лаванднымъ* (eau de Lavande), *можжевеловымъ*, *муравейнымъ*, *Кельнскою водою* (eau de Cologne) и т. п. *Михаелисъ* совѣ-

туетъ для сего *отваръ кипарисовыхъ орѣховъ* (Decoctura nucum cypress.); тренія сего рода дѣлать въ теплой комнатѣ до произведенія поту. Для укрѣпленія брюшныхъ мускуловъ и возбужденія всасывающихъ сосудовъ полезно исподоволь стягивать брюхо фланелевою шнуровкою. Не безполезно париться веникомъ въ парной банѣ. Солнечные лучи оказываютъ также свое дѣйствіе на тѣло чрезмѣру тучнаго человѣка, а особливо флегматика. Люди сіи должны свой сонъ сократить, послѣ обѣда же и вовсе не спать.

О лѣченіи геморoидальной боли въ поясницѣ.

§ 97.

Люди, подверженные почечую или имѣющіе явное къ оному предрасположеніе, ощущаютъ нерѣдко жестокую боль въ поясницѣ (Dolor lumborum haemorrhoidalis). Боль сію гемороидалистъ чувствуетъ либо послѣ долгаго сидѣнія, либо подвергается оной внезапно на ходу, и иногда такъ сильно, что нѣсколько минутъ съ мѣста тронуться не можетъ. Поясничная боль отъ крестца распространяется по хребту выше къ лопаткамъ; въ семъ случаѣ больной чувствуетъ въ груди боль и стѣсненное дыханіе, либо оная нисходитъ къ внутренней сторонѣ ляшекъ и къ нижней пузырной части брюха.

въ семъ послѣднемъ случаѣ больной страждетъ отъ сильной боли въ пахахъ, въ сѣменномъ канатикѣ и въ шулятахъ. Сія боль похожа на ощущаемую при ломотѣ или при началѣ зарожденія грыжи. Въ обоихъ случаяхъ больной при жестокой боли въ поясницѣ не можетъ ни кашлянуть, ни встать съ мѣста. Поясница его на ощущеніе бываетъ тепла, моча истекаетъ красная, иногда съ бѣлою осадкою; въ началѣ болѣзни чувствуется легкой летучій ознобъ по тѣлу; впрочемъ ни измѣненія въ пульсѣ, ни другихъ какихъ лихорадочныхъ припадковъ не примѣтно. Замѣчательно въ семъ недугѣ особенно то, что больной можетъ свободно изгибаться назадъ, ложиться спиною на спину другаго человѣка и позволять въ такомъ положеніи перегибать себя въ поясницѣ нѣсколько разъ сряду, чего въ извѣстной поясничной боли отъ воспаленія поясничныхъ мускуловъ (Lumbago, psoitis) сдѣлать не возможно. Въ сей же послѣдней и какъ извѣстно, крайне опасной болѣзни чувствуетъ больной напротивъ облегченіе и остается покоенъ только тогда, когда можетъ лежать согнувшись напередъ.

Причины геморoидальной поясничной боли суть многоразличны. Главнѣйшая изъ оныхъ состоитъ въ сильномъ приливѣ крови къ геморoидальнымъ сосудамъ, въ чрезмѣрномъ накопленіи крови въ венахъ, расположенныхъ вблизи поясничныхъ нервовъ, а иногда и въ воспален-

номъ состояніи венъ (см. § 3). Отдаленныя и случайныя причины поясничной боли суть: запоръ на низъ, накопленія въ заднепроходной кишкѣ множества экскрементовъ и ѣдкихъ вонючихъ гасовъ или вѣтровъ, продолжительное сидѣніе, внезапное остановленіе почечуйнаго теченія, простуда ногъ и поясницы, сильный испугъ либо досада, поднятіе чего нибудь слишкомъ тяжелаго и проч. Впрочемъ поясничная боль бываетъ также сочувственнымъ слѣдствіемъ болѣзней мочеваго пузыря, матки, рукава маточнаго, а иногда припадкомъ ломоты и проч.

Лѣченіе гемороидальной поясничной боли. Больной долженъ остаться дома и въ первые дни лежать покойно на боку либо на спинѣ, потомъ прохаживаться слегка по комнатѣ и заднепроходную кишку немедленно очистить отъ сухихъ и ѣдкихъ экскрементовъ посредствомъ ординарнаго клистира. На сей конецъ, равно и для разбитія накопившейся и застоявшейся крови въ гемороидальныхъ сосудахъ больному полезно принимать нижеслѣдующіе *сѣрные порошки:*

Возьми: *кремортартару* полунціи,
сѣрнаго цвѣта,
Александрійскаго листа (Folia sennae s. s.),
каждаго по двѣ драхмы,
кислоты виннаго камня (Acidum tartaricum) двадцать гранъ,

сахара одну драхму,

рутнаго масла (Oleum rutae grav.) десять капель, смѣшай и сотри въ мѣлкой порошокъ.

Пріемъ: поутру и ввечеру по полной чайной ложкѣ съ холодною водою принимать дни два или три сряду.

Пища больнаго должна быть самая легкая, прохладительная; питье — чистая холодная вода сама по себѣ, либо съ клюквеннымъ морсомъ, либо съ небольшимъ количествомъ хорошаго кислаго Французскаго вина.

Ежели простуда была случайною причиною поясничной боли, то сверхъ вышеписаннаго и сверхъ изобильнаго питія чаю изъ бузинныхъ либо ромашковыхъ цвѣтовъ, либо изъ сушеной малины полезно поставить больному ноги въ теплую воду, задницу окурить теплыми парами изъ ромашковаго чаю съ уксусомъ, либо приложить къ поясницѣ подогрѣтой сухой муки, либо отрубей, либо овса. Простолюдимы съ пользою парятся въ банѣ и въ оной натираютъ себѣ спину, поясницу, брюхо и ляшки горячимъ крѣпко намыленнымъ вѣникомъ либо суконкою и сверхъ того въ крестецъ втираютъ медъ съ поваренною солью. Съ пользою предписываю я здѣсь слѣдующія наружныя средства: 1) втираніе въ крестецъ a) *Оподельдока*, b) *летучей камфорной мази*, c) *лаванднаго спирта* (eau de lavande) съ примѣсью третьей

части летучаго *нашатырнаго спирта*, d) *наружнаго жизненнаго бальсама* (Balsam. vitae externum) съ примѣсью третьей части капель шпанскихъ мухъ; 2) буде втираніе вышеупомянутыхъ средствъ, повторенное нѣсколько дней сряду, не доставитъ пользы, въ такомъ случаѣ прикладывается на крестецъ *Шифгаузенской* пластырь съ примѣсью шпанскихъ мухъ, либо 3) *шпанская мушка*.

Иногда вмѣстѣ съ поясничною болью, либо вскорѣ по минованіи оной, появляются у больнаго въ проходѣ почечуйныя опухоли съ жаромъ и болью; въ такомъ случаѣ нужно окурить задницу теплыми водяными парами съ уксусомъ и припустить къ проходу отъ 8 до 12 піявицъ. Сіе въ особенности необходимо, когда боль въ поясницѣ бываетъ жестокая, когда подозрѣвается хотя малое воспаленіе въ гемороидальныхъ и въ прочихъ сосудахъ воротной системы. Иногда даже нужно и самое кровопусканіе изъ руки либо изъ ноги, особенно когда больной крѣпкаго тѣлосложенія, полнокровенъ и когда сдѣлался болѣнъ отъ сильнаго разгоряченія пищею и крѣпкими напитками и отъ чрезмѣрнаго тѣлодвиженія.

КОНЕЦЪ.